



**24 de Janeiro de 2010**

**CARGO Nº 30**

**ENFERMEIRO JÚNIOR**

N.º DO CARTÃO

NOME (LETRA DE FORMA)

ASSINATURA

**INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES:**

1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40 e 1 redação.
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não poderão interferir.
3. Preenchimento do **Cartão-Resposta**:
  - Preencher para cada questão apenas uma resposta
  - Preencher totalmente o espaço  correspondente, conforme o modelo:
  - Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta
  - Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão

**O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO.  
NÃO PODE SER SUBSTITuíDO, NEM CONTER RASURAS.**

**Duração total da prova: 4 horas e 30 minutos**

**Anote o seu gabarito.**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.



EMBRAMCO



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. Assinale (V) para **verdadeiro** e (F) para **falso** e escolha a alternativa que contemple a combinação que considerar **CORRETA**.

Sobre a consulta de enfermagem, podemos afirmar:

- ( ) Trata-se de um encontro informal entre o enfermeiro e o cliente, em que o enfermeiro é conduzido pelo cliente.
- ( ) É recomendável que seja orientada por referencial teórico da enfermagem, ampliando a visão biomédica.
- ( ) Para sua realização, o profissional só precisa saber sobre fisiologia e fisiopatologia das doenças prevalentes em sua comunidade.
- ( ) De acordo com a Lei do Exercício Profissional (7.498, de 25 de junho de 1986), a consulta de enfermagem pode ser delegada a outro membro da equipe de enfermagem.
- ( ) A consulta deve ter objetivos claros e metodologia própria.

- A) V- F- V- V- F
- B) V- V- F- F- F
- C) F- V- V- F- V
- D) V- V- V- V- F
- E) F- V- F- F- V

2. Em relação a um contexto envolvendo um acidentado, assinalar a alternativa **CORRETA**:

- A) A presença de fratura de fêmur deve levar o socorrista a pensar na possibilidade de uma hemorragia e em consequência progressão para o choque. Assim, além da imobilização do membro lesado, a adoção de medidas preventivas, tais como: manter o paciente deitado e aquecido bem como avaliar constantemente o seu pulso representam os cuidados iniciais importantes no primeiro atendimento.
- B) Se no acidentado os sinais e sintomas indicarem a possibilidade de rompimento de órgãos internos (fígado ou baço) e a vítima refira apresentar sede, o fornecimento de líquidos via oral pode ajudar na prevenção do estado de choque.
- C) Ao combatermos prontamente as hemorragias, evitamos a instalação do choque neurogênico, que, ao se instalar, provoca dificuldade respiratória, devido ao edema em cordas vocais.

- D) Se, ao inspecionar o tórax, constatar-se a presença de objeto encravado profundamente, deve o socorrista retirá-lo e realizar curativo oclusivo com material impermeável, visando a evitar a penetração de ar e agentes infecciosos.
  - E) Na abordagem secundária, a avaliação das pupilas tem por finalidade identificar apenas o estado de oxigenação cerebral, como avaliado na abordagem primária.
3. De acordo com a Portaria N°485, de 11 de novembro de 2005, que aprova a Norma Regulamentadora N° 32, referente a Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde afirma que:
- I. O uso de adornos, o manuseio de lentes de contatos nos postos de trabalho, o uso de calçados abertos devem ser vetados pelo empregador.
  - II. Os trabalhadores são responsáveis pela sua capacitação em relação a mecânica corporal correta, nas técnicas de movimentação de pacientes ou de materiais, de forma a preservar sua saúde e integridade física.
  - III. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
  - IV. Os trabalhadores que utilizam objetos perfurocortantes são parcialmente responsáveis pelo seu descarte.
  - V. Compete ao empregador o fornecimento gratuito, do programa de imunização ativa contra tétano, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
- A) V, V, V, F, F
  - B) V, F, F, V, V
  - C) F, F, V, F, F
  - D) V, F, V, F, V
  - E) V, F, V, V, V
4. São funções privativas do Enfermeiro, segundo a Lei nº7.498/86 e o Decreto Lei nº94.406/87:
- A) Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.
  - B) Participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde.
  - C) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
  - D) Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
  - E) Direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.



5. Sobre avaliação secundária, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Se, ao se avaliar o abdome, detectar-se aumento de volume, ferimentos ou dor, o posicionamento da vítima em decúbito lateral evita, em casos de perda da consciência, que ela venha apresentar obstrução de vias aéreas pela queda da língua. Esse socorro é capaz de diminuir o desconforto e o sofrimento.
  - B) Ao inspecionar as jugulares, caso apresentem ingurgitamento que piora na inspiração, deve o socorrista estar atento para uma possível lesão intratorácica grave. Caso haja possibilidade de verificação da pressão arterial, constatará uma grande divergência entre a máxima e a mínima.
  - C) Se, ao inspecionar o tórax, constatar a presença de perfuração eliminação de sangue com característica espumosa, o socorrista não deve realizar curativo oclusivo, considerando a possibilidade de formação de hematoma intratorácico e consequente dificuldade respiratória.
  - D) Caso, ao se palparem as clavículas, percebe-se a existência de assimetria ou de hipersensibilidade, a imobilização se constitui em medida preventiva de possíveis lesões em vasos presentes na região causadas pelos fragmentos ósseos nas fraturas. Tal procedimento pode ser realizado usando-se o enfaixamento em oito, ou uma tipoia seguida de imobilização do membro contra o tórax do lado afetado.
  - E) Observar atentamente vias aéreas, respiração e circulação. Se ao reavaliar as pupilas, estas se apresentarem anisocóricas, deve o socorrista iniciar a respiração de socorro. Certamente com essa alteração a vítima progredirá para parada respiratória. Atuando, assim, estará prevenindo possíveis agravos à vítima.

6. Correlacione os fatores de riscos ambientais ou de estilo de vida com suas respectivas características e assinale a alternativa CORRETA:

- |               |   |
|---------------|---|
| (1) Obesidade | ( ) Seu consumo pode elevar a pressão arterial e o risco de acidente vascular encefálico.   |
| (2) Tabagismo | ( ) Juntamente com a hipertensão, representa um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares e, com frequência, ambos levam à invalidez parcial ou total. |
| (3) Estresse  | ( ) É dos grandes desafios a ser vencido  |

por ocasião do cuidado ao cliente com hipertensão arterial.

( ) Está associado à maior morbidade e mortalidade coronariana, cérebro-vascular e vascular de extremidades.

( ) O excesso de peso aumenta de duas a seis vezes o risco de hipertensão.

( ) Pode aumentar a pressão arterial, mas não está comprovado o seu papel na gênese da hipertensão.

- A) 5, 6, 3, 1, 2 e 4
  - B) 4, 1, 2, 6, 5 e 3
  - C) 2, 5, 6, 2, 1 e 3
  - D) 2, 3, 5, 6, 1 e 4
  - E) 4, 6, 5, 2, 1 e 3

7. De acordo com Resolução COFEN nº 311, de 8 de fevereiro de 2007 (Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem), são princípios fundamentais da Enfermagem:

- I. A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa família e coletividade.
  - II. O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais.
  - III. O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética.
  - IV. O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões.
  - V. Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.

- A) Estão corretas somente as alternativas I, II, III e IV.
  - B) Estão corretas somente as alternativas I e III.
  - C) Estão corretas somente as alternativas I e II.
  - D) Estão corretas somente as alternativas I, II e V.
  - E) Estão corretas somente as alternativas I, II, III e V



8. Meireles (1997) afirma que risco consiste em uma ou mais condições de uma variável com potencial para causar danos. Neste aspecto, os estabelecimentos de atenção à saúde devem desenvolver políticas que assegurem que todos estejam cientes de suas responsabilidades na eliminação e redução de riscos biológicos e acidentes de trabalho.

Com relação ao risco e a aplicação da NR 32, é **CORRETO** afirmar que:

- I. De acordo com a legislação vigente, o empregador deve fornecer aos trabalhadores instruções escritas e, se necessário, afixar cartazes sobre os procedimentos a serem adotados em caso de acidente ou incidente grave.
  - II. Todos os trabalhadores estão igualmente expostos a todos os tipos de risco.
  - III. As medidas de precaução padrão deverão ser empregadas sempre que houver uma situação iminente de risco.
  - IV. A NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em estabelecimentos de assistência à saúde.
- A) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras.  
B) Apenas as alternativas I, III e IV são verdadeiras.  
C) Apenas as alternativas III e IV são verdadeiras.  
**D) Apenas as alternativas I e IV são verdadeiras.**  
E) Apenas as alternativas II, III e IV são verdadeiras.

9. Segundo as determinações das V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, a medida da pressão arterial (PA) deve ser realizada em toda avaliação de saúde por profissionais devidamente treinados. O método mais utilizado para medida da PA na prática clínica é o indireto, com técnica auscultatória e esfigmomanômetro de coluna de mercúrio ou aneroide, devidamente calibrado. Para que se evite a interferência nos resultados orienta-se que:

- I. Todos os equipamentos deverão ser calibrados a cada seis meses.
- II. O paciente deverá ser orientado para esvaziar a bexiga antes da verificação.
- III. Deve-se posicionar o braço na altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou 4º espaço intercostal), apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido.
- IV. A determinação da pressão arterial sistólica se faz pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), que é um som fraco seguido de batidas regulares.

- V. A largura da bolsa de borracha, manguito, deve corresponder de 80 a 100% da circunferência do braço enquanto que o comprimento deverá ser suficiente para envolver 40% a 80%.

- A) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas.  
B) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas.  
C) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.  
D) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.  
**E) Apenas as alternativas I, III, IV e V estão corretas.**

10. Um paciente de 32 anos de idade foi admitido para tratamento hospitalar de alcoolismo. Começou a beber quando tinha 15 anos de idade. Durante os anos de consumo de álcool a quantidade ingerida aumentou. Ele e sua esposa relatam que nos últimos cinco anos ele consumiu no mínimo meio litro de uísque por dia, também bebe cerveja e vinho. Tem bebido às escondidas no trabalho e sua eficiência começou a diminuir. O patrão lhe aconselhou a procurar tratamento ou ele seria despedido. Esta é a sua segunda semana de tratamento. Na primeira semana ele passou por uma desintoxicação sem maiores complicações. O paciente afirma que não tem problemas com o álcool e que pode lidar com a bebida melhor do que qualquer pessoa que conhece. O mecanismo de defesa que ele está usando é:

- A) Projeção.  
B) Deslocamento.  
C) Racionalização.  
D) Simbolismo.  
**E) Negação.**

11. Em relação à obesidade, podemos afirmar:

- I. A abordagem nutricional do paciente com obesidade deve ser exclusivamente individual devido ao fato da família não ter influência no resultado do tratamento
- II. É um problema de saúde coletiva que vem aumentando acentuadamente em todos os níveis sociais, em todas as faixas etárias e em pessoas de ambos os sexos.
- III. Estudos demonstram que a transição nutricional (mudança de hábitos alimentares) e a mudança no estilo de vida da comunidade não contribuem para o desenvolvimento da obesidade.
- IV. A obesidade pode ser definida como uma síndrome de alterações fisiológicas, bioquímicas, metabólicas, anatômicas, psicológicas e sociais, caracterizada pelo aumento do tecido adiposo, com consequente acréscimo do peso corporal.
- V. A nutrição excessiva na infância pode ser causa provável de obesidade.



- A) Estão corretas somente as alternativas I, II e V.  
B) Estão corretas somente as alternativas III, IV e V.  
**C) Estão corretas somente as alternativas II, IV e V.**  
D) Estão corretas somente as alternativas I, IV e V.  
E) Estão corretas somente as alternativas II, III e IV.

12. A Vigilância epidemiológica é um processo sistemático de:

- A) Notificação de doenças e/ou agravos, consolidação dos dados e/ou análise das informações.  
**B) Coleta de dados, consolidação e análise dos dados, distribuição da informação, devidamente analisada, acrescida de recomendações técnicas visando a medidas de controle de doenças específicas.**  
C) Notificação de morbidade, preparação de tabelas, gráficos, diagramas e distribuição das informações coletadas.  
D) Investigação de casos, cálculo de taxas de incidência e prevalência e distribuição da informação.  
E) Envio dos instrumentos de coleta de notificação, que deve ser feito mesmo na ausência de casos, configurando-se o que se denomina notificação negativa, que funciona como um indicador de eficiência do sistema de informações.

13. Assinale (V) para **verdadeiro** e (F) para **falso** em relação à vacinação:

- ( ) O volume correspondente a cada dose de BCG (*Bacilo de Calmette-Guérin*) é de 0,1 ml.  
( ) Entre as doenças que geralmente determinam imunidade permanente cita-se a coqueluche.  
( ) O volume correspondente a cada dose de BCG (*Bacilo de Calmette-Guérin*) é de 0,5 ml.  
( ) Na imunidade ativa, o organismo adquire o estado imunitário pela formação de抗ígenos.  
( ) Rotineiramente se aplica a vacina antitetânica no período pré-natal.

Marque a alternativa CORRETA:

- A) F- V- F- F- V  
**B) V- V- F- F- V**  
C) V- V- F- V- V  
D) V- F- F- F- V  
E) V- V- F- F- F

14. Nas afirmativas abaixo, marque (V) para as **verdadeiras** e (F) para as **falsas**:

- ( ) Para Bodachne (1998), gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento em seus múltiplos aspectos.

- ( ) O processo de envelhecimento é semelhante em todas as pessoas e independe do seu estilo de vida.  
( ) No envelhecimento um dos primeiros sinais visíveis são os cabelos brancos.  
( ) Senilidade é o processo normal de envelhecimento.  
( ) Paciência, tolerância e continência são características importantes para o profissional que trabalha com idosos.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) V- V- F- V- V  
B) F- V- V- F- F  
**C) V- F- V- F- V**  
D) F- F- V- F- V  
E) V- F- F- V- V

15. Após uma infância feliz, uma menina de treze anos está tendo uma adolescência difícil. Ela cresceu 15 cm no último ano e desenvolveu grandes seios. Certo dia ela procurou a enfermeira da escola em lágrimas, depois que alguns meninos de sua classe a ridicularizaram e a intimidaram. A garota ficou tão afetada pelo incidente que se retrai e seu desenvolvimento escolar se torna menos efetivo. Com base nessas informações, a enfermeira escolar concluiria que essa aluna está apresentando que tipo de crise?

- A) Combinação de situacional e de desenvolvimento.  
**B) De desenvolvimento-maturação.**  
C) De desenvolvimento-transição.  
D) De situação-vítima.  
E) Apenas situacional.

16. Considere as seguintes afirmativas:

- I. Em relação às questões que envolvem a segurança, em cada um dos processos que compõem o sistema de medicação, um estudo brasileiro apontou que 39% dos eventos adversos ocorreram no processo de prescrição de medicamentos.
- II. O perfil dos pacientes vem mudando ao longo dos anos em função principalmente do advento dos laboratórios de intervenção hemodinâmica e das doenças crônicas.
- III. Situações que geram ansiedade e tensão, provocadas pela elevada responsabilidade, não fazem parte do cotidiano da enfermagem.

Assinale a alternativa **CORRETA**:



<p>A) Todas as alternativas são falsas. B) Somente a alternativa III é falsa. C) Todas as alternativas são verdadeiras. D) Somente a alternativa I é verdadeira. E) Somente as alternativas I e III são verdadeiras.</p>	<p>19. O Conceito de Vigilância à Saúde é:</p> <p>A) Prática sanitária que organiza os processos de trabalho em saúde sob a forma de operações, confrontando problemas de enfrentamento contínuo num determinado território, articulando as operações de saúde em três grandes grupos de atividades, que englobam a promoção da saúde, a prevenção das enfermidades e a atenção curativa. B) Uma nova formulação política e organizacional, para reordenamento dos serviços e ações de saúde, estabelecida pela Constituição de 1988; não é um serviço ou uma instituição, é um conjunto de unidades, de serviços e ações que interagem para um fim comum. C) Toda situação encontrada no território estudado, que, sob o ponto de vista (valores, padrões) do ator social (equipe, população, governo) não deveria estar acontecendo. D) Não é só o espaço natural ou geográfico, que está dado e que está completo, mas também um espaço em permanente construção, produto de uma dinâmica social, com características econômicas, políticas, culturais e epidemiológicas, que configuram uma realidade de vida e saúde. E) Probabilidade de ocorrência de um determinado evento a partir da ocorrência desse evento em um passado recente: o número de vezes em que o evento ocorreu dividido pelo número potencial de eventos que poderiam ter ocorrido.</p>
<p>17. Ao ajudar uma criança com retardo mental leve a moderado a desenvolver relações satisfatórias com os outros, qual das seguintes intervenções de enfermagem é a mais apropriada?</p> <p>A) Estabelecer limites ao comportamento socialmente inadequado. B) Interpretar o comportamento da criança para os outros. C) Deixar a criança comportar-se espontaneamente, pois ela não tem conceito de certo ou errado; D) Esta criança não é capaz de estabelecer relações sociais. E) Evitar relacionamentos sociais, isolando a criança para protegê-la.</p>	
<p>18. O papel do profissional de enfermagem em relação aos cuidados com a família, na abordagem atual do Programa de Saúde da Família, é:</p> <p>I. Fortalecê-la e orientá-la quando ela se encontra fragilizada. II. Abordá-la de forma tradicional, isto é, com enfoque medicalizador de corpos doentes. III. Considerar a percepção de seus membros sobre o processo saúde-doença somente individualmente. IV. Considerar que a família nada mais é do que um agrupamento de pessoas consanguíneas. V. Considerar que as manifestações do cuidado na dinâmica familiar se dão por meio da presença, inclusão, promoção da vida e bem-estar, assim como pela proteção e orientação para a vida.</p>	<p>20. Planejamento como instrumento básico do cuidar em enfermagem é:</p> <p>A) Meio que conduz a formação de um corpo de conhecimentos, por meio da elaboração organizada e formal de uma determinada questão, com verificação e análise dos resultados de fenômeno observado. B) Capacidade intelectual encontrada em todas as atividades humanas, sejam elas técnicas, econômicas ou científicas. Tendência natural que impele o indivíduo à autorrealização. C) Processo intelectual que determina conscientemente um curso de ações, baseado em objetivos, fatos e estimativas. É prescrever o futuro, traçar um programa de ação, determinando as metas que se pretende atingir, buscando as melhores estratégias e reformulando o plano conforme necessidade. D) Competência de diversas habilidades motoras que envolvem operações mentais denominadas habilidades psicomotoras. E) Atividade metodológica e processual de interpretação e julgamento de dados qualitativos e quantitativos para a atribuição de valor em padrões e critérios predeterminados.</p>
<p>Em relação às afirmações acima assinale a alternativa <b>CORRETA</b>:</p> <p>A) Somente as alternativas I e II são verdadeiras. B) Somente as alternativas I e III são verdadeiras. C) Somente as alternativas I e IV são verdadeiras. D) Somente as alternativas II e IV são verdadeiras. E) Somente as alternativas I e V são verdadeiras.</p>	



21. Quanto aos cuidados com a terapia medicamentosa, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Medidas educativas voltadas à cultura não punitiva dos profissionais devem ser implementadas, garantindo assim que o produto seja eficaz e seus efeitos nocivos conhecidos, favorecendo segurança no processo de administração do medicamento em todas as suas etapas.
- B) A educação permanente dos profissionais é responsabilidade coletiva (somente da instituição).
- C) Tradicionalmente, a ocorrência de eventos adversos na terapia medicamentosa recai, quase que exclusivamente, sobre o médico.
- D) A realização de capacitações permanentes aos profissionais de saúde sobre prescrição, dispensa, administração e monitoramento com paciente não faz diferença para diminuir os índices de erros com medicamentos.
- E) Os erros na administração de medicamentos decorrem apenas da distração do profissional.

22. Algumas considerações/ compreensões relacionadas às vivências da enfermagem com as famílias estão enunciadas a seguir:

- I. Trabalhar com famílias se mostra uma das melhores ferramentas para que resultados a médio e a longo prazo sejam alcançados no que diz respeito aos cuidados com a saúde.
- II. A família passou a constituir-se uma importante aliada no planejamento das ações de enfermagem, por ser nesse contexto que as relações são processadas e que as necessidades dos sujeitos são evidenciadas.
- III. Para que as metas do trabalho com a família sejam alcançadas deve haver um compromisso dos profissionais da saúde, ou seja, deve-se buscar conhecimentos e instrumentalização com a família.
- IV. Para se trabalhar com famílias, é necessário compreensão das diferenças culturais, dos valores e das práticas de cada grupo familiar. Além disso, as ações de cuidado devem estar conectadas à realidade vivida pelas famílias.
- V. Para se trabalhar com famílias, é preciso conhecê-las em todas as suas dimensões, mantendo fortalecido o vínculo de confiança, de forma a permitir a troca de conhecimentos e práticas de cuidado que contemplam as características esperadas na construção de um novo modelo de saúde.

Sobre essas considerações/ compreensões posicione-se **CORRETAMENTE**:

- A) Todas as alternativas estão corretas.
- B) Todas as alternativas estão incorretas.
- C) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
- D) Somente as alternativas III, IV e V estão corretas.
- E) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas.

23. Puerpério é o período decorrente da dequitação até a volta do organismo materno à normalidade. Nesse período, a puérpera deve receber atenção contínua a fim de se evitar / detectar qualquer complicação. Considerando as complicações no puerpério, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira:

- I. Infecção puerperal  
II. Ingurgitamento mamário  
III. Mastite  
IV. Deiscência de sutura  
V. Flebite
- ( ) Caracteriza-se pelo excesso de produção láctea e/ou pela deficiência no esvaziamento.  
( ) Abertura de pontos da sutura, podendo ocorrer tanto nos pontos superficiais como nos profundos.  
( ) Processo inflamatório das paredes dos vasos.  
( ) Processo infeccioso agudo das glândulas mamárias, com sintomas sistêmicos como febre, mal-estar geral, astenia, calafrios e prostração, até abscessos e septicemia.  
( ) Infecções que se originam no aparelho genital, após o parto recente.

Assinale a alternativa que apresente a sequência **CORRETA** da coluna da direita, de cima para baixo:

- A) III- IV- I- II- V  
B) III- IV- V- I- II  
C) II- V- I- III- IV  
D) III- IV- V- II- I  
E) II- IV- V- III- I

24. A avaliação da frequência cardíaca fetal é um importante meio de diagnóstico de bem-estar do feto. Por esse motivo- faz-se necessária sua avaliação constante durante a assistência à parturiente. O padrão de normalidade dos batimentos por minuto varia entre os seguintes limites:

- A) 100 e 120 bpm  
B) 120 e 160 bpm  
C) 140 e 160 bpm  
D) 120 e 180 bpm  
E) 140 e 180 bpm



25. Durante o período de 0 a 06 meses- aleitamento materno exclusivo é uma prática de interação e afetividade entre o binômio mãe e filho. Para que o processo da produção do leite materno aconteça com sucesso é necessário:

- A) Que o bebê abocanhe e sugue a aréola materna só quando estiver com vontade; que a mãe tome líquido em média 1-5 de suco ou chá por dia; e assim ocorra a liberação do hormônio da prolactina.
- B) Que o bebê abocanhe a aréola do seio materno; mãe tome líquidos em média 2-5 litros de líquidos por dia; e assim ocorra a liberação do hormônio da prolactina.
- C) Que o bebê abocanhe a aréola do seio materno; mãe tome líquidos em média 2 litros por dia; e assim ocorra a liberação do hormônio da ocitocina.
- D) Que o bebê abocanhe e sugue a aréola do seio materno; mãe tome líquidos em média de 2 litros por dia; e assim ocorra a liberação do hormônio prolactina.
- E) Que o bebê abocanhe a aréola do seio materno; mãe tome líquidos em média 1-5 litros por dia; e assim ocorra a liberação da ocitocina.

26. Uma senhora de 56 anos, mãe de cinco filhos. Nunca trabalhou fora de casa e dedicou sua vida a atender as necessidades do marido e dos filhos, quando o último filho que estava morando em casa, formou-se e foi trabalhar em outro estado, ela tornou-se mais e mais triste, seu marido preocupado levou-a ao centro de saúde mental local. Este tipo de crise é denominado:

- A) Crise de transições de vida esperadas.
- B) Crise disposicional.
- C) Emergência psiquiátrica.
- D) Crise decorrente de um estresse traumático.
- E) Crise de maturação/desenvolvimento.

27. Considerando o processo de envelhecimento assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Devido às alterações que ocorrem com o envelhecimento- o idoso apresenta uma diminuição da tolerância ao calor e ao frio.
- B) No idoso ocorre o aumento da transpiração.
- C) O estresse emocional a que uma pessoa está exposta durante a vida não pode ser considerado como um fator que contribui para a forma como essa pessoa envelhece.

- D) O tecido pulmonar do idoso torna-se mais rígido- porém- a expansão pulmonar permanece sem alteração.
- E) Apesar das alterações decorrentes do envelhecimento- a massa muscular é mantida na pessoa idosa.

28. Assinale **(V)** para **verdadeiro** e **(F)** para **falso**. Em seguida, escolha a alternativa que contemple a combinação que considerar **CORRETA**.

A consulta de enfermagem realizada para crianças no primeiro ano de vida tem como objetivos principais:

- ( ) Monitorar o crescimento e desenvolvimento da criança.
- ( ) Apoiar e incentivar o aleitamento materno.
- ( ) Promover o vínculo mãe e filho.
- ( ) Monitorar a aplicação das vacinas do calendário básico de vacinação.
- ( ) Identificar sinais indicativos de baixo aproveitamento escolar.
- ( ) Incentivar a mãe a demonstrar carinho para a criança durante a realização dos cuidados diários.

- A) V- V- V- V- F- V
- B) V- F- V- V- V- F
- C) V- V- V- V- V- V
- D) V- V- V- F- F- V
- E) V- V- V- F- V- F

29. Em um paciente com colostomia- a prescrição de enfermagem em relação à avaliação da cor-quantidade e consistência do conteúdo da ostomia tem a seguinte justificativa:

- A) Prevenir edema local.
- B) Prevenir contraturas.
- C) Prevenir prejuízo da integridade da pele.
- D) Identificar sangramentos- infecções e obstrução do ostoma.
- E) Prevenir icterícia.



30. Em relação aos hábitos alimentares do idoso- é **CORRETO** afirmar:

- A) Nessa fase não é necessário fazer nenhuma recomendação dietética em relação à água- pois o idoso geralmente apresenta o reflexo da sede bem acentuado- promovendo a hidratação adequada.
- B) A subnutrição- muito comum nessa fase- pode ser causada pela depressão- interação droga-nutriente- perda de renda- difícil acesso aos alimentos- isolamento social- doenças- problemas mentais ou dentais- alcoolismo- desconhecimento sobre uma nutrição adequada.
- C) O idoso deve consumir uma quantidade elevada de carboidratos- lipídios e proteínas para manter seu peso corporal- evitando fibras e carboidratos complexos- que podem alterar o funcionamento do sistema digestório.
- D) Os idosos não devem ingerir alimentos sólidos- visto que a presença de prótese dentária impede que esses alimentos sejam completamente triturados. Por isso- os alimentos devem estar sempre liquidificados para facilitar sua deglutição- digestão e absorção.
- E) Nenhuma das anteriores.

31. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único- organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I. Descentralização- com direção única em cada esfera de governo.
- II. Atendimento integral- com prioridade para as atividades preventivas- sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- III. Participação da comunidade.
- IV. Fiscalização permanente por parte do tecido social.
- V. Financiamento direto- por parte das esferas de governo- e indireto- primordialmente por meio de fundos privados de investimentos e parcerias públicas e privadas (PPP).

Estão **CORRETAS** as diretrizes:

- A) I- III e V- apenas.
- B) I- II e III- apenas.
- C) I- II- III e IV.
- D) II- IV e V- apenas.
- E) II- III- IV e V.

32. Em relação ao conceito de saúde estabelecido na Constituição Brasileira de 1988 - em seu artigo 196 - considere as afirmativas abaixo:

- I. O conceito de saúde é entendido na perspectiva de uma articulação de políticas sociais e econômicas.
- II. A saúde é entendida como direito universal derivado do exercício de uma cidadania plena.
- III. A saúde é compreendida como dever do Estado nas suas três esferas de governo.
- IV. A saúde é entendida como uma responsabilidade do público visando à redução dos riscos de doença.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- B) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- C) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- D) Somente a afirmativa IV é verdadeira.
- E) Somente as afirmativas I- II e III são verdadeiras.

33. A gerência em enfermagem deve contemplar- no processo de trabalho- o trabalhador e o cliente dos serviços de saúde como atores sociais. Para viabilizar essa proposta é necessário:

- A) Ir além das teorias administrativas tradicionais- buscando novos referenciais teóricos para as práticas gerenciais.
- B) Reforçar as teorias da administração clássica e científica- com ênfase nos procedimentos.
- C) Realizar reuniões com a sua equipe e a equipe multiprofissional para informar seus planos- enfatizando seu papel de chefe da equipe.
- D) Realizar reuniões com comunidade para informar as suas decisões.
- E) Ter amplo conhecimento científico e autoridade para a tomada de decisão.

34. A participação popular é um dos princípios do Sistema Único de Saúde. A lei nº8142/90 prevê essa participação em todas as esferas do governo- nas seguintes instâncias: Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde.

O Conselho Municipal de Saúde:



- A) Tem caráter consultivo. Pode contar com a participação de enfermeiras como representantes dos prestadores de serviço público- em número paritário e equivalente ao dos representantes dos usuários e dos serviços privados.
- B) Deve permitir a democratização da saúde. Tem o secretário municipal da saúde como presidente nato e insubstituível- que não poderá delegar essa função a representantes de usuários.
- C) Deve zelar pela proteção dos trabalhadores da saúde. É composto- de forma majoritária- por representantes dos usuários que devem reivindicar assistência médica com qualidade a toda comunidade.
- D) É deliberativo. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde no município e é formado por representantes dos usuários em número equivalente ao dos representantes de outros segmentos.
- E) Assume a responsabilidade sanitária das populações dos territórios bem delimitados- sendo o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde.
35. Para concretização do SUS- várias normas operacionais formam criadas. O Pacto pela Vida é um dos componentes do Pacto pela Saúde e expressa:
- A) O compromisso entre gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população.
- B) Só existe um componente neste pacto- que é a luta em defesa do SUS.
- C) Não existe nenhum pacto na área da saúde. As NOB's continuam regulamentando o SUS
- D) O compromisso entre gestores e comunidade.
- E) O compromisso entre os profissionais da saúde.
36. Em relação à via de administração da vacina- preencha o parênteses com (V), se **verdadeira** a afirmativa e com (F), se **falsa**.
- ( ) A vacina tríplice viral contra sarampo- caxumba e rubéola, monovalente contra sarampo- devem ser administradas por via subcutânea.
- ( ) A vacina BCG deve ser aplicada de forma subcutânea para prevenção de possíveis abcessos.
- ( ) A vacina contra a hepatite B deve ser aplicada na região glútea- visando a uma maior proteção contra a doença.
- ( ) A vacina de rotavírus humano é exclusivamente aplicada via oral.
- Assinale a alternativa que contempla a sequência CORRETA:
- A) F- F- V- V
- B) V- V- F- V
- C) V- F- V- F
- D) F- V- F- V
- E) V- F- F- V
37. C.L.M- menina- sete meses de idade- trazida pela mãe à unidade de saúde para fazer vacinas. Na carteira de vacinação está registrada somente a primeira dose da vacina contra-hepatite B. A mãe refere que não foi possível levar a filha para vacinar. Qual a conduta adequada a ser adotada nesse caso?
- A) Repetir novamente a primeira dose da vacina contra hepatite B- porque passou muito tempo e agendar- para uma semana depois- o início do esquema vacinal contra poliomielite e tetravalente e primeira dose da vacina BCG.
- B) Realizar a segunda dose da vacina contra hepatite B e começar o esquema vacinal contra poliomielite e tetravalente e a primeira dose da vacina BCG.
- C) Realizar a segunda dose da vacina contra hepatite B e agendar, para uma semana depois- o início do esquema vacinal contra poliomielite e tetravalente e da vacina BCG.
- D) Repetir novamente a primeira dose da vacina contra hepatite B e começar o esquema vacinal contra poliomielite e tetravalente e da vacina BCG.
- E) Realizar a segunda dose da vacina contra hepatite B.
38. Um paciente está sendo admitido numa unidade psiquiátrica para o tratamento de um distúrbio depressivo. Durante a avaliação de admissão da enfermeira- o paciente expressa sentimentos de perda de motivação e falta de energia. Além dessas queixas- revela que tem insônia e falta de apetite e que apresentou uma perda de peso de 4-5 kg no último mês.O diagnóstico de enfermagem prioritário para esse cliente seria:
- A) Alteração da nutrição: menos do que as necessidades corporais.
- B) Ajuste individual ineficaz.
- C) Distúrbio da interação social.
- D) Déficit do autocuidado: higiene- aparência pessoal.
- E) Gregária.
39. O cliente em uso de lítio deve certificar-se especificamente de manter uma ingestão adequada de:
- A) Proteínas.
- B) Vitamina K.
- C) Multivitaminas.
- D) Potássio.
- E) Sódio.



40. Uma senhora de 67 anos de idade é levada ao hospital por seu marido. Ele explica que ela vem se mostrando cada vez mais confusa e esquecida. No dia anterior ela desencadeou um incêndio na cozinha, pois colocou carne para fritar saiu e esqueceu-a no fogão. O marido relata que por vezes ela parece bem e às vezes se mostra totalmente desorientada. O médico fez um diagnóstico à admissão de demência, de etiologia desconhecida. A principal prescrição de enfermagem ao trabalhar com essa senhora seria:

- A) Assegurar que o ambiente seja seguro, para evitar lesões.
- B) Assegurar que ela receba o alimento de que gosta, para evitar a fome.
- C) Assegurar que ela encontre os outros pacientes, para evitar o isolamento social.
- D) Assegurar que ela cuide de suas próprias atividades da vida diária, para evitar a dependência.
- E) Assegurar que ela tenha sono tranquilo para evitar o cansaço.



# REDAÇÃO

## PROPOSTA DE REDAÇÃO

Escreva um artigo de opinião- entre 15 e 20 linhas- para ser publicado em jornal ou revista de circulação nacional. Nele você deve posicionar-se **A FAVOR da proibição do fumo em locais públicos ou privados OU CONTRA ela.** Fundamente sua opinião em argumentos consistentes.

## SOBRE A REDAÇÃO

1. Estruture o texto da sua redação com um **mínimo de 15 e um máximo de 20 linhas**.
2. Faça o rascunho no espaço reservado.
3. Transcreva o texto do rascunho para a FOLHA DE REDAÇÃO que lhe foi entregue em separado.
4. Não há necessidade de colocar título.
5. Não coloque o seu nome- nem a sua assinatura na FOLHA DE REDAÇÃO- nem faça marcas nela. A FOLHA DE REDAÇÃO já se encontra devidamente identificada.



# **REDAÇÃO – Rascunho**



EMBRANCO



EMBRAMCO