



## LÍNGUA PORTUGUESA

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 01 à questão 04	0,5	2,5	1,25
Da questão 05 à questão 08	1,0	2,5	2,5
Da questão 09 à questão 10	2,0	2,5	5,0

### Texto I

A educação é uma arma

O brasileiro, principalmente o das grandes cidades, parece viver em pânico. O medo tornou banal desconfiar de crianças em semáforos ou de adultos maltrapilhos que andam pelas ruas.

A cada dia aumenta o número de crimes e criminosos. Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao enxergar quem os ameaça como inimigos a serem eliminados. Muitos defendem a pena de morte. Outros gostam de saber que os marginais estão em condições repugnantes nas prisões em que são lançados. Mas, os piores são os que acham impossível regenerar um homem.

Victor Hugo advertiu: "Quem abre uma escola fecha uma prisão". Muito antes, Pitágoras conclamou: "Educar crianças, para que não seja necessário castigar os adultos". Não é, portanto, nenhuma novidade, nem tampouco absurdo, exigir que se invista cada vez mais em educação. É ela que arrebenta grades, abre portas e liberta todos nós.

(Revista Educação, out.1999. Adaptado)

#### 01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Com base no texto acima, o título do texto I "A educação é uma arma" apresenta-se em qual figura de linguagem?

- Metáfora.
- Catacrese.
- Metonímia.
- Onomatopeia.

#### 02. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Assinale a alternativa em que todas as palavras ou expressões recuperam, por coesão textual, o fato da advertência do escritor Vitor Hugo no texto I.

- liberdade, impaciência.
- impossibilidade, interesse.
- vontade, liberdade.
- solidariedade, condenação

#### 03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Segundo o Texto I, a pior forma de se observar os criminosos é:

- não tem como mudar a forma como eles levam a vida.
- são pessoas a serem dizimadas da sociedade.
- é muito melhor vê-los nas prisões.
- o pânico que acontece na sociedade é culpa deles.

#### 04. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A expressão "parece viver em pânico", na primeira e na segunda linha do texto significa que:

- As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a criminalidade.
- Os grandes filósofos já alertavam para a teoria do pânico na vida das pessoas.
- Viver em grandes cidades transforma o cotidiano em um transtorno geral.
- Cada dia, mais e mais pessoas estão enfrentando problemas no cotidiano.

#### 05. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Na oração "Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao enxergar" A partir dos estudos gramaticais podemos dizer que o termo destacado se refere a:

- Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.
- Oração Subordinada Substantiva Subjetiva.
- Oração Coordenada Sindética Explicativa.
- Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.

#### 06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Na oração: Dentre eles, 86% fazem isso, mesmo durante o período de pânico. Substituindo 86% por 1% flexionando o verbo FAZER no pretérito imperfeito do indicativo, obter-se-á:

- 1% fará.
- 1% farão.
- 1% fazia.
- 1% faziam.

#### 07. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Assinale a alternativa que apresenta palavra em sentido conotativo.

- Não será preciso castigar os adultos.
- Vários pensadores falaram sobre a criminalidade.
- É o ensino que arrebenta as grades.
- Muitos querem a pena de morte.

#### 08. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Atribuir-se-á o emprego de dois-pontos, em "Um poeta é sempre irmão do vento e da água: deixa seu ritmo por onde passa." (Cecília Meireles). A intenção é de anunciar:

- uma explicação;
- um esclarecimento;
- um vocativo;
- uma citação.

**09. (Fundelta)** (Valor da questão 2,0)

No fragmento de texto "Temos de cobrar dos deputados e senadores as leis necessárias para punir esses assassinos. Das autoridades do trânsito, fiscalização e multas vigorosas para quem desobedece às leis e à sinalização. E da justiça, rapidez e dureza com os infratores." (Nicole Puzzi, Veja 1280, ano 26, nº 12) Empregam-se as vírgulas para:

- a) separar termos coordenados;
- b) separar as orações adjetivas;
- c) isolar orações intercaladas;
- d) **indicar a supressão do verbo.**

**10. (Fundelta)** (Valor da questão 2,0)

O segmento sublinhado pode-se substituir, sem prejuízo para a correção e o sentido do texto em:

- a) O grupo que abrange os seis países mais ricos por onde se abarcam.
- b) São carentes de propostas políticas por imunes a.
- c) Sob a direção de Capangas o movimento foi declaradamente ilegal por em cuja direção.
- d) **E sobra-me uma raiva que deve valer a dos mais radicais interesses por talvez equivalha à.**

**CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE ENFERMEIRO POSTO DE SAÚDE**

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 11 à questão 22	0,5	2,5	1,25
Da questão 23 à questão 34	1,0	2,5	2,5
Da questão 35 à questão 40	2,0	2,5	5,0

**11. (Fundelta)** (Valor da questão 0,5)

Sobre a lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é correto afirmar, EXCETO:

- a) **A Conferência de Saúde reuni-se a cada dois anos com a representação dos vários seguimentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as futuras diretrizes.**
- b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASENS) terão representações no Conselho Nacional de Saúde.
- c) É responsabilidade do Conselho de Saúde a formulação de estratégias e controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- d) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências serão paritárias em relação ao conjunto dos demais seguimentos.

**12. (Fundelta)** (Valor da questão 0,5)

Assinale a alternativa que apresenta o evento no qual foram aprovadas as teses que podem ser consideradas como marco do processo de reforma sanitária brasileira.

- a) **VIII Conferência Nacional de Saúde.**
- b) II Conferência Nacional de Saúde.
- c) IX Conferência Nacional de Saúde.
- d) VII Conferência Nacional de Saúde.

**13. (Fundelta)** (Valor da questão 0,5)

De acordo com a Norma Operacional de Assistência a Saúde 01/2002, constitui-se responsabilidade dos municípios em gestão plena da atenção básica ampliada:

- a) gerenciar todas as unidades ambulatoriais públicas existentes em seu território.
- b) **elaborar o plano municipal de saúde e o relatório de gestão.**
- c) organizar toda a rede de atenção básica com exceção dos prestadores privados.
- d) manter o controle das doenças desde que enquadradas como transmissíveis.

**14. (Fundelta)** (Valor da questão 0,5)

O Pacto pela Vida portaria GM/MS 399, que integra o Pacto pela Saúde 2006, prevê como um dos seus objetivos a execução de programas voltados para a assistência ao:

- a) câncer de pele.
- b) **câncer de colo do útero.**
- c) câncer de pulmão.
- d) câncer de próstata.

**15. (Fundelta)** (Valor da questão 0,5)

De acordo com a classificação das doenças, elas podem ser divididas em emergentes, reemergentes e permanentes. Indique a alternativa em que as doenças aparecem nessa sequência de classificação.

- a) Tuberculose, AIDS e febre amarela.
- b) AIDS, hanseníase e dengue.
- c) Febre amarela, tuberculose e hantavirose.
- d) **AIDS, tuberculose e hanseníase.**

**16. (Fundelta)** (Valor da questão 0,5)

O indicador que expressa "O maior ou menor poder que uma determinada doença tem de provocar a morte daqueles que adquirem esta enfermidade, em um determinado intervalo de tempo", é:

- a) Fatalidade.
- b) Mortalidade.
- c) **Letalidade.**
- d) Virulência.

17. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A raiva continua sendo um problema de Saúde Pública nos países em desenvolvimento, principalmente a transmitida por cães e gatos, mantendo a cadeia de transmissão animal doméstica/homem. Sobre raiva, é correto afirmar, EXCETO:

- a) O vírus rábico é neurotrópico com ação no sistema nervoso central, causando um quadro clínico de encefalite aguda.
- b) O variável período de incubação esta relacionado à localização, gravidade do ferimento (mordedura, arranhura e lambedura) e concentração de partículas virais inoculadas.
- c) **É considerado caso confirmado todo aquele que apresenta quadro clínico sugestivo de encefalite rábica, com antecedentes ou não de exposição ao vírus rábico.**
- d) No Brasil, em 2008, um paciente após suspeita clínica, foi iniciado o protocolo de Milwaukee adaptado a realidade Brasileira, resultando no primeiro registro de cura de raiva humana .

18. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Paciente com o Índice de Massa Corporal – IMC de 26,5 apresenta, segundo o critério de classificação da Organização Mundial de Saúde, em condição de peso:

- a) normal.
- b) **sobrepeso.**
- c) obeso classe I.
- d) obeso classe II.

19. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Ao executar um procedimento sem conhecimento técnico científico, o profissional esta expondo o paciente a danos decorrentes de:

- a) omissão.
- b) dolo.
- c) **imperícia.**
- d) imprudência.

20. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Relacione as colunas:

- I- direitos.
  - II- responsabilidades.
  - III- deveres.
  - IV- proibições.
- ( ) negar assistência de enfermagem em caso de urgência e emergência.
  - ( ) respeitar o ser humano em situação de morte e pós-morte.
  - ( ) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
  - ( ) assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
  - ( ) ser informado sobre o diagnostico provisório ou definitivo de todos os clientes que estejam sob sua responsabilidade
- a) **IV, III, I, II, I.**
  - b) III, II, I, IV, I.
  - c) I, III, II, IV, II.
  - d) IV, III, I, IV, II.

21. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Criança de 10 anos deu entrada no setor de emergência vítima de queimadura por leite quente. No exame físico, apresenta eritema, edema e flictemas na região do braço. Essas características classificam a queimadura dessa criança como sendo de:

- a) 1º grau.
- b) **2º grau.**
- c) 3º grau.
- d) 4º grau.

22. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

De acordo com o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, é critério fundamental para o acompanhamento pré-natal, a solicitação dos seguintes exames, EXCETO:

- a) grupo sanguíneo e fator Rh.
- b) glicemia de jejum e sorologia para hepatite B (HBsAg).
- c) **paracitológico de fezes e cultura de urina.**
- d) sorologia para toxoplasmose e teste anti-HIV.

23. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Recém-nascido, filho de mãe diabética encontra-se letárgico, hipotônico com episódios de tremores e abalos. Requer pronta intervenção do enfermeiro, pois apresenta características de:

- a) cetoacidose diabética.
- b) hiperglicemia.
- c) crise convulsiva.
- d) **hipoglicemia.**

24. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

A heparina, adicionada ao líquido dialisador durante hemodiálise, tem como objetivo:

- a) evitar a oclusão do cateter.
- b) acelerar a absorção da albumina.
- c) aumentar a permeabilidade capilar.
- d) aumentar a quantidade de sódio perdido durante hemodiálise.

25. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Uma solução de 300ml de soro fisiológico a 0,9% deverá ser administrado a 50ml /hora. Calcule o número de microgotas e o tempo necessário em horas, para que essa solução seja administrada.

- a) 100mic/min em 4 horas .
- b) 50mic/min em 5 horas.
- c) 35mic/ min em 5horas.
- d) 50mic/ min em 6 horas.

26. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Pode ser caracterizado como aspecto clínico de dengue, EXCETO:

- a) Febre alta (39°C a 40°C), cefaléia e adinamia.
- b) Mialgia e artralgia.
- c) Niastigmo e presença ou não de prurido.
- d) Metrorragia e petéquias.

27. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

A indicação da adrenalina como medicamento utilizado em Parada Cardio-Respiratória (PCR) é:

- a) Administrar a pacientes em parada cardíaca causada por taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e assistolia ou atividade elétrica sem pulso.
- b) Administrar a todos os pacientes com isquemia aguda ou suspeita de hipoxemia, incluindo aqueles com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).
- c) Administrar a pacientes com bradicardia sintomática, contração ventricular prematura e sintomas de isquemia.
- d) Administrar para corrigir acidose metabólica.

28. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Considerada mundialmente como medida primária, a higienização das mãos desempenha importante papel no controle de infecções relacionadas à assistência a saúde. Sobre higienização das mãos, é correto afirmar, EXCETO:

- a) Na assistência a pacientes colonizados e/ou infectados com bactérias multirresistentes, a higienização das mãos podem ser feitas com vários anti-sépticos e sabonetes associados a anti-sépticos, como clorexidina, polivinilpirrolidona-iodo (PVPI), triclosan e álcool.
- b) A higienização das mãos com sabonete líquido favorece a remoção da microbiota transitória, tornando as mãos limpas.
- c) O álcool a 70% apresenta rápida velocidade de ação e baixo efeito residual. A clorexidina a 4% apresenta efeito residual e raras reações alérgicas.
- d) O termo Lavagem das Mãos foi substituído por Higienização das Mãos, por ser mais abrangente, dependendo do objetivo a técnica pode ser: Higienização simples, Higienização séptica, Fricção de antisséptico e Antissepsia cirúrgica.

29. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

A Doença de Chagas apresenta vários modos de transmissão, EXCETO:

- a) Sexual.
- b) Oral.
- c) Vertical.
- d) Transfusional.

30. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Após a utilização de artigos de assistência respiratória, considerados semicríticos, o Enfermeiro deverá submetê-los a desinfecção de alto nível ou esterilização. É correto afirmar, EXCETO:

- a) O tempo de exposição ao hipoclorito de sódio varia de acordo com a carga microbiana, quanto mais contaminada, maior o tempo de exposição.
- b) O hipoclorito de sódio é o desinfetante recomendado para artigos que não contenham componentes metálicos.
- c) Alto poder germicida, baixo custo e baixa toxicidade são características do hipoclorito de sódio
- d) A permanência do artigo por 30 minutos no hipoclorito de sódio a 10.000 ppm e de 60 minutos no hipoclorito de sódio a 200 ppm, possibilitam a desinfecção.

31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Nos Sinais Vitais, a temperatura corporal equivale ao grau de calor que o corpo humano apresenta. Na hipertermia em que a temperatura corpórea aumenta em algum momento durante o dia, mas em 24 horas retorna ao normal é chamada:

- a) **Hipertermia Intermitente**
- b) Hipertermia Maligna
- c) Hipertermia Recorrente
- d) Hipertermia Remitente

32. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

São complicações transfusionais mais comuns e potencialmente graves, EXCETO:

- a) Reação febril não hemolítica.
- b) Reação hemolítica aguda.
- c) Contaminação bacteriana.
- d) **Sobrecarga pulmonar.**

33. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

No controle das infecções hospitalares, classifica-se a limpeza hospitalar como, EXCETO:

- a) Limpeza concorrente.
- b) **Limpeza transitória.**
- c) Limpeza terminal.
- d) Limpeza de manutenção.

34. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Durante o período de internação, J.J. apresentou crise convulsiva. O Enfermeiro da unidade prestou assistência correta após a convulsão realizando cuidados, EXCETO:

- a) **Manteve o paciente em decúbito dorsal.**
- b) Manteve oxigênio disponível.
- c) Manteve aspirador disponível
- d) Deixou as grades laterais elevadas.

35. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Dos distúrbios hidroeletrólíticos que acontecem na prática clínica, e que precisam ser corrigidos, a hipernatremia caracteriza-se pelo aumento sérico de:

- a) Cálcio.
- b) **Sódio.**
- c) Potássio.
- d) Magnésio.

36. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Sobre a vacina pneumocócica 10 conjugada, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Essa vacina protege a criança de bactérias tipo pneumococo, que causam doenças graves como meningite, pneumonias, otite média aguda, sinusite e bacteremia.
- b) **A vacina é administrada em duas doses e mais um reforço. A primeira dose é oferecida no segundo mês de vida e a próxima aos quatro meses de vida, sendo o reforço aos 12 meses.**
- c) O intervalo entre as doses é de 60 dias e mínimo de 30 dias.
- d) Administrar reforço preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade.

37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

A NR-32 no quesito de riscos biológicos, determina que o empregador deve vedar, EXCETO:

- a) O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato no trabalho.
- b) **A guarda de alimentos em locais destinados para este fim.**
- c) O uso de calçados abertos.
- d) O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.

38. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

A Escala de Coma de Glasgow permite avaliar o nível de consciência em pacientes com trauma craniano. São parâmetros utilizados:

- a) Respostas de abertura ocular, capacidade motora e cognitiva.
- b) Respostas de abertura ocular, fala e resposta a dor.
- c) **Respostas de abertura ocular, fala e capacidade motora.**
- d) Respostas de abertura ocular, capacidade motora e resposta a dor.

39. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Caracteriza-se por postura descerebrada o paciente que apresenta como resposta postural anormal de estímulo:

- a) **Extensão e rotação externa dos membros superiores e flexão plantar dos pés.**
- b) Adução e flexão dos membros superiores, rotação interna dos membros inferiores e flexão plantar dos pés.
- c) Extensão dos membros superiores e rotação interna dos membros inferiores.
- d) Adução e flexão dos membros superiores.

**40. (Fundelta)** (Valor da questão 2,0)

No manejo do paciente com diarreia, o plano de tratamento para prevenir a desidratação da criança que apresenta o estado geral irritado e inquieto, sedento, bebendo avidamente e com enchimento capilar prejudicado deverá ser:

- a) Plano A.
- b) **Plano B.**
- c) Plano C.
- d) Plano D.