

LEGISLAÇÃO DO SUS

- 01.** O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, publicou em 2006 a Política Nacional de Promoção da Saúde. São ações prioritárias dessa Política:
- A) incentivo à amamentação, campanha de prevenção as DST/aids, prevenção e controle do tabagismo
 - B) alimentação saudável, redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito
 - C) redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, estímulo a atividade física e redução de gravidez na adolescência
 - D) promoção do desenvolvimento sustentável, controle da obesidade infanto-juvenil, redução da mortalidade infantil
- 02.** O financiamento das ações básicas de saúde se dá pelo Piso de Atenção Básica (PAB), composto por uma parte fixa e outra variável. Os investimentos aplicados por meio do PAB variável têm por objetivo:
- A) estimular a implantação de estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção à saúde
 - B) ampliar o montante de recursos destinados à qualificação da média e da alta complexidade
 - C) financiar ações de saúde em municípios de pequeno porte
 - D) assegurar a autonomia dos municípios na sua utilização
- 03.** A estratégia de Saúde da Família tem como objetivo central a reorientação da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde. São princípios dessa estratégia:
- A) ter caráter complementar em relação à atenção básica, realizar cadastramento das famílias e atuar de forma intersetorial
 - B) desenvolver atividades com base no diagnóstico situacional, ter como foco o indivíduo e buscar parcerias para as ações de saúde
 - C) dirigir as ações aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade, priorizar as ações recuperadoras e manter postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da população
 - D) atuar no território, ofertar cuidado longitudinal e ser um espaço de construção da cidadania
- Sobre as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde, publicadas pelo Ministério da Saúde no ano de 2006, responda às questões de números 4 a 7**
- 04.** É uma diretriz e uma ação do Pacto em Defesa do SUS, respectivamente:
- A) expressar os compromissos entre gestores do SUS com a consolidação da Reforma Sanitária Brasileira; implantar serviços de atenção domiciliar
 - B) desenvolver e articular ações que visem assegurar o SUS como política pública; publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
 - C) garantir financiamento de acordo com as necessidades do SUS; apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas
 - D) articular e apoiar a mobilização social pela promoção da cidadania; reorganizar o processo de acolhimento nas unidades de saúde
- 05.** “O Pacto pela Vida é o compromisso entre gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.” São prioridades pactuadas:
- A) saúde bucal; controle do câncer do colo de útero e da mama; fortalecimento da atenção básica
 - B) redução da mortalidade infantil e materna; controle da dengue, tuberculose e malária; controle de hipertensão e diabetes
 - C) promoção da saúde; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias; saúde do idoso
 - D) aumento da produção de imunobiológicos; redução da transmissão vertical do HIV; atenção às doenças negligenciáveis
- 06.** É diretriz para o trabalho da Educação na Saúde:
- A) ampliar a compreensão dos conceitos de formação e educação permanente para adequá-los às distintas lógicas e especificidades
 - B) capacitar recursos humanos do SUS para a difusão de informações sobre prevenção de doenças e auto-cuidado
 - C) considerar a Educação Continuada como a estratégia de formação e de desenvolvimento de trabalhadores para o setor
 - D) centrar o planejamento e o acompanhamento das atividades educativas em saúde com vistas à aquisição de conhecimentos e mudança de hábitos

- 07.** Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de saúde oferecidos para um determinado território, é objetivo da:
- descentralização
 - universalização
 - regionalização
 - hierarquização
- 08.** De acordo com a Lei 8.142/90, o segmento que tem representação paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos participantes dos Conselhos e das Conferências de Saúde é o dos:
- profissionais de saúde
 - usuários
 - representantes do governo
 - prestadores de serviço
- 09.** O significado da expressão “concepção ampliada de saúde”, que marca conceitualmente a Política Nacional de Promoção de Saúde, é o de que:
- a saúde e o adoecimento refletem as escolhas individuais, mais que o acesso aos cuidados e as tecnologias médicas
 - a saúde e a doença são um binômio inseparável, determinando necessidades curativas
 - a saúde envolve tanto aspectos físicos como os processos mentais, singulares em cada sujeito
 - o processo saúde-doença não é somente resultante da vontade dos sujeitos e/ou comunidades, mas expressa o contexto da própria vida
- 10.** De acordo com a Lei 8.080/90, pode-se afirmar que é competência da direção nacional do SUS:
- executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária
 - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde
 - participar na formulação e na implementação de políticas relativas às condições e aos ambientes de trabalho
 - acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada

ESPECÍFICO DO CARGO

- 11.** A patologia que mais frequentemente está relacionada com a falência intestinal é:
- enterocolite necrotizante
 - gastroquise
 - volvos
 - doença de Hirschsprung
- 12.** Segundo revisão de espécies patológicas por Beckwith em 1978 e em 1983, foi observado que o hiper cromatismo de núcleo celular aumentado, além de múltiplas figuras mitóticas, confirmam o diagnóstico de anaplasia microscópica. Com base no referido estudo, o tumor cujo fator de prognóstico é desfavorável é o:
- neuroblastoma
 - tumor de Wilms
 - disseminoma
 - rabdomiossarcoma
- 13.** São constituídos por microadenomas, consistindo apenas em criptas displásicas (03 a 04) com estrutura tubular:
- polipose adenomatosa familiar
 - pólipos juvenil ou de retenção
 - pólipos juvenil isolado
 - síndrome polipose juvenil
- 14.** A associação de polipose adenomatosa familiar e achados extracolônicos como osteomas, fibromas e cistos epidermóides constitui a síndrome de:
- Turcot
 - Peutz-Jeghers
 - polipose juvenil difusa
 - Gardner
- 15.** O tipo de afecção intestinal que mais se associa à síndrome de Down é:
- obstrução duodenal
 - atresia pré-pilórica congênita
 - estenose hipertrófica do piloro
 - obstrução jejunal
- 16.** Constitui a malformação mais frequentemente associada às onfalocelos:
- atresia jejunileal
 - síndrome de Simpsom-Golabi-Behmel
 - duplicação duodenal
 - pentalogia de Cantrel
- 17.** O acesso cirúrgico correto para curar uma fístula em H traqueoesofágica é:
- transesternal
 - cervical-supraclavicular
 - toracotomia póstero-lateral
 - toracotomia ântero-lateral

18. O aspecto macroscópico da fenda cervical mediana tem a seguinte característica:
- A) lesão Cervical mediana em fita longitudinal com tubérculo distal
 - B) lesão cervical mediana em fita longitudinal sem fístula cega distal
 - C) lesão cervical mediana em fita longitudinal com fístula cega proximal
 - D) lesão cervical mediana em fita longitudinal com tubérculo proximal
19. A localização mais freqüente do teratoma, no recém-nascido, é:
- A) cervical
 - B) mediastinal
 - C) sacrococcígea
 - D) retroperitonal
20. Uma disseminada intravascular coagulopatia pode ocorrer com extensivas malformações venosas. Essa condição, que pode ocorrer nos grandes hemangiomas, é:
- A) acentuada plaquetopenia com tempo de protrombina normal
 - B) Kassabach-Merritt fenômeno
 - C) acentuada leucocitose
 - D) trombocitose
21. O sinal radiológico importante no diagnóstico diferencial entre o enfisema lobar congênito e o pneumotórax hipertensivo é:
- A) estruturas mediastínicas mais visualizadas
 - B) identificação da trama pulmonar no interior da imagem hipertransparente do lobo insuflado
 - C) abaixamento da imagem do diafragma
 - D) desvio do mediastino para o lado oposto ao afetado
22. A afecção na qual o suor apresenta elevados níveis de eletrolíticos é:
- A) íleo meconial
 - B) hiperplasia supra-renal congênita
 - C) peritonite meconial
 - D) síndrome da rolha meconial
23. Diante de um caso de enfisema lobar congênito, a cirurgia de escolha é:
- A) ressecção segmentar
 - B) plástica brônquica
 - C) pneumectomia
 - D) lobectomia
24. Uma criança do sexo masculino com 25 dias de vida aparece com infecção urinária, níveis elevados de uréia, urina saindo em poucas gotas e sinal radiológico do "guarda-chuva". O quadro é indicativo de:
- A) divertículo vegical
 - B) ureterocele
 - C) válvula de uretra posterior
 - D) bexiga neurogênica
25. A hérnia diafragmática de Bochdalek está muito freqüentemente associada à:
- A) *Pectus carinatum*
 - B) hipoplasia pulmonar
 - C) seqüestração pulmonar
 - D) *Pectus excavatum*
26. É um tumor bastante freqüente em recém-nascidos:
- A) neuroblastoma
 - B) Rabdiossarcomas de bexiga
 - C) sarcoma de células claras
 - D) carcinoma de testículo
27. A redução de invaginação intestinal é considerada bem-sucedida quando o clister opaco mostra:
- A) visualização do apêndice cecal
 - B) preenchimento total do colo pelo contraste
 - C) desaparecimento da massa abdominal palpável
 - D) franco refluxo do contraste para o delgado
28. A forma mais freqüente de hiperplasia supra-renal congênita consiste na deficiência de :
- A) 11-beta-hidroxilase
 - B) 17-hidroxilase
 - C) 21-beta-hidroxilase
 - D) aldosterona
29. No exame histopatológico, a presença das células de Reed-Sternberg evidencia:
- A) linfoma Hodgkin
 - B) linfoma não-Hodgkin
 - C) tumor de Wilms
 - D) tumor disgerminoma
30. Peritonite meconial ocorre quando a perfuração intestinal se dá:
- A) logo após o nascimento
 - B) logo após o primeiro mês de vida
 - C) ainda no período lactente
 - D) ainda na vida embrionária

31. A síndrome de prune belly caracteriza-se por:
- hidronefrose, atresia ileal e criptorquia
 - malformação urinária, hipoplasia muscular abdominal e hérnia umbilical
 - malformação urinária, criptorquia e hipoplasia muscular abdominal
 - hipoplasia muscular abdominal, hérnia inguinal bilateral e criptorquia
32. O tratamento correto para o cisto congênito do colédoco é:
- ressecção e derivação do cisto para a segunda porção do íleo
 - ressecção e anastomose bíleo digestiva
 - ressecção e derivação para o jejuno
 - ressecção e derivação para o estômago
33. Em crianças, a entidade patológica mais frequentemente associada à genitália ambígua é:
- hermafroditismo verdadeiro
 - disgenesia gonadal mista
 - hiperplasia congênita da supra-renal
 - síndrome de Klinefelter
34. Os neuroblastomas se localizam mais comumente na seguinte região:
- retroperitoneal
 - pélvica
 - mediastinal
 - cervical
35. O sinal típico indicativo de enterocolite necrotizante é:
- líquido achocolatado aspirado através de punção abdominal
 - hiperemia da parede abdominal
 - pneumatose intestinal
 - massa palpável no hipocôndrio esquerdo
36. Na hemorragia digestiva causada por ruptura de varizes esofágicas, o tratamento de escolha é:
- utilização do balão de Linton
 - injeção de pitressina
 - alcalinização do PH gástrico
 - emprego do balão de Sangstaken
37. Em recém-natos com esferocitose congênita, que apresentem hemólise importante e elevados níveis de bilirrubina indireta, o tratamento de escolha é:
- esplenectomia
 - embolização esplênica
 - emprego de corticóides
 - exangüíneo transfusão
38. Segundo estudo de Sachiro Suita e colaboradores, publicado em janeiro de 2000, a incidência de onfaloceles vem se mantendo constante, enquanto a de gastrosquise se mostra ascendente. Esse aumento estaria relacionado com:
- abuso do uso de anticoncepcionais pela gestante
 - idade da gestante
 - pobreza em proteínas na dieta da gestante
 - consumo de cocaína pela gestante
39. O “*gas bloat syndrome*” é uma intercorrência que pode suceder à seguinte técnica:
- de Tall Ashcraft
 - de Mondragon
 - de Swenson
 - de Nissen
40. A síndrome de Beckwith-Wiedemann é caracterizada por:
- gastrosquise, macroglossia e nanismo
 - onfalocele, hiperglicemia e prognatismo
 - hiperglicemia, tumor pancreático e gigantismo
 - gastrosquise, heperglicemia e gigantismo
41. A presença de células em roseta no exame anátomo-patológico é indicativa de:
- tumor de Wilms
 - linfoma
 - leucemia
 - neuroblastoma
42. O processo de obstrução intestinal que se associa à mucoviscidose é:
- atresia jejunal
 - atresia ileal
 - íleo meconial
 - estenose duodenal
43. A bactéria mais comumente encontrada na sepsis, em crianças esplenectomizadas, abaixo de um ano de idade, é:
- pneumococo
 - Klebsiella*
 - Staphylococcus aureus*
 - estreptococo
44. O orifício ureteral que tem a mais alta média de refluxo vésico-ureteral é do tipo :
- em ferradura
 - em estádio
 - em pilar ântero-lateral
 - em buraco de golfe

45. A presença de gás na veia porta é sinal de prognóstico ruim na:
- A) atresia ileal
 - B) enterocolite necrotizante
 - C) volvo de delgado
 - D) atresia jejunal
46. A aparente disparidade entre o local da obstrução duodenal parcial e a região na qual o calibre duodenal se modifica é chamada de:
- A) má rotação reversa
 - B) síndrome de Alagile
 - C) *windsock membrane*
 - D) síndrome de Cornélia de Lange
47. A síndrome de Poland se caracteriza por:
- A) persistência de canal arterial, atresia de esôfago, anomalias vertebrais e *seringohidromielia*
 - B) ausência dos músculos peitorais, anomalias de costelas, ausência de pêlos axilares e hipoplasia mamária e/ou mamilar
 - C) *Pectus carinatum*, sindactilia, atresia duodenal e anomalia ano retal
 - D) *Pectus excavatum*, traqueomalácia, fenda cervical mediana e ureterocele
48. O cariótipo da síndrome de Klinefelter é:
- A) XO
 - B) XX
 - C) XXY
 - D) XY
49. A localização mais freqüente da estenose de meato hipospádico é:
- A) Peniana proximal
 - B) Peniana Distal
 - C) Perineal
 - D) peno-escrotal
50. A operação de Fredet-Ramstedt é universalmente empregada para:
- A) estenose duodenal
 - B) atresia ileal
 - C) atresia jejunal
 - D) estenose hipertrófica do piloro