



## CONCURSO PÚBLICO 2009/PREFEITURA DE IGREJA NOVA

### CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

- Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.
- Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (**trinta**) está correta, e também se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.
- O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão resposta.
- A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta **azul ou preta**, é de inteira responsabilidade do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (**cinco**) alternativas diferentes de respostas (**A, B, C, D e E**). Apenas **uma** delas constitui a resposta **correta** em relação ao enunciado da questão.
- Suponha que a questão nº 01 tenha a resposta C como correta.
- Veja como marcar esta resposta.

QUESTÃO	ALTERNATIVAS				
01	A	B	<b>C</b>	D	E

- Deve-se estar atento para:
- Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão
- Não escrever no verso do cartão resposta
- Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta
- Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:
- Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:
- Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova;
- For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma;
- For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa identificação pessoal;
- Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;
- Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio e identificado pelo digiselo.
- Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.
- Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço eletrônico: [www.ipepec.com.br](http://www.ipepec.com.br)

**BOA PROVA**

## MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

1. Qual a dose máxima de lidocaína, com a qual ocorre risco de toxicidade:

- a) 1-2 mg/Kg
- b) 2-4 mg/Kg
- c) 4-5 mg/Kg
- d) 5-7 mg/Kg
- e) 7-9 mg/Kg

2. Paciente de 45 anos, ASA I é submetido a colecistectomia e papiloesfincterotomia transduodenal. A cirurgia teve duração de 2 h. O paciente evolui no 4º dia de pós-operatório com abscesso de parede abdominal. O agente etiológico mais provável da infecção é:

- a) Enterococos fecalis;
- b) Bacteróides fragilis;
- c) Streptococos epidermidis;
- d) Stapylococos aureus;
- e) Eschrerichia coli;

3. As herniorrafias têm como complicações pós-operatórias mais comum:

- a) Hematoma de parede;
- b) Orquite esquêmica;
- c) Fístula linfática;
- d) Trombose ileofemoral;
- e) Hidrocele

4. Paciente portador de uma hérnia inguinal indireta com anel interno dilatado, volumosa e com grande destruição da parede posterior do canal inguinal, de acordo com a classificação de Nyhus, é considerada do tipo:

- a) I
- b) II
- c) IIIa
- d) IIIb
- e) IVÃ

5. Nas primeiras 48 horas, em grandes queimados, observam-se as seguintes alterações:

- a) Hemodiluição e polidria;
- b) Hipernatremia e alcalose metabólica;
- c) Hiperpotassemia e hemoconcentração;
- d) Anemia e estado anabólico;
- e) Balanço nitrogenado positivo e hipoalbuminemia;

6. O mediador humoral intensamente produzido na reperfusão visceral é:

- a) Radical de oxigênio livre;
- b) Fator de necrose tumoral;
- c) Calicreína;
- d) Troboxane;
- e) Interleucina;

7. Paciente vítima de trauma abdominal fechado, que à radiografia de abdome apresenta imagem aérea no retroperitônio e ao toque retal crepitação por enfisema. O quadro é sugestivo de:

- a) Lesão de reto extraperitoneal;
- b) Lesão de duodeno;
- c) Lesão de válvula íleo-cecal;
- d) Lesão de alça de jejuno-íleo;
- e) Lesão em mesocólon transversos;

8. História prévia de traumatismo da região cervical por arma branca, seguida de infecção respiratória de repetição sugere:

- a) Lesão traquéia;
- b) Enfisema mediastinal
- c) Pseudoaneurisma carotídeo;
- d) Tireoidite;
- e) Fístula esofagotraqueal;

9. Em relação aos traumatismos torácicos, assinale C as afirmativas certas e E para as afirmativas erradas.

1. As feridas penetrantes do tórax podem comprometer a ventilação pulmonar quando seu diâmetro corresponde a pelo menos, duas a três vezes o diâmetro da traquéia;
2. No caso de tamponamento cardíaco, para que haja resposta hemodinâmica adequada é necessário retirar volume superior a 100 ml do saco pericárdico;
3. Em grande parte das necrópsias, a rotuna de hemidiafragma direito é muito mais freqüente que a de esquerdo;
4. O pneumotórax hipertensivo deve ser diagnosticado clinicamente e o tratamento sempre é imediato;
5. O diagnóstico de rotuna da aorta pode ser suspeitado com base no quadro clínico e diagnosticado sempre através de radiografia simples de tórax.

A Seqüência correta é:

- a) E C C E E
- b) E C E E C
- c) C C C C C
- d) E E C C E
- e) C C E E C

10. Qual é o local mais freqüente de abscessos intra-abdominais, após cirurgia abdominal?

- a) Espaço pélvico;
- b) Espaço subfrênico;
- c) Fundo de Saco de Douglas;
- d) Goteira parietocólica;
- e) Espaço de Morriison.

11. Indique a causa mais freqüente de hemorragia digestiva alta:

- a) Neoplasia gástrica;
- b) Varizes esofageanas;
- c) Hiperesplenismo
- d) Doença ulcerosa péptica;
- e) Encefalopatia.

## MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

12. Paciente, 21 anos, vítima de acidente de moto atendido no hospital apresentando sangue em cavidade oral, confuso, FC – 120bpm, PA=100X60 mmHg, lesão importante em região tóraco abdominal à direita com respiração ruidosa, fratura exposta em perna esquerda com sangramento ativo qual sua conduta:

- a) Colocar torniquete em MIE, oxigênio contínuo, venóclise e encaminhar para traumatologista;
- b) Oxigênio contínuo, drenagem torácica em selo d'água em HTD, compressão de lesão sangrante;
- c) Sedação, oxigênio contínuo e reparo da fratura;
- d) Colar cervical, drenagem torácica e colocação de torniquete em MIE para parar o sangramento;
- e) Intubação orotraqueal, colar cervical, venóclise e compressão de lesão sangrante.

13. Paciente de 20 anos, homem, vítima de atropelamento, deu entrada na UE com quadro de dispnéia súbita, caracterizada por grande esforço respiratório e turgência jugular. Ao exame físico apresenta hipertimpanismo a percussão e abolição do Murmúrio vesicular em HTD. A conduta é:

- a) Toracotomia direita;
- b) Pericardiocentese;
- c) Toracocentese direita;
- d) Drenagem torácica direita;
- e) Intubação orotraqueal.

14. O procedimento de Whipple modificado para o tratamento do câncer de pâncreas difere do procedimento clássico por:

- a) Preservar o corpo gástrico;
- b) Realizar colecistectomia;
- c) Realizar apenas 2 anastomoses;
- d) Preservar o piloro e uma pequena porção do duodeno;
- e) Preservar o ducto biliar comum distal.

15. Paciente jovem com nódulo tireoidiano e linfadenopatia cervical apresenta-se com hipertensão paroxística, PA = 170 X 110 mm Hg. Este quadro é típico de:

- a) Carcinoma folicular;
- b) Carcinoma medular;
- c) Adenoma folicular;
- d) Carcinoma papilífero;
- e) Crise tireotóxica

16. Paciente com úlcera péptica perfurada submetido a vagotomia troncular com piloroplastia tem maior tendência a desenvolver como complicação relacionada ao procedimento:

- a) Colelitíase;
- b) Gastrite alcalina;
- c) Acidose metabólica;
- d) Dumping;
- e) Síndrome da alça aferente.

17. A condição inicial da fisiopatologia da Colecistite Aguda:

- a) Contaminação da bile por bactérias gram negativas;
- b) Estase da bile na via biliar principal;
- c) Sofrimento vascular da vesícula biliar;
- d) Obstrução do cístico ou do infundíbulo da vesícula;
- e) Necrose da parede da vesícula biliar

18. Quando se encontra indicada a cirurgia em um paciente com pancreatite aguda complicada:

- a) Homem, 35 anos, com pancreatite edematosa;
- b) Mulher, 58 anos, com necrose do pâncreas em uso de antibiótico profilático;
- c) Homem, 56 anos, com febre, colapso e íleo paralítico após 3 semanas da doença;
- d) Homem, 70 anos, com pseudocisto pouco sintomático na 4ª semana da doença;
- e) Pancreatite crônica agudizada.

19. A causa mais frequente de HDA em paciente HIV positivo:

- a) Úlcera do CMV;
- b) Cryptosporidium;
- c) Linfoma não-hodgkin;
- d) Úlcera por cândida;
- e) Sarcoma de Kaposi.

20. A cirurgia indicada para pacientes com púrpura trombocitopênica idiopática:

- a) Esplenectomia;
- b) Desconexão ázigo-portal;
- c) Anastomose Porto-cava;
- d) Gastrectomia subtotal à BII
- e) Anastomose espleno-renal distal.

21. De acordo com a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das previstas na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta:

- a) Poderá ser transferida desde que seja fiscalizado pelo Conselho de Saúde
- b) Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas
- c) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde
- d) Constitui emprego regular de verbas ou rendas públicas
- e) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde e fiscalizado pelo Conselho de Saúde

22. São instâncias colegiadas do SUS:

- a) O Ministério da Saúde e a Conferência de Saúde
- b) A Fundação Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde
- c) O Ministério da Saúde e o Conselho de Saúde
- d) O Conselho de Saúde e Fundação Nacional de Saúde
- e) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde

23. Conforme a Lei nº 8.080/1990, podemos afirmar que a assistência à saúde é:

- a) Livre a entidade filantrópicas
- b) Livre à iniciativa privada
- c) Proibida à iniciativa privada
- d) Livre à iniciativa pública e privada
- e) Livre à iniciativa privada

24. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- a) Descentralização, atendimento integral, participação da comunidade
- b) Centralização, atendimento integral, participação da comunidade
- c) Centralização, atendimento integral, participação dos setores públicos
- d) Descentralização, atendimento setorial, participação dos serviços privados
- e) Centralização, atendimento integral, participação dos serviços de saúde

25. À direção nacional do Sistema Único de Saúde cabe, exclusivamente:

- a) A execução e a implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho
- b) A formulação e a implementação da política de controle das agressões ao meio ambiente
- c) A formulação e a implementação das políticas de saneamento básico
- d) A formulação e a coordenação da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras
- e) A formulação, avaliação e apoio das políticas de alimentação e nutrição

Leia o texto abaixo e responda às questões:

### Estudo dos EUA constata que tratamento de autismo em bebês é eficaz

O tratamento de autismo se mostra mais eficaz quanto mais cedo for iniciado. Um estudo realizado nos Estados Unidos constatou resultados animadores em crianças diagnosticadas com a doença e que começaram a ser tratadas de forma mais rigorosa a partir do 1º ano de vida.

Um grupo de pesquisadores da Universidade de Washington concluiu que o tratamento pode amenizar muito os sintomas da doença. Foram avaliadas 48 crianças autistas, entre 1 ano de meio e 2 anos e meio.

Um grupo foi selecionado aleatoriamente para receber um tratamento especializado, conhecido como *Early Start Denver*, focado na interação e na comunicação - as maiores dificuldades das crianças autistas. A outra parte era atendida de forma menos abrangente e intensa.

Em uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido, os pais e terapeutas seguram repetidamente brinquedos muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter contato visual. Em outro exercício, a criança é recompensada por usar palavras para pedir brinquedos. Foram quatro horas de atenção dos terapeutas durante cinco dias na semana, e o tratamento era repetido em casa, com os pais, por pelo menos mais cinco horas semanais.

<http://veja.abril.com.br/noticia/saude/estudo-eua-constata-tratamento-autismo-bebes-eficaz-515822.shtml>

26. Segundo o texto:

I – O tratamento ameniza os sintomas da doença.

II – 48 crianças de 2 anos e meio foram avaliadas na pesquisa.

III – O grupo de crianças que receberam o tratamento *Early Start Denver* foi selecionado aleatoriamente.

Está (ao) incorreta (s):

- a) Apenas I
- b) I, II e III
- c) Apenas II e III
- d) Apenas I e III
- e) Apenas I e II

27. No trecho “ começaram a ser tratadas” temos o verbo no plural por concordar com seu sujeito “crianças”. Analise as orações a seguir e aponte aquela (s) que não depende (dependem) de sujeito para realizar a concordância do verbo, uma vez que eles são impessoais.

I – Constatou-se o problema imediatamente.

II – Houve enormes progressos após o tratamento aplicado.

III – Fizeram os tratamentos as crianças selecionadas.

IV – Faz dois anos que submetemos as crianças ao tratamento.

Está (ao) correta (s):

- a) Apenas I e IV
- b) Apenas II e III
- c) Apenas III e IV
- d) Apenas II e IV
- e) Apenas I, II e III

