

01 – A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, regulando para todo o território nacional as ações e os serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas de direito público ou privado. Considerando o Sistema Único de Saúde (SUS), incluído no citado dispositivo legal, assinale o que for correto.

- 01) Mesmo em caráter complementar a iniciativa privada não poderá participar do SUS.
- 02) O SUS é constituído de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- 04) A direção do SUS é única, sendo exercida na União, pelo Ministério da Saúde, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, pelas respectivas Secretarias da Saúde ou órgãos equivalentes.
- 08) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano constam do campo de atuação do SUS.
- 16) O SUS, no nível municipal, poderá ser organizado em distritos, com o propósito da integração de recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

02 – Quanto às competências da direção municipal do SUS, assinale o que for correto.

- 01) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- 02) Participar do planejamento, da programação e da organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual.
- 04) Fica vedada a participação do SUS no controle e na fiscalização dos procedimentos dos serviços privados de saúde.
- 08) Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais e estaduais para controlá-las.
- 16) Participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

03 – As ações de saúde pública no Brasil devem estar voltadas, ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade, para a prevenção e para o tratamento, sempre respeitando a dignidade humana. Nesse contexto e no que se refere aos princípios, definidos em lei, que embasam essas ações, assinale o que for correto.

- 01) Universalidade de acesso.
- 02) Não hierarquização da rede de serviços.
- 04) Integralidade de assistência.
- 08) Ênfase na centralização dos serviços.
- 16) Descentralização político-administrativa.

04 – A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, alterou dispositivos da Constituição Federal relacionados em destaque para o setor de saúde, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e dos serviços públicos de saúde. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A Emenda Constitucional nº 29/2000 alterou dispositivos constitucionais para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações públicas da saúde.
- 02) A Emenda Constitucional nº 29/2000 alterou dispositivos constitucionais para assegurar os recursos mínimos para o financiamento dos serviços públicos da saúde.
- 04) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 o Estado poderá intervir no Município que não aplicar o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino e/ou nas ações e nos serviços de saúde.
- 08) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, deverão ser estabelecidas por Lei Complementar, mediante avaliação a ser feita anualmente.
- 16) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 a União poderá intervir no Estado, ou no Distrito Federal, quando não ocorrer a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino e/ou nas ações e no serviços de saúde.



05 – A Norma Operacional Básica nº 01/91 do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS 01/91) teve por objetivo fornecer as primeiras instruções aos responsáveis pela implantação e operacionalização do Sistema Único de Saúde, estabelecendo os aspectos de natureza operacional e os intrinsecamente necessários ao gerenciamento dos serviços e das ações de saúde, como também do controle, do acompanhamento e da fiscalização da aplicação de recursos.

- 01) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a constituição dos Conselhos de Saúde, para funcionamento em caráter permanente e deliberativo, com representação paritária e compostos por representantes dos governos, dos prestadores de serviços e dos profissionais de saúde (50%) e usuários (50%), para atuação na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- 02) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a linha básica dos Fundos de Saúde, de natureza contábil e financeira, vinculados aos objetivos do SUS e detentores de prévia autorização pelo legislativo para aplicação de suas receitas através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em crédito adicional.
- 04) Os Fundos de Saúde referidos na NOB-SUS 01/91 constaram como de gerência pelo órgão de saúde da esfera correspondente e fiscalizados pelo Conselho de Saúde respectivo.
- 08) O Relatório de Gestão ficou estabelecido na NOB-SUS 01/91 como requisito básico para a transferência automática de recursos aos Municípios, devendo ser elaborado com a abordagem dos seguintes aspectos: finalidades especiais, plano de trabalho elaborado, plano de trabalho executado e resultados alcançados.
- 16) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu que a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o Território Nacional seria efetuada e coordenada pelo Ministério da Saúde e INAMPS, em cooperação técnica com os Estados, Distrito Federal e Municípios.



06 – Assinale o que for correto.

- 01) Considera-se mortalidade neonatal a ocorrida entre zero e quarenta e cinco dias de vida.
- 02) Nota de Apgar menor que 7 no primeiro e quinto minutos de vida é indicativo de possível sofrimento fetal ou asfixia ao nascer.
- 04) Recém nascido prematuro é aquele com idade gestacional menor que 37 semanas.
- 08) Coeficiente ou taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos de crianças nascidas vivas no primeiro ano de vida por mil nascidos vivos na população residente em determinado espaço geográfico.
- 16) Uma taxa de mortalidade infantil de 22 óbitos por mil nascidos vivos é considerada baixa.

07 – Assinale o que for correto.

- 01) Sobre infecção pelo HIV: denomina-se de janela imunológica o intervalo entre a infecção e a detecção de anticorpos por técnicas laboratoriais. Nesse período as provas sorológicas podem ser falso-positivas.
- 02) Sobre tratamento para giardíase: pode-se utilizar secnidazol ou tinidazol em dose única, ou metronidazol por 5 dias.
- 04) Sobre doenças diarreicas agudas: síndrome causada por vários agentes etiológicos como bactérias, vírus ou parasitas, em geral auto limitadas, com duração de 2 a 14 dias.
- 08) Sobre tratamento para ascaridíase: deve-se usar albendazol 200 mg, em dose única para adultos e crianças maiores de 6 meses.
- 16) Sobre a escabiose: parasitose da pele causada por um ácaro cujo prurido é intenso e caracteristicamente maior durante o dia, por ser o período de reprodução e deposição de ovos.

08 – Assinale o que for correto.

- 01) Sobre o tratamento para herpes simples: pode-se utilizar aciclovir na dose de 200 mg, 5 vezes ao dia, por 5 dias, podendo ser estendido nas primo-infecções.
- 02) Sobre a teníase: a *Taenia saginata* é a tênia da carne de porco e a *Taenia solium* é a tênia da carne bovina. Esses dois parasitas causam doença intestinal (teníase) e os ovos da *Taenia solium* desenvolvem infecções somáticas (cisticercose).
- 04) Sobre o esquema para tratamento profilático antirábico humano: em caso de lambadura em mucosa, mesmo sendo o animal clinicamente sadio, deve-se iniciar o tratamento mais precocemente possível com uma dose da vacina antirábica nos dias 0, 2 e 4, contados a partir do primeiro dia da vacina.
- 08) Sobre o período de transmissibilidade da varicela: pode variar de 1 a 2 dias antes da erupção, até enquanto houver vesículas.
- 16) Sobre o tratamento de infecção pelo papilomavírus humano (HPV): utiliza-se ácido tricloroacético (ATA) a 90% nas lesões de colo, vagina, vulva, períneo e região perianal, 1 a 2 vezes por semana, direcionada apenas ao local da lesão.

09 – Assinale o que for correto.

- 01) Tratamento da candidíase oral em crianças: pode-se usar suspensão oral de nistatina na dose de 1 a 2 ml, três vezes ao dia, durante 5 a 7 dias ou até a cura completa.
- 02) A dermatite amoniacal é a dermatite das fraldas, causada por irritação na pele causada pelo contato com a urina e as fezes retidas pelas fraldas.
- 04) Tratamento da erisipela: a droga de escolha é a penicilina procaína na dose de 400.000 UI de 12 em 12 horas por 10 dias.
- 08) Furunculose são infecções estafilocócicas de folículos pilosos e glândulas sebáceas, comprometendo tecido celular subcutâneo próximo.
- 16) Sobre a gonorréia: no homem apresenta-se na maioria das vezes na forma assintomática, diferente das mulheres nas quais mais de 70% apresentam manifestações clínicas importantes.

10 – Assinale o que for correto.

- 01) Molusco contagioso é uma doença viral, com pápulas lisas umbilicadas, frequente na infância, principalmente em crianças atópicas.
- 02) Para o tratamento de lesão por larva de ancilóstomos e de larva migrans utiliza-se pomada de cetoconazol.
- 04) A pitiríase versicolor é causada pelo parasita *Sarcoptes*.
- 08) Glomerulonefrite é uma das complicações possíveis do impetigo infantil estreptocócico e estafilocócico.
- 16) Quanto à transmissão da pediculose deve-se orientar que há transmissibilidade enquanto houver piolhos vivos na pessoa infectada ou nos fômites, sendo que os piolhos podem viver até 10 dias nos utensílios do hospedeiro.

11 – Assinale o que for correto.

- 01) O tratamento da sífilis adquirida e primária consiste na aplicação de penicilina G benzatina 2.400.000 UI IM em dose única (1.200.000 UI IM em cada glúteo).
- 02) A infecção fúngica que acomete os espaços interdigitais e regiões plantares, a tinea dos pés, faz diagnóstico diferencial com candidíase, psoríase, dermatite de contato e desidroses.
- 04) A tungíase, provocada pela *Tunga penetrans*, é transmitida pessoa a pessoa.
- 08) Deve-se sempre lembrar que a presença de lesões urticariformes nem sempre é um diagnóstico final de uma simples urticária, podendo ser um sinal de doença sistêmica.
- 16) Quanto ao uso de corticóides sistêmicos: administrar preferencialmente à noite, diminuir a ingestão de sal e alimentos gordurosos e avaliar a curva de crescimento se usar em crianças e adolescentes.

12 – Assinale o que for correto sobre tuberculose.

- 01) Um caso novo de tuberculose é o doente com tuberculose que nunca se submeteu à quimioterapia antituberculosa, fez uso de tuberculostáticos por menos de 30 dias ou submeteu-se ao tratamento para tuberculose há 5 anos ou mais.
- 02) A baciloscopia direta do escarro é método fundamental porque permite descobrir os casos bacilíferos, detectando de 20% a 30% dos casos de tuberculose pulmonar em uma comunidade.
- 04) Defini-se como retratamento em tuberculose a prescrição de drogas para o doente já tratado por mais de 30 dias, que venha a necessitar de nova terapia por recidiva após cura, retorno após abandono ou por falência dos esquemas anteriormente utilizados.
- 08) O resultado da prova tuberculínica de 5 mm a 9 mm refere-se ao reator forte, que pode aparecer em indivíduos doentes ou não.
- 16) Pacientes tuberculosos pulmonares inicialmente positivos terão alta por cura se na fase de acompanhamento do tratamento apresentarem uma baciloscopia negativa.

13 – Assinale o que for correto sobre a hanseníase.

- 01) A classificação operacional dos casos de hanseníase é baseada no número de lesões cutâneas: multibacilar (com até 5 lesões de pele) e paucibacilar (com mais de 5 lesões de pele).
- 02) A poliquimioterapia utilizada no tratamento da hanseníase abrange o uso da rifampicina, dapsona e clofazima.
- 04) A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo território nacional e de investigação obrigatória.
- 08) Considera-se contato intradomiciliar toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido com o doente de hanseníase nos últimos cinco anos.
- 16) As principais manifestações clínicas da hanseníase são: manchas hipocrômicas, acastanhadas ou avermelhadas com alteração de sensibilidade; falta ou ausência de sudorese no local; diminuição ou queda de pelos.

14 – Assinale o que for correto.

- 01) Atenção básica, como primeiro nível de atenção no Sistema Único de Saúde, caracteriza-se por um conjunto de ações no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e visa à manutenção da saúde.
- 02) A Saúde da Família é a estratégia para a organização da Atenção Básica no SUS que propõe a adequação das ações e serviços à realidade da população em cada unidade territorial.
- 04) Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- 08) A territorialização é a base do trabalho das Equipes de Saúde da Família; território em saúde não é apenas um espaço delimitado geograficamente, mas sim um espaço onde as pessoas vivem, estabelecem suas relações sociais, trabalham e cultivam suas crenças e cultura.
- 16) Faz parte do papel do médico na Estratégia Saúde da Família orientar os auxiliares, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde para o acompanhamento dos casos em tratamento e/ou tratamento supervisionado.

15 – Assinale o que for correto sobre a dengue.

- 01) O médico deve realizar a prova do laço quando suspeitar de dengue hemorrágica.
- 02) São sinais de choque na dengue: hipertensão arterial; pressão arterial convergente; extremidades frias, cianose; pulso rápido e fino; enchimento capilar rápido.
- 04) São sinais de alarme na dengue, que indica a possibilidade de gravidade do quadro clínico: vômitos persistentes; hipotensão postural; hepatomegalia dolorosa; diminuição da diurese; hipotermia e presença de hemorragias.
- 08) O médico deve encaminhar ao setor competente a ficha de notificação da dengue, conforme estratégia local.
- 16) No Brasil a principal espécie vetora da dengue é o *Aedes aegypti*, sendo que a transmissão ocorre pela picada do macho do mosquito vetor.

16 – Assinale o que for correto.

- 01) O aleitamento materno é benéfico pois colabora na redução da mortalidade infantil, na redução da morbidade por diarreia e infecções respiratórias.
- 02) Toda criança com hérnia inguinal deve ser encaminhada para cirurgia o mais cedo possível, assim que as condições clínicas permitirem.
- 04) A obesidade infantil deve ser corretamente enfrentada, pois a criança e o adolescente obesos tendem a ser adultos obesos.
- 08) Pacientes depressivos, tanto adolescentes como adultos, devem ser tratados somente com medidas não farmacológicas, pela equivalência do tratamento medicamentoso com placebos.
- 16) Ginecomastia puberal é o aumento da glândula mamária no sexo masculino que persiste além da adolescência até a idade adulta, podendo ser uni ou bilateral.

17 – Assinale o que for correto sobre *diabetes mellitus*.

- 01) A biguanida comumente utilizada no tratamento do *diabetes mellitus* tipo 2 nos obesos é a glibenclamida.
- 02) O *diabetes mellitus* tipo 1 é considerado hoje parte da chamada síndrome plurimetabólica, pois resulta em geral de graus variáveis de resistência à insulina e de deficiência relativa de secreção de insulina.
- 04) A hipoglicemia constitui a principal complicação da insulinoterapia.
- 08) A sulfoniluréia comumente utilizada no tratamento do *diabetes mellitus* é a metformina.
- 16) Nos idosos a expressão clínica do *diabetes mellitus* é frequentemente mais insidiosa, podendo cursar de uma maneira atípica, pois a poliúria e a polidipsia podem não surgir até que a doença esteja bastante avançada.

18 – Assinale o que for correto.

- 01) A vaginose bacteriana pode ter como agente a *Gardenerella vaginalis*, podendo ser tratada com fluconazol ou itraconazol.
- 02) A queixa mais frequente em casos de carcinoma de mama é geralmente a presença de um nódulo doloroso.
- 04) De acordo com as normas do Ministério da Saúde, para o tratamento de doenças sexualmente transmissíveis todos os parceiros de casos comprovados ou altamente suspeitos de cervicite devem ser tratados.
- 08) A precocidade do início da atividade sexual e gestações na adolescência são encaradas como fatores de risco para câncer de colo uterino.
- 16) Uma paciente que tenha a data da última menstruação no dia 15 de julho de 2009 terá sua data provável do parto para o dia 13 de abril de 2010.

19 – Assinale o que for correto.

- 01) Os pacientes com osteoartrose não se beneficiam com perda de peso, terapia física, fortalecimento muscular e exercício aeróbico.
- 02) A medida isolada mais efetiva para reduzir o risco de desenvolvimento de doença pulmonar obstrutiva crônica e para parar sua progressão é o abandono do tabagismo quando presente.
- 04) As monoartrites induzidas por cristais são basicamente de dois tipos: gonocócicas ou sépticas.
- 08) No tratamento das bursites está contraindicada a aspiração do líquido da bursa.
- 16) Um paciente asmático controlado é aquele com ausência de exacerbações da doença, sintomas mínimos e ocasionais, ausência de limitação para realizar atividades físicas, pouca necessidade de medicação de alívio e normalização das provas funcionais.

20 – Assinale o que for correto sobre hipertensão arterial sistêmica (HAS).

- 01) Quando possível a avaliação mínima do portador de HAS deve contar dos seguintes exames: urina (bioquímica e sedimento); creatinina sérica; potássio sérico; glicemia sérica; colesterol total e eletrocardiograma de repouso.
- 02) A hidroclortiazida é o diurético padronizado para uso rotineiro, não devendo ultrapassar a dose de 50 mg/dia.
- 04) Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (ECA) também reduzem a pressão intraglomerular, que tem como consequência proteção renal específica.
- 08) A hipertensão arterial é definida como uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva.
- 16) Utilização de anticoncepcionais, corticosteroides, antiinflamatórios não-hormonais, estrógenos, descongestionantes nasais devem ser evitados por pacientes hipertensos pelo risco de elevar os níveis da pressão arterial.