



CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO MÉDICO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

01 Este caderno contém 25 questões das provas objetivas, sem repetição ou falha, com valor de 4,00 pontos cada questão, assim distribuídas:

**Conhecimento Específico
25 questões**

02 Certifique se este caderno de provas é para o cargo para o qual você se inscreveu. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o aplicador de prova.

03 Após iniciar a prova, você receberá do aplicador de prova a **Folha de Respostas**. Verifique se os dados que aparecem na **Folha de Respostas** estão corretos. Caso contrário notifique **IMEDIATAMENTE** o aplicador de prova.

04 Após a conferência, você deverá assinar no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

05 Tenha cuidado com a **Folha de Respostas** para não **dobrar, amassar** ou **manchar**. A **Folha de Respostas somente** poderá ser substituída caso esteja com problemas de impressão.

06 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**, a marcação em mais de uma alternativa anula a questão.

07 Marque as respostas de acordo com a quantidade de questões da prova: de 01 a 25. Deixe as questões excedentes da Folha de Respostas em branco.

08 Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta**, sem deixar claros, conforme exemplo:



09 **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que comunicar-se com os demais candidatos. Fazer uso de calculadoras, celulares, mp3, relógio do tipo "calculadora", *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador e/ou similares. Fazer uso de fontes de consulta de qualquer espécie.

10 Qualquer questionamento deverá ser feito em voz alta. Os aplicadores de prova não poderão tirar qualquer dúvida sobre as questões da prova.

11 O candidato que necessitar utilizar o sanitário deverá solicitar ao aplicador de prova.

12 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início da prova.

13 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas.

✂ Corte na linha pontilhada

RASCUNHO – ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS

Questões	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Respostas															
Questões	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
Respostas															

01 Com relação à evolução das políticas públicas de saúde no Brasil, assinale a correta.

- (A) O Sistema Único de Saúde, garantido pela Constituição e regulado pela Lei 10.708, prevê um sistema com princípios doutrinários e organizativos.
- (B) Em agosto de 1990, o Congresso Nacional aprova a primeira versão da Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080, a qual é profundamente mutilada pelos vetos presidenciais, particularmente nos itens relativos ao financiamento e ao controle social.
- (C) Resultado de negociações, uma nova lei, a 8.142, recupera alguns vetos e, hoje, o que conhecemos como a Lei Orgânica da Saúde (LOS) é formada pelo conjunto das leis 8.080 e 10.216.
- (D) O princípio da descentralização da atenção, incorpora o direito à assistência como construto da cidadania e aponta para um modelo que pressupõe uma lógica de seguridade social baseada nos moldes dos Estados de Bem-Estar.
- (E) O princípio da universalidade assegura que a disponibilidade dos serviços de saúde considere as diferenças entre os diversos grupos de indivíduos.

02 Com relação à mortalidade materna, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) As causas de morte materna podem ser indiretas, entre as quais, destacam-se as cardiopatias.
- (B) Considera-se morte materna os óbitos de mulheres em idade fértil devido às complicações da gravidez, parto e puerpério.
- (C) As altas taxas de mortalidade materna refletem o baixo nível de qualidade da assistência à saúde.
- (D) Considera-se morte materna os óbitos de mulheres devido às complicações da gravidez e parto.
- (E) As mulheres com mais de 30 anos não fazem parte desse cálculo estatístico.

03 Um lactente de 5 meses é trazido à emergência com quadro de coriza hialina, tosse intensa, associado à taquipneia. A mãe do paciente não refere que a criança tenha febre e seu estado geral é regular. A ausculta pulmonar evidencia muitos roncosp, estertores úmidosp e alguns sibilosp. O RX demonstra infiltrado bilateral sem área de consolidação. O diagnóstico mais provável será

- (A) Coqueluche.
- (B) Doença de Wilson.
- (C) Bronquiolite.
- (D) Asma Brônquica.
- (E) Refluxo Gastroesofágico.

04 Saturnismo é uma doença profissional cujo agente etiológico é

- (A) Sulfato de Bário.
- (B) Salicilato de sódio.
- (C) Carvão mineral.
- (D) Chumbo metálico.
- (E) Sulfato de alumínio.

05 Início dos anos 60 até metade dos anos 80, o modelo de atenção à saúde vigente no Brasil era o médico assistencial privatista. Tinha direito à saúde apenas os trabalhadores segurados do INPS e depois do INAMPS. Com o advento do Sistema Único de Saúde (SUS), é garantido o acesso a saúde a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, renda, ocupação, ou outras. Essa garantia é um dos princípios doutrinários do sistema. A qual princípio o texto se refere?

- (A) Universalidade.
- (B) Equidade.
- (C) Resolutividade.
- (D) Hierarquização.
- (E) Regionalização.

06 A imunoglobulina sérica para profilaxia pós-exposição ao vírus da rubéola

- (A) não deve ser aplicada em grávidas.
- (B) é de pouco valor e não recomendada para uso de rotina.
- (C) é indicada particularmente às mulheres no primeiro trimestre de gestação.
- (D) é mandatória a todas as gestantes.
- (E) é obrigatória a todas as mulheres em idade fértil.

07 Medo de estar em locais ou situações das quais pode ser difícil fugir ou em que não se pode dispor de ajuda, referem-se a qual fobia?

- (A) Agorafobia.
- (B) Astrafobia.
- (C) Acrofobia.
- (D) Tricofobia.
- (E) Pirofobia.

08 Criança de sete anos de idade apresenta quadro compatível com pneumonia sem derrame pleural. Pela criança não ter internação anterior, sem fatores de risco associados, pela sua faixa etária e não sendo relatado estado de toxemia importante, podemos diagnosticar e tratar como

- (A) Pneumonia por *Staphylococcus*, tratar com Penicilina Cristalina.
- (B) Pneumonia por *Streptococcus*, tratar com Penicilina Cristalina.
- (C) Pneumonia por *Streptococcus*, tratar com Oxacilina.
- (D) Pneumonia por *Mycoplasma*, tratar com Penicilina Cristalina.
- (E) Pneumonia por *Staphylococcus*, tratar com Eritromicina.

09 Sr. Pedro é morador de S. João do Ivaí e recém-chegado de viagem pela selva amazônica, apresentou um quadro caracterizado por febre alta, vômitos negros, leucopenia, proteinúria e icterícia. Muito provavelmente o seu diagnóstico será

- (A) Febre amarela.
- (B) Malária.
- (C) Dengue hemorrágico.
- (D) Cólera.
- (E) Febre Negra do Nilo.

10 As Normas Operacionais Básicas, a partir da avaliação do estágio de implantação e desempenho do SUS, se voltam para a definição de estratégias e movimentos táticos, que orientam a operacionalidade desse Sistema. Dentre as finalidades da NOB-96, podemos citar

- (A) promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus municípios com a consequente redefinição das responsabilidades dos Estados, do Distrito Federal e da União, avançando na consolidação dos princípios do SUS.
- (B) buscar a plena responsabilidade do poder público federal. Assim, esse poder se responsabiliza como também pode ser responsabilizado, ainda que não isoladamente. Os poderes públicos estadual e municipal são sempre co-responsáveis.
- (C) redefinir os instrumentos gerenciais para que o distrito federal supere o papel exclusivo de prestador de serviços e assumam seu papel de gestor do SUS.
- (D) redefinir os mecanismos e fluxos de financiamento, aumentando progressiva e continuamente a remuneração por produção de serviços e diminuindo as transferências de caráter global, fundo a fundo, com base em programações descendentes, pactuadas e integradas.

(E) redefinir os vínculos dos serviços com os seus usuários, excluindo os núcleos familiares e comunitários, criando, assim, condições para um efetivo controle social.

11 Durante uma consulta de Puericultura, a mãe de um lactente de seis meses de vida, questiona o uso de medicamentos quando a criança está com um quadro de diarreia. É correto afirmar que

- (A) o uso de antieméticos está recomendado nas doses usuais nas crianças acima de dois anos.
- (B) os antidiarreicos, além de não serem comprovadamente benéficos, podem trazer maior risco nos casos de diarreias causadas por bactérias.
- (C) os antibióticos devem ser usados de forma precoce e rotineira, para tanto, deve-se procurar a Unidade de saúde para “pegar a receita”.
- (D) as crianças com diarreia devem fazer uso regular de metronidazol, pois, além de não ter efeito colateral, auxilia na eliminação dos enterovírus.
- (E) o aleitamento materno não tem relação com a incidência de diarreia aguda na infância.

12 A secreção vaginal anormal é considerada uma das queixas mais frequentes das mulheres nas unidades de saúde. Quanto a essa situação, marque a alternativa correta.

- (A) A *Cândida albicans* é pouco encontrada nas vaginites de mulheres em idade fértil.
- (B) As vulvovaginites geralmente são causadas por *Gardnerella vaginalis*, *Trichomonas vaginalis* e *Cândida albicans*.
- (C) A *Gardnerella vaginalis* é o agente que mais produz processo inflamatório, sendo um dos principais agentes das vaginites.
- (D) A gestante que estiver infectada não deve fazer o tratamento para clamídia no primeiro semestre.
- (E) Apenas o parceiro das mulheres que apresentaram cervicite por *Neisseria gonorrhoeae* devem ser tratadas.

13 “Conjunto de ações que propiciam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. Tal definição refere-se à

- (A) vigilância epidemiológica.
- (B) vigilância sanitária.
- (C) vigilância em saúde.
- (D) vigilância ambiental.
- (E) vigilância de doenças transmissíveis.

14 Quanto aos antibióticos considerados seguros e prescritos habitualmente para pacientes grávidas com infecção do trato urinário, qual dos abaixo NÃO deve ser prescrito?

- (A) Penicilina Benzatina.
- (B) Quinolonas.
- (C) Amoxicilina.
- (D) Nitrofurantoina.
- (E) Cefalexina.

15 Em relação ao climatério, assinale a alternativa correta

- (A) Os sinais e sintomas relativos ao climatério são pouco alterados com o uso de reposição hormonal.
- (B) A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes melitus são contra-indicações absolutas para a terapia de reposição hormonal.
- (C) A terapia de reposição hormonal é contra-indicada na menopausa precoce.
- (D) As dosagens hormonais são, na maioria das vezes, desnecessárias, sendo o diagnóstico do climatério eminentemente clínico.
- (E) Deve-se realizar rastreamento populacional de osteoporose por meio de densitometria óssea.

16 Quanto às anemias na criança e no adolescente, qual a alternativa ERRADA?

- (A) Entre as causas por perda sanguínea, os traumas abdominal e torácico são de grande importância.
- (B) O diagnóstico clínico é importante e constitui-se de tonturas, palpitações, fadiga com dispneia aos esforços.
- (C) A perda crônica de sangue nas fezes não é fator relacionado às anemias na criança.
- (D) No choque hemorrágico ocorre alteração da perfusão e hipotensão.
- (E) Os níveis de hemoglobina variam conforme a faixa etária do recém-nascido até a adolescência.

17 Uma senhora de 70 anos, que não mora na cidade, pediu ao médico uma receita de diazepam, pois faz uso do medicamento há mais de 3 anos, prescrito inicialmente para amenizar sua insônia. Por não conhecer a história da paciente, o médico deve ter que conduta?

- (A) Substituir o Diazepam por amitriptilina.
- (B) Permitir que ela continue usando Diazepam.
- (C) Substituir por outra droga mais branda, como um anti-histamínico.
- (D) Manter o Diazepam, orientando a paciente para que use apenas quando necessário.
- (E) Orientá-la a evitar dormir durante o dia e deitar-se um pouco mais tarde à noite, pois o ciclo do sono do idoso difere do jovem.

18 Sobre a prova do laço realizada no exame físico do paciente com suspeita de dengue, marque a opção correta

- (A) A prova do laço consiste em se obter, por meio do esfigmomanômetro, o ponto médio entre a pressão arterial máxima e a mínima do paciente, mantendo-se esse ponto médio por 15 minutos.
- (B) Quando negativa, aparecem petéquias no braço, na região sob o aparelho ou abaixo dele.
- (C) Se o número de petéquias for de 20 ou mais por centímetro, essa prova é considerada fortemente positiva.
- (D) Essa prova não pode ser realizada em pessoas acima de 60 anos.
- (E) As petéquias devem fazer sufusões hemorrágicas em 3 segundos.

19 Um homem de 59 anos apresenta há 7 meses dispnéia progressiva aos esforços. Ao exame físico, ritmo cardíaco regular em 3 tempos (B3), estertores subcrepantes em ambas as bases pulmonares, com turgência jugular patológica e edema em membros inferiores. A droga que melhora a sobrevida desse paciente é

- (A) paracetamol.
- (B) digoxina.
- (C) furosemida.
- (D) nitrato.
- (E) captopril.

20 Em crianças, a faixa de idade ideal para o treinamento de controle do esfíncter vesical é entre

- (A) 2 e 4 anos.
- (B) 1 e 3 anos.
- (C) 4 e 5 anos.
- (D) 1 e 2 anos.
- (E) 4 e 8 anos.

21 São medidas para redução da pressão arterial, exceto

- (A) suplementação de cálcio e magnésio.
- (B) suplementação de potássio.
- (C) exercício físico aeróbico regular.
- (D) moderação no consumo de álcool.
- (E) dieta hipossódica.

22 Paciente de 43 anos, tabagista, hipertenso há 3 anos sem tratamento, diabético, em uso de glibenclamida 5 mg por dia, obeso, mãe falecida por infarto agudo do miocárdio aos 60 anos, vem à UBS para uma avaliação de rotina. Ao exame físico, apresenta PA = 130/85 mmHg (média de três medidas). Em relação à hipertensão arterial, a conduta correta é

- (A) tratamento não-medicamentoso isolado por até seis meses; se não atingir a meta, associar tratamento medicamentoso.
- (B) tratamento não-medicamentoso isolado, solicitação de exames complementares e reavaliação em um mês.
- (C) tratamento não-medicamentoso e medicamentos associados.
- (D) realização de exames complementares antes de se decidir qualquer plano terapêutico em relação ao paciente.
- (E) Iniciar com diurético e vasodilatador e reavaliar o paciente em seis meses.

23 Você assumiu, há 1 semana, a função de médico de família e comunidade na equipe de saúde da família. Nos primeiros dias de atendimento aos hipertensos e diabéticos, um paciente de 49 anos, hipertenso e diabético em uso de metildopa e glibenclamida. Ele traz vários exames complementares, mas o que lhe chama atenção é a presença de microalbuminúria. Entre as drogas anti-hipertensivas citadas abaixo, a que melhor substituiria a metildopa é

- (A) nifedipina.
- (B) propranolol.
- (C) hidroclorotiazida.
- (D) captopril.
- (E) Furosemida.

24 O processo envolvendo adoecimento e cura tem sido influenciado, através dos tempos, pelos paradigmas que regem a saúde e a doença. Em relação ao processo saúde doença, assinale a alternativa correta.

- (A) A evolução tecnológica e científica baseada no conhecimento biomédico pouco contribuiu à atenção e ao controle dos riscos de doenças.
- (B) Cabe a reflexão de que, para promover a saúde, devem ser consideradas as desigualdades históricas sociais, entre gêneros, brancos e negros, com exceção a aspectos como renda e acesso à educação e à saúde.
- (C) Como o bem-estar é objetivo, independe da cultura e forma de encarar os problemas da vida.
- (D) A valorização do sujeito como ser humano é essencial para as ações de promoção e proteção à saúde, prevenção das doenças, contribuindo para uma atenção integral às pessoas e suas famílias.
- (E) No meio científico e acadêmico, a discussão voltada para um paradigma ampliado de saúde não pode ser atrelado à qualidade de vida e bem-estar.

25 Em relação à prática do exercício físico, marque a opção falsa.

- (A) A prática de atividade física regular por pessoas idosas melhora o condicionamento físico, a capacidade funcional, a autoestima e diminui a ansiedade e a depressão.
- (B) A regularidade do exercício físico é diretamente proporcional à melhoria das condições do paciente.
- (C) Gestação múltipla não é contraindicação para exercícios durante a gestação.
- (D) A fórmula para obter a frequência cardíaca máxima é : 220 menos a idade do paciente em anos.
- (E) Exercícios de intensidade leve e moderada podem ser indicados para a maioria dos adultos sedentários saudáveis sem a necessidade de uma avaliação prévia.