


CONCURSO PÚBLICO

## 022. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO  
(HSPE / PREVENIR)

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



## FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E

06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E

11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E

16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

QUESTÃO	RESPOSTA				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E

31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E

36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

QUESTÃO	RESPOSTA				
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E

46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

51	A	B	C	D	E
52	A	B	C	D	E
53	A	B	C	D	E
54	A	B	C	D	E
55	A	B	C	D	E

56	A	B	C	D	E
57	A	B	C	D	E
58	A	B	C	D	E
59	A	B	C	D	E
60	A	B	C	D	E

## CONHECIMENTOS GERAIS

### POLÍTICA DE SAÚDE

- 01.** A Constituição Federal, ao tratar do “atendimento integral” – uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde – dá prioridade apenas às atividades
- (A) preventivas e assistenciais.
  - (B) preventivas, assistenciais e de reabilitação.
  - (C) de promoção da saúde e de assistência.
  - (D) preventivas.
  - (E) assistenciais.
- 02.** A legislação estabelece como instâncias de participação da comunidade na gestão do SUS apenas
- (A) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde.
  - (B) as Conferências de Saúde, os Conselhos de Saúde e os Conselhos Gestores.
  - (C) os Conselhos de Saúde e os Conselhos Gestores.
  - (D) as Conferências de Saúde Municipais, Estaduais e Nacional.
  - (E) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde – Conass e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – Conasems.
- 03.** Além do atendimento integral, são diretrizes do SUS:
- (A) a equidade e a universalidade.
  - (B) a gratuidade e a universalidade.
  - (C) a descentralização e a participação da comunidade.
  - (D) a descentralização e a equidade.
  - (E) a gratuidade e a participação da comunidade.
- 04.** A estratégia de Saúde da Família
- (A) prevê a implantação de equipes multiprofissionais em serviços de saúde de baixa, média e alta complexidade.
  - (B) propõe que suas equipes atuem com ações voltadas para todos os agravos de uma dada comunidade, dos mais frequentes aos mais raros.
  - (C) coloca a necessidade de se ultrapassarem os limites classicamente definidos para a atenção básica no Brasil.
  - (D) foi iniciada em 2001, tendo apresentado um crescimento pouco expressivo desde então.
  - (E) prevê resultados de longo prazo na mudança do perfil de morbi-mortalidade, não tendo ainda produzido alterações importantes nos principais indicadores de saúde das populações assistidas pelas equipes de Saúde da Família.
- 05.** As responsabilidades de
- I. ordenar a formação de recursos humanos;
  - II. coordenar a execução das políticas de qualificação de recursos humanos em seu território;
  - III. avaliar o desempenho das equipes de atenção básica sob sua supervisão são, respectivamente, das esferas gestoras em Atenção Básica
- (A) federal, estadual e municipal.
  - (B) federal, municipal e estadual.
  - (C) estadual, federal e municipal.
  - (D) estadual, municipal e federal.
  - (E) municipal, estadual e federal.
- 06.** O Ministério da Saúde, ao apresentar o Pacto pela Saúde 2006,
- (A) constatou que o SUS, ao completar uma década e meia de existência, não conseguiu se estruturar enquanto um sistema de saúde sólido e que ainda presta serviços de qualidade insatisfatória à população brasileira.
  - (B) previu que ele deverá ser revisado a cada 10 anos pelos gestores do SUS, com base nos princípios constitucionais e na análise da série histórica dos indicadores de saúde.
  - (C) partiu da constatação de que o Brasil, mesmo sendo um país continental e com muitas diferenças e iniquidades regionais, necessita de uma ação padronizada e uniforme na operacionalização do seu sistema de saúde.
  - (D) priorizou ampliar e qualificar a estratégia de Saúde da Família nas áreas mais distantes dos grandes centros urbanos e com os piores indicadores de saúde de suas populações.
  - (E) definiu como temas prioritários a saúde do idoso; o câncer de colo de útero e de mama; a mortalidade infantil e materna; as doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; a promoção da saúde e a atenção básica à saúde.
- 07.** Numa reunião com a comunidade, foram feitas as seguintes perguntas referentes à tuberculose:
- I. Ela é uma doença que atinge exclusivamente os pulmões?
  - II. Todas as pessoas que entrarem em contato com o bacilo de Koch vão desenvolver a doença?
  - III. Todo paciente com tuberculose pode transmitir a doença?
- As respostas corretas para essas perguntas são, respectivamente:
- (A) sim, sim e sim.
  - (B) não, não e não.
  - (C) sim, não e não.
  - (D) sim, sim e não.
  - (E) não, sim e não.

Considere o enunciado a seguir para responder às questões de números 08 e 09.

“Numa dada comunidade composta por 100 000 habitantes, ao longo de um ano foram registrados 100 casos de câncer de pulmão, sendo que destes 10 evoluíram para óbito.”

08. O coeficiente de letalidade por câncer de pulmão foi de

- (A) 0,01%.
- (B) 0,1%.
- (C) 1%.
- (D) 10%.
- (E) 100%.

09. O coeficiente de mortalidade por câncer de pulmão foi de

- (A) 1 por 100.
- (B) 10 por 1 000.
- (C) 100 por 1 000.
- (D) 0,1 por 1 000.
- (E) 10 por 100 000.

10. Fazem parte da Lista de Doenças de Notificação Compulsória Imediata, no Estado de São Paulo, dentre outras, as seguintes doenças:

- (A) botulismo, carbúnculo e hanseníase.
- (B) cólera, peste e raiva humana.
- (C) febre tifoide, hanseníase e hepatites virais.
- (D) leptospirose, malária e peste.
- (E) coqueluche, dengue e rubéola.

## ATUALIDADES

11. No dia 24 de agosto deste ano (2011), vários portais e jornais brasileiros repercutiram a informação da Agência Reuters sobre a afirmação da Administração de Informação de Energia (AIE) dos EUA de que as exportações americanas de etanol mais que dobraram nos primeiros cinco meses de 2011 e, com isso, os EUA devem superar o Brasil como maior exportador pelo resto do ano. No dia 6 de setembro, esses dados foram confirmados com a explicação de que, segundo a Agência Estado, “o clima desfavorável em áreas de produção do Brasil reduziu a produção de cana-de-açúcar neste ano-safra, tornando o produto mais caro e menos atrativo se comparado ao etanol dos Estados Unidos, cuja principal matéria-prima é

- (A) o arroz.”
- (B) a beterraba.”
- (C) o milho.”
- (D) o girassol.”
- (E) o eucalipto.”

12. Centenas de pessoas, em sua maioria jovens, raspam a cabeça em solidariedade e apoio ao presidente, que vem se submetendo a sessões de quimioterapia para tratamento de um câncer.

(<http://www.observadorpolitico.org.br>. Adaptado)

Essa solidariedade foi prestada ao presidente

- (A) Rafael Ortega, do Equador.
- (B) Evo Morales, da Bolívia.
- (C) Fernando Lugo, do Paraguai.
- (D) Hugo Chávez, da Venezuela.
- (E) Sebastián Piñera, do Chile.

13. O agrônomo e pesquisador Josias Correa de Faria, um dos coordenadores de pesquisa da Embrapa, que buscava um produto resistente à doença chamada de mosaico dourado, anunciou, no dia 28 de agosto deste ano (2011), o sucesso dos experimentos que resultaram na primeira planta geneticamente modificada do Brasil. Ele afirmou que “enquanto numa cultura convencional, à época de alta incidência de mosca branca, são necessárias aplicações semanais de agrotóxico, na cultura transgênica

- (A) do feijão essa prática será desnecessária.”
- (B) do amendoim será preciso somente uma aplicação no momento do plantio.”
- (C) da soja bastará uma aplicação na preparação do solo para plantio.”
- (D) do sorgo essa prática será necessária somente no período da chuva.”
- (E) da lentilha será necessária somente uma aplicação na época da florada.”

14. No dia 06 de setembro de 2011, a Agência Estado informava que “o governo vai cobrar taxa antidumping retroativa.” A finalidade do governo, segundo a matéria, é impedir algumas empresas de
- (A) importar produtos com isenção fiscal nos países de origem.
  - (B) armazenar produtos durante determinado tempo para forçar a alta de preços.
  - (C) exportar abaixo do preço de custo praticado no país de origem até inviabilizar a concorrência.
  - (D) exportar o produto para um país não produtor e depois importá-lo a um preço maior.
  - (E) maquiagem um produto agregando-lhe um valor irreal com o acréscimo de selos ou etiquetas.

15. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que o IPCA encerrou agosto em 0,37%, resultado dentro das expectativas, contra 0,16% em julho. Em 12 meses, a inflação é de 7,23%, a maior desde junho de 2005, e bem distante do teto da meta de 6,5%. Os alimentos responderam por grande parte da alta e cabe notar que as coletas privadas de preços continuam mostrando que esse grupo pode voltar a pressionar o IPCA agora em setembro.

(Valor Online, 06.09.2011. Adaptado)

Por IPCA entende-se o índice de preços calculado

- (A) pelo IBGE depois de apuradas variações regionais. Ele corresponde a um número que tenta refletir a inflação em um contexto nacional.
- (B) de acordo com a variação de preços de uma cesta de produtos padrão em um determinado período.
- (C) com base na variação dos preços no mercado atacadista de todo o território brasileiro.
- (D) considerando o custo de vida de famílias com renda média de R\$ 2,8 mil.
- (E) levando em consideração famílias com rendimentos entre 1 e 40 salários mínimos nas 11 regiões metropolitanas pesquisadas.

16. O Windows 7, supondo em sua configuração padrão, possui um recurso novo em relação à versão anterior, que permite armazenar todos os arquivos e documentos pessoais ou de trabalho de um usuário, bem como arquivos de músicas, imagens e vídeos, em um elemento de armazenamento. Por meio do Painel de Navegação do Windows Explorer, esse elemento pode ser localizado e acessado. Ele se denomina

- (A) Bibliotecas.
- (B) Meus Arquivos.
- (C) Meus Documentos.
- (D) Minhas Pastas.
- (E) Pastas do Usuário.

17. No MS-Word 2010, a partir da guia Página Inicial, grupo Parágrafo, pode-se chegar aos três ícones apresentados a seguir.



Tais ícones representam, respectivamente,

- (A) Apagar Linhas; Exibir Planilha; Emoldurar.
- (B) Calculadora; Exibir Planilha; Exibir Margens.
- (C) Desenhar Linhas de Grade; Calculadora; Exibir Margens.
- (D) Desenhar Tabela; Exibir Linhas de Grade; Bordas e Sombreamento.
- (E) Quadricular; Calculadora; Bordas e Sombreamento.

18. Considere a planilha, elaborada no MS-Excel 2010.

	A	B	C
1	João	Paulo	
2	Eduardo	Carlos	
3	Manoel	Antonio	
4			

Posteriormente, foi inserida a fórmula a seguir na célula C4.

=CONCATENAR(A1;"-";B1)

O resultado produzido em C4 será:

- (A) João
- (B) Paulo
- (C) JoãoPaulo
- (D) João Paulo
- (E) João-Paulo

19. Dentre os possíveis endereços de *e-mail* apresentados, assinale o que apresenta uma estrutura válida.

- (A) meu@email:servidor.com
- (B) meu:email@servidor.com
- (C) meu.email@servidor.com
- (D) meu@email@servidor.com
- (E) @meuemail.servidor.com

20. Considere as seguintes afirmações a respeito da estrutura do URL (*Uniform Resource Locator*) utilizado para localizar recursos da internet:

- I. inclui o endereço do recurso na internet;
- II. identifica o protocolo de acesso utilizado;
- III. inclui uma senha de acesso.

Sobre as afirmações, é correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia o texto e responda às questões de números 21 a 23

Paciente do sexo feminino, 63 anos, pensionista, viúva, obesa (grau 2), mora sozinha em casa própria de alvenaria. Apresenta diagnósticos médicos de hiperlipidemia, hipertensão arterial (HAS) e *diabetes melitus* tipo 2 (DM-2). Trata-se na Unidade de Saúde da Família (USF) e faz uso de medicamentos anti-hipertensivos e hipoglicemiantes orais 2 vezes ao dia. Não pratica atividade física e tem uma dieta inadequada para seu quadro clínico. Na última consulta, a enfermeira da USF detectou úlcera no hálux direito e a paciente relatou que não sente nada e também referiu que há muito não vai à manicure.

A não percepção da lesão no hálux D pode caracterizar um quadro de:

- I. déficit no autocuidado;
- II. neuropatia periférica provocada pela HAS e DM-2;
- III. gerenciamento ineficaz do regime terapêutico;
- IV. perfusão tissular ineficaz;
- V. neuropatia periférica provocada somente pela DM-2.

21. Está correto o que se afirma, apenas, em

- (A) I, II e III.
- (B) I, III e V.
- (C) I, III, IV e V.
- (D) III, IV e V.
- (E) IV e V.

22. A DM-2 pode ser caracterizada por

- (A) sensibilidade diminuída à insulina dos receptores celulares e redução na secreção de insulina pelo pâncreas.
- (B) sensibilidade diminuída à insulina dos receptores celulares e aumento da produção de glucagon pelo pâncreas.
- (C) sensibilidade diminuída à insulina dos receptores celulares ou redução na secreção de insulina pelo pâncreas.
- (D) diminuição da sensibilidade à insulina apenas pelos receptores celulares.
- (E) aumento da glicogenólise hepática com consequente aumento da glicemia e da glicocetonúria.

23. Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2009), considera-se um indivíduo com tolerância à glicose diminuída quando o resultado da glicemia de jejum está entre:

- (A) 126 e 199 mg/dL.
- (B) superior a 126 mg/dL.
- (C) até 99 mg/dL ou mais.
- (D) 200 e 270 mg/dL.
- (E) 100 e 126 mg/dL.

24. O Processo de Enfermagem que fundamenta a Sistematização da Assistência de Enfermagem caracteriza-se pela dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas, visando à assistência ao ser humano. Esse modelo é oriundo da primeira teoria de cuidar formulada por uma brasileira, Wanda de Aguiar Horta, que se fundamenta no seguinte conceito teórico:

- (A) necessidades humanas básicas de Maslow.
- (B) autocuidado de Oren.
- (C) modelo burocrático de Max Weber.
- (D) conceituação clínica de Hipócrates.
- (E) história natural das doenças de Leavel & Clark.

25. O diagnóstico de enfermagem, que compõe a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) normatizada pela e por meio da resolução n.º 272, de 2002, do Cofen, é subdividido em 4 classificações:

Correlacione as classificações do diagnóstico de enfermagem com a respectiva definição e assinale a alternativa correta.

- I. bem-estar      A ( ) conjunto de diagnósticos de enfermagem vigentes ou de alto risco.
- II. risco          B ( ) sustentado por características definidoras (manifestações, sinais e sintomas) que se agrupam em padrões de sugestões ou inferências relacionadas.
- III. real          C ( ) tem potencial aumento para melhora dos níveis de bem-estar.
- IV. síndrome     D ( ) sustentado por fatores de risco que contribuem para uma vulnerabilidade aumentada.

- (A) I-A, II-C, III-D, IV-B
- (B) I-B, II-A, III-C, IV-D
- (C) I-C, II-D, III-B, IV-A
- (D) I-D, II-B, III-A, IV-C
- (E) I-C, II-A, III-B, IV-D

26. A hepatite viral é uma infecção sistêmica, na qual a necrose e a inflamação das células hepáticas produzem um agrupamento característico de alterações clínicas, bioquímicas e celulares. Até o momento, foram identificados 5 tipos definidos de hepatite viral, sendo as hepatites dos tipos A, B e C as mais comuns.

Correlacione o tipo de hepatite viral com as vias de transmissão e assinale a alternativa correta.

- I. Hepatite A      A ( ) Transfusão sanguínea, materiais perfurocortantes contaminados, maior frequência por transmissão sexual.
- II. Hepatite B     B ( ) Transmissão via fecal – oral pela água ou alimento, raramente por contato sexual oral – anal.
- III. Hepatite C    C ( ) Transmissão via parenteral, raramente por contato sexual ou oral – oral; transmissão perinatal, materiais perfurocortantes contaminados.

- (A) I-B, II-A, III-C
- (B) I-A, II-B, III-C
- (C) I-C, II-B, III-A
- (D) I-A, II-C, III-B
- (E) I-C, II-A, III-B

Leia o texto para responder à questão.

27. A resolução 293/04 do Cofen fixa e estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nas unidades assistenciais das instituições de saúde e assemelhadas. O dimensionamento e a adequação quantitativa do quadro de profissionais devem basear-se em características relativas à instituição, ao serviço de enfermagem e à clientela. Considerando-se uma unidade de internação com 30 pacientes internados, com a taxa de ocupação desta unidade de 80%, o cálculo deve ser feito para 24 leitos ocupados. Desses leitos, 50% dos pacientes necessitam de assistência mínima ou autocuidado 3,8 horas de enfermagem por indivíduo internado nas 24 horas; 25%, em assistência intermediária (5,6 horas de enfermagem nas 24 horas, por indivíduo internado nas 24 horas); e 25% em assistência semi-intensiva (9,4 horas de enfermagem por indivíduo internado nas 24 horas). A jornada semanal de trabalho nessa instituição de saúde é de 36 horas e atende durante as 24 horas do dia, durante todos os dias. Considerando-se que o Índice de Segurança Técnico (IST) é de 15% e a fórmula para o cálculo de pessoal é a seguinte:

$$\text{Total de pessoal} = \frac{\text{HAE} \times \text{LEO} \times \text{DS} + \text{IST}}{\text{JT}}$$

Considerando:

HAE = Horas assistência de enfermagem      – DS = Dias da semana

LEO = Leitos efetivamente ocupados      – JT = Jornada de trabalho

IST = Índice de segurança técnico

assinale a alternativa que contém o número de profissionais de enfermagem necessário para a unidade de internação em foco.

- (A) 20.
- (B) 24.
- (C) 30.
- (D) 36.
- (E) 40.

28. Paciente do sexo masculino, solteiro, 32 anos, 65 kg de peso, foi internado no PS de um hospital geral com suspeita de dengue, apresentando sinais de alerta, agitação psicomotora e irritabilidade. Foi prescrito pelo médico hidratação imediata, via endovenosa, com solução salina isotônica de 25 mL/kg de peso em 4 horas. Você deverá regular a bomba de infusão para infundir mL/hora. Assinale a afirmativa que contém o valor correto de infusão.

- (A) 405 mL.
- (B) 135 mL.
- (C) 136 mL.
- (D) 406 mL.
- (E) 1 625 mL.

29. Paciente do sexo feminino, viúva, 54 anos, foi internada na UTI coronariana inconsciente devido a quadro de broncopneumonia e GECA. A paciente apresenta ICC decorrente de 2 IAM anteriores nas artérias descendente anterior e colateral esquerda, ambas com revascularização por meio de angioplastia. Após 24 horas de tratamento, período em que a paciente recebeu 1 000 mL de solução endovenosa, 600 mL de dieta por sonda nasointestinal e eliminou 425 mL de urina, 350 mL de melena, 300 mL de perdas insensíveis e 275 mL de secreção advinda do dreno torácico, o balanço hídrico é de

- (A) -325 mL.
- (B) +250 mL.
- (C) +525 mL.
- (D) -250 mL.
- (E) +1 350 mL.

30. Paciente do sexo feminino, 64 anos, encontra-se hospitalizada por fratura de fêmur D. Aguarda cirurgia em uma enfermaria simples com mais 03 pacientes. Seu filho informou à enfermeira de plantão que a família irá fazer revezamento como acompanhante, entretanto foi informado de que o hospital não possui estrutura para acomodá-los, e dessa forma, nenhum familiar poderá permanecer com a paciente fora do horário de visita. Com relação ao caso, assinale V para verdadeiro e F para falso.

- ( ) O hospital está correto, pois a segurança de todos os pacientes deve ser priorizada.
- ( ) O hospital está errado, pois o Estatuto do Idoso garante o direito de um acompanhante durante toda a internação hospitalar.
- ( ) O hospital é obrigado a permitir acompanhante de internação ao idoso, entretanto, não é obrigado a fornecer condições adequadas de permanência do acompanhante junto à pessoa atendida.
- ( ) No estado de São Paulo, o direito à acompanhante durante todo o atendimento efetuado em unidades de saúde é ampliado a todos os cidadãos, independentemente da idade.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – F – F
- (B) F – F – V – F
- (C) F – V – F – V
- (D) V – V – F – V
- (E) F – V – V – V

31. Na consulta de enfermagem na Unidade de Saúde da Família, a mãe relatou que sua filha de 2 meses de idade está irritada e chorosa. Ao exame clínico, o enfermeiro verificou que a criança apresenta infecção de ouvido. Dentre as alternativas, assinale a que contém uma situação que pode propiciar infecção de ouvido em lactentes.

- (A) Amamentação da criança posicionada em decúbito dorsal.
- (B) Crises de bronquite e bronquillite.
- (C) Má formação do lóbulo da orelha com excesso de produção de secreção auricular.
- (D) Lesão do tímpano provocada por objetos pontiagudos.
- (E) Presença de insetos na tuba auditiva.

Leia o texto para responder às questões de números 32 e 33.

Desde 2006, o Brasil possui uma resolução que regula o sistema de atendimento domiciliar.

32. Assinale a alternativa que contém a resolução correta de Regulamentação Técnica de Funcionamento dos serviços que prestam atendimento de saúde domiciliar.

- (A) RDC 11.
- (B) RDC 50.
- (C) RDC 32.
- (D) RDC 09.
- (E) RDC 36.

33. Como é definido “cuidador” na resolução que regula o sistema de atendimento domiciliar?

- (A) Pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.
- (B) Pessoa com vínculo familiar com ou sem capacitação técnica para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.
- (C) Pessoa sem vínculo familiar com capacitação técnica para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.
- (D) Profissional de enfermagem com capacitação técnica para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.
- (E) Pessoa com capacitação em cuidador de idosos para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.

34. A bexiga neurogênica é uma disfunção que resulta de uma lesão do sistema nervoso. Assinale a alternativa que indica a(s) complicação(ões) clínica(s) mais comum(ns):
- (A) insuficiência renal nos casos de bexiga flácida.
  - (B) urolitíase nos casos de bexiga espástica.
  - (C) infecção vesical nos casos de bexiga espástica.
  - (D) desconforto e incontinência urinária nos casos de bexiga flácida.
  - (E) desconforto e retenção urinária nos casos de bexiga espástica.
35. A insuficiência renal aguda (IRA) é caracterizada por redução abrupta da função renal durante um período e manifesta-se por oligúria ou anúria, apresentando níveis séricos crescentes de ureia e creatinina. Pacientes com IRA podem apresentar distúrbios metabólicos e hidroeletrólíticos detectados nos exames de gasometria, indicativos de
- (A) alcalose metabólica em decorrência do aumento do pH sanguíneo em virtude do aumento da concentração do bicarbonato sanguíneo.
  - (B) acidose metabólica em decorrência do aumento do pH sanguíneo em virtude do aumento da concentração do bicarbonato sanguíneo.
  - (C) alcalose metabólica em decorrência da redução do pH sanguíneo em virtude do aumento da concentração do bicarbonato sanguíneo.
  - (D) acidose metabólica em decorrência da redução do pH sanguíneo em virtude da redução da concentração do bicarbonato sanguíneo.
  - (E) alcalose metabólica em decorrência da redução do pH sanguíneo em virtude da redução da concentração do bicarbonato sanguíneo.
36. Arritmias mais frequentes, que podem levar à parada cardiorrespiratória, são:
- (A) sinusal e fibrilação ventricular.
  - (B) taquicardia e fibrilação ventricular.
  - (C) sinusal e bradicardia atrial.
  - (D) bradicardia atrial e ventricular.
  - (E) flutter e fibrilação atrial.
37. Os ovários produzem hormônios esteroides que atuam no condicionamento do endométrio para nidação do óvulo. No ciclo menstrual, o espessamento do endométrio ocorre na fase
- (A) proliferativa provocado pela ação da progesterona.
  - (B) proliferativa provocado pela ação do estrogênio.
  - (C) lútea provocado pela ação da progesterona.
  - (D) secretora provocado pela ação da progesterona.
  - (E) proliferativa provocado pela ação do hormônio luteinizante.
38. Desde 2005, a Universidade de São Paulo oferece o curso de graduação em obstetrícia na unidade leste, na cidade de São Paulo. Face a essa informação, assinale a alternativa que indica em qual conselho profissional os diplomas dos formandos desse curso de graduação devem ser registrados.
- (A) Conselho Regional de Medicina.
  - (B) Conselho Regional de Enfermagem.
  - (C) Conselho Regional de Obstetrícia.
  - (D) Associação Brasileira de Obstetrias e Enfermeiros Obstetras após prova de titulação.
  - (E) Secretaria Estadual de Educação.
39. Segundo Rouquayrol, a epidemiologia é a “ciência que estuda o processo saúde - doença em coletividades humanas”. Considerando a importância dessa ciência para a atuação do enfermeiro, em qualquer nível de atenção e área de cuidado, analise as afirmações a seguir.
- I. O surto é uma variação atípica da distribuição temporal da doença. Caracteriza-se por casos relacionados entre si em uma área geográfica delimitada.
  - II. Todo indicador de saúde sempre está relacionado à noção de tempo e espaço.
  - III. A epidemiologia, por meio do estudo dos determinantes de saúde e da frequência e distribuição das doenças, procura fornecer subsídios para o planejamento e as ações em saúde no que se refere à atenção primária.
  - IV. A transição epidemiológica não está relacionada à transição demográfica.
- Está correto, apenas, o que se afirma em
- (A) I e II.
  - (B) II e III.
  - (C) III.
  - (D) IV.
  - (E) I, III e IV.
40. O indicador de saúde deve revelar a situação de saúde de um indivíduo ou de uma população. Sobre esse tema, é correto afirmar que
- (A) no cálculo da incidência de uma doença, em uma determinada localidade, incluem-se todos os casos existentes no período de tempo avaliado, inclusive o número de óbitos e cura da doença.
  - (B) os principais indicadores de saúde são a mortalidade e a morbidade, referindo-se ao conjunto de indivíduos que morreram e se curaram de uma determinada doença, respectivamente.
  - (C) os indicadores são uma relação entre dois valores numéricos em que o numerador é representado pelo número de vezes que ocorre determinado evento e o denominador representa o número de pessoas expostas ao risco de apresentar determinado evento.
  - (D) os coeficientes de mortalidade e morbidade não se referem a algum período de tempo e espaço.
  - (E) os indicadores expressam situações multidimensionais da saúde de um indivíduo ou de uma população.

41. Em uma Unidade de Saúde da Família (USF), dentre as ações efetuadas, a vacinação da população da área adscrita é uma atividade corriqueira. As formas de administração das vacinas incluem as vias IM, SC e oral. Em 2009, o parecer da câmara técnica do Coren SP apresentou as vias de administração de medicação IM, bem como os volumes máximos de líquido a serem infundidos em cada via.

Correlacione o músculo com a quantidade de líquido que pode ser infundido em crianças na faixa de 3 a 6 anos de idade e assinale a alternativa correta.

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| I. Deltoide       | A ( ) 1,5 mL |
| II. Vento glúteo  | B ( ) 1,0 mL |
| III. Dorso glúteo | C ( ) 1,5 mL |
| IV. Vasto Lateral | D ( ) 0,0 mL |

- (A) I-A, II-B, III-C, IV-D  
(B) I-D, II-C, III-B, IV-A  
(C) I-B, II-A, III-C, IV-D  
(D) I-A, II-C, III-B, IV-D  
(E) I-A, II-D, III-C, IV-B

42. Dentre os sistemas de informação em saúde existentes no Brasil, assinale a alternativa que indica aquele que fornece dados que auxiliam as equipes de saúde da família, as UBSs e os gestores a conhecerem a realidade sócio-sanitária da população acompanhada, avaliar a adequação dos serviços de saúde fornecidos e melhorar a qualidade dos serviços de saúde.

- (A) SIM.  
(B) SINAN.  
(C) SIAB.  
(D) SIH/SUS.  
(E) AIH.

43. Em relação à Estratégia Saúde da Família (ESF), adotada pelo Ministério da Saúde para reorientar o modelo assistencial de atenção à saúde no Brasil, pode-se afirmar que

- (A) é uma estratégia de implantação rápida, que preconiza técnicas de baixo custo para serem aplicadas em populações pobres.  
(B) garante, dentro do princípio de equidade, assistência de alta complexidade exclusiva para populações carentes.  
(C) é um programa que tem como prioridade a assistência ao idoso e à criança.  
(D) baseia-se em princípios de territorialização e vigilância à saúde da população.  
(E) não está prevista a participação social na elaboração das suas atividades, tendo em vista que os profissionais de saúde participantes da ESF já são altamente qualificados e experientes nas necessidades de saúde da população.

44. Sobre a AIDS, assinale a afirmativa correta.

- (A) AIDS configura-se pelo indivíduo infectado pelo HIV e os casos confirmados são de notificação compulsória no Brasil.  
(B) A AIDS, no Brasil, desde o seu início é classificada como uma doença epidêmica e atualmente encontra-se em fase de regressão na população feminina.  
(C) No exame de confirmação do diagnóstico de AIDS, verifica-se a presença dos vírus na corrente sanguínea.  
(D) O Ministério da Saúde adota a estratégia de classificação de grupos de risco para atuação mais eficaz no tratamento e combate da AIDS.  
(E) Entende-se como um caso de AIDS o indivíduo com infecção avançada pelo HIV com repercussão no sistema imunológico e os casos confirmados são de notificação compulsória no Brasil.

Leia o texto e responda às questões de números 45 e 46.

O Programa Nacional de Imunização, instituído em 1973, tem como objetivo contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis, utilizando estratégias básicas de vacinação de rotina e campanhas anuais desenvolvidas de forma hierarquizada e descentralizada. É orientado por normas técnicas estabelecidas nacionalmente, no que se refere à conservação, manipulação, transporte e à aplicação dos imunobiológicos, assim como aos aspectos de programação e avaliação.

45. Quanto à definição da rede de frio de uma UBS, assinale a alternativa que a define de forma correta.

- (A) É o sistema de preservação dos imunobiológicos (princípios ativos e diluentes), em condições adequadas de refrigeração, durante seu armazenamento, transporte e manipulação, até o momento da administração no paciente.  
(B) É o sistema de conservação dos imunobiológicos, que inclui o armazenamento, o transporte, a manipulação e administração correta no paciente, garantindo a qualidade e a confiabilidade de todo o processo.  
(C) As vacinas que podem ser congeladas são aquelas elaboradas a partir de micro-organismos mortos e as de anatoxinas, como, por exemplo: DTP e BCG, que contêm adjuvante.  
(D) A armazenagem dos imunobiológicos, na UBS, visa manter a temperatura entre 4 °C e 8 °C, e o seu controle deve ser feito diariamente, por meio de um termômetro de máxima e mínima, registrado em planilha específica.  
(E) A armazenagem dos imunobiológicos, na UBS, visa manter a temperatura entre -2 °C e +2 °C e o seu controle deve ser feito diariamente, por meio de um termômetro de máxima e mínima, registrado em planilha específica.

46. Com relação à rede de frio, cabe ao enfermeiro de Unidade Básica de Saúde (UBS) as seguintes ações:
- manter refrigeradores de estoque e de uso diário em temperatura de 4 °C a 8 °C.
  - utilizar os refrigeradores, segundo as normas, uso correto da tomada exclusiva e colocar as vacinas nas prateleiras centrais e na porta.
  - manter os refrigeradores para uso exclusivo de vacinas e insulinas.
  - controlar a temperatura diariamente, por meio de um termômetro de máxima e mínima, três vezes ao dia, registrando em uma planilha específica.
  - manter refrigeradores de estoque e de uso diário em temperatura de -2 °C a +2 °C.
47. Paciente do sexo feminino, 57 anos, compareceu à UBS para aferição da pressão arterial e glicemia capilar. Referiu última refeição há duas horas. A PA estava 162 x 108 mmHg e a glicemia capilar 171 mg/dL. Segundo a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão e as Diretrizes da Sociedade Brasileira de *Diabetes Mellitus* – 2009, como você classificaria esses valores?
- Hipertensão estágio I e *Diabetes Mellitus*.
  - Hipertensão estágio III e *Diabetes Mellitus*.
  - Pressão normal alta e tolerância à glicose diminuída.
  - Hipertensão estágio II e tolerância à glicose diminuída.
  - Hipertensão estágio II e glicemia normal.
48. O Planejamento Familiar é um dos Programas mais importantes da Área Técnica de Saúde da Mulher, pois reflete em indicadores importantes, como a mortalidade materna e infantil e o controle da natalidade. Com relação ao Planejamento Familiar, pode-se afirmar que
- é fundamental o direito ao acesso aos anticoncepcionais recomendados pelo Ministério da Saúde.
  - o preservativo feminino e o diafragma são anticoncepcionais não financiados pelo Ministério da Saúde.
  - a laqueadura pode ser feita desde que respeitado o prazo mínimo de 90 dias entre a manifestação da vontade e a cirurgia.
  - o acesso à informação deve ser assegurado para que a mulher escolha o número de filhos, o espaçamento entre eles e a escolha do anticoncepcional mais adequado.
  - as alternativas A e C estão corretas.
49. Visando apoiar a inserção da Estratégia Saúde da Família na rede de serviços e ampliar as ações da Atenção Primária, bem como sua resolutividade, o Ministério da Saúde criou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, conforme a Portaria GM n.º 154, de 24 de Janeiro de 2008, republicada em 04 de Março de 2008. Segundo essa Portaria, é correto afirmar que
- as equipes NASF devem atuar em conjunto com os profissionais das Equipes de Saúde da Família, nos territórios sob sua responsabilidade, por meio de consultas compartilhadas, visando à recuperação e reabilitação dos usuários que necessitam desse tipo de atendimento.
  - existem duas modalidades de NASF: NASF 1, que deverá ser implementado em municípios com menos de 100 000 habitantes, composto, no mínimo, por três profissionais de nível superior, vinculado de 05 a 20 Equipes de Saúde da Família; o NASF 2, que deverá ser composto por, no mínimo, cinco profissionais de nível superior, vinculado a, no mínimo, 08 Equipes de Saúde da Família.
  - a definição dos profissionais que irão compor os núcleos é de responsabilidade dos gestores municipais, seguindo os critérios de prioridade identificados a partir das necessidades locais e da disponibilidade de profissionais de cada uma das diferentes ocupações.
  - os profissionais que podem fazer parte das equipes de NASF 1 são: psicólogo, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, profissional da educação física, nutricionista, terapeuta ocupacional, médico ginecologista, médico homeopata, médico acupunturista, médico pediatra, médico psiquiatra e médico geriatra.
  - Apenas as alternativas C e D estão corretas.
50. A dermatite de contato é uma reação inflamatória da pele, alérgica ou não, a agentes físicos, químicos ou biológicos. Analise os sintomas listados a seguir:
- prurido;
  - descamação epitelial;
  - eritema;
  - máculas;
  - queimação.
- Apresenta sintomas mais comuns nos estágios iniciais dessa afecção, apenas, o contido em
- I e II.
  - I, II e III.
  - I e IV.
  - I, III e V.
  - III, IV e V.

51. A Norma Regulamentadora que dispõe sobre a responsabilidade compartilhada entre contratantes e contratados de serviços de saúde e estabelece diretrizes básicas para implantação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores da área da saúde é a NR
- (A) 4.  
(B) 7.  
(C) 22.  
(D) 32.  
(E) 34.
52. Para responder à questão, analise as afirmativas sobre sinais e sintomas positivos ou objetivos ou de certeza para a gravidez.
- I. Percepção e palpação dos movimentos fetais.  
II. Palpação das partes fetais.  
III. Auscultação dos batimentos cardíacos fetal.  
IV. Visualização do saco gestacional com embrião nidado.
- Está correto o contido em
- (A) I, apenas.  
(B) II, apenas.  
(C) I e II, apenas.  
(D) I, II e III, apenas.  
(E) I, II, III e IV.
53. Sobre as alterações fisiológicas que ocorrem na gravidez, pode-se afirmar que
- (A) o volume de sangue é aumentado em mais de 80%.  
(B) a frequência cardíaca em repouso aumenta cerca de 40 batimentos/minuto.  
(C) há hipertrofia em todo o sistema reprodutor feminino.  
(D) as modificações na glândula mamária e mamilos são pequenas.  
(E) a linha nigra é o escurecimento da linha inominada.
54. Moral e ética, muitas vezes, na linguagem cotidiana, são tidas como sinônimos porém, para a filosofia, compõem áreas distintas do pensamento filosófico. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.
- (A) A ética se aplica à disciplina filosófica que estabelece os fundamentos e a validade das normas morais e dos juízos de valor ou de apreciação sobre as ações humanas.  
(B) A ética chamou a atenção de filósofos gregos como Aristóteles, no entanto, a história filosófica não trouxe contribuições para a ética.  
(C) A questão da moral não se enquadra nos estudos sobre a ética, pois quando falamos em moral, estamos diante de algo muito subjetivo.  
(D) No século VII, vários pensadores e grandes expoentes da filosofia, tal como Spinoza, negaram a importância dos estudos da ética.  
(E) Os estudos sobre a ética só tomaram fôlego no século X com a obra de filósofos contemporâneos como Michel Foucault e Jean Paul Sartre.

55. É uma urgência psiquiátrica caracterizada por sinais e sintomas como alucinações e distúrbios do pensamento, de fundo persecutório, sudorese, taquicardia, insônia e convulsão:
- (A) neurose.  
(B) depressão neurótica.  
(C) fobia.  
(D) angústia.  
(E) *delirium tremens*.
56. Na cirurgia de safenectomia, a ferida operatória no paciente é considerada limpa ou não contaminada. Os cuidados com o curativo poderão ser executados pelo próprio paciente na sua residência ou em estabelecimento de saúde. A sequência correta para execução do curativo é: usar
- (A) luvas de procedimento, limpar a incisão com soro fisiológico da região da menos contaminada para a mais contaminada e cobrir a ferida com o novo curativo seco.  
(B) pinças, limpar a incisão com soro fisiológico morno, cobrir a ferida com o novo curativo seco.  
(C) luvas cirúrgicas e pinças, limpar a incisão com soro fisiológico morno da região limpa para a suja, e cobrir a ferida com curativo seco quando estiver com secreção.  
(D) luvas cirúrgicas, limpar a incisão com soro fisiológico sob pressão na seringa, cobrir a ferida com o novo curativo seco.  
(E) uma das pinças e desprezá-la, limpar a incisão com soro fisiológico com pressão de jato de seringa de 20 mL, cobrir a ferida com o novo curativo seco.

57. Correlacione as etapas para a execução do curativo (coluna 1) com a respectiva justificativa (coluna 2)

ETAPAS	JUSTIFICATIVAS
I. Avaliar o tamanho e a localização da ferida.	A( ) Diminuir a ansiedade. Algum movimento súbito e inesperado pode resultar em contaminação da ferida e dos materiais usados no curativo.
II. Explicar o que será feito e solicitar ao paciente que não toque na ferida ou nos materiais usados.	B( ) Ajuda o profissional a planejar materiais e quais procedimentos serão adotados para aquele tipo de ferimento.
III. Calçar luvas descartáveis limpas e remover o curativo sujo.	C( ) Os curativos estéreis assim permanecem enquanto permanecerem dentro do envólucro ou sobre superfície estéril.
IV. Abrir o pacote de curativo na mesa auxiliar com cuidado, pois o mesmo encontra-se esterilizado.	D( ) Impede a transmissão de organismos infecciosos dos curativos para o profissional.

Assinale a alternativa que demonstra a correta associação.

- (A) I-B, II-A, III-D, IV-C  
(B) I-A, II-B, III-C, IV-D  
(C) I-D, II-C, III-B, IV-A  
(D) I-C, II-B, III-D, IV-A  
(E) I-D, II-A, III-B, IV-C

- 58.** O Ministério da Saúde disponibiliza para pessoas, a partir dos 15 anos de idade, uma série de vacinas. Assinale a alternativa que contém quais vacinas são disponibilizadas para trabalhadores adultos, incluindo os trabalhadores da área de saúde.
- (A) dT, SCR.
  - (B) dT, SCR, hepatite B.
  - (C) dT, SCR, hepatite B, Influenza.
  - (D) dT, SCR, hepatite B, Influenza, febre tifoide.
  - (E) dT, SCR, hepatite B, Influenza, febre tifoide, antirrábica.
- 59.** Para responder à questão, leia as afirmações que se referem ao uso da vacina dupla adulto.
- I. Protege contra difteria e tétano.
  - II. Sua apresentação é na forma líquida, em ampolas de dose única ou frasco ampola com mais doses.
  - III. A via de administração é intramuscular e pode ser aplicada no músculo deltoide e glúteo.
  - IV. A idade de aplicação é a partir de 7 anos de idade e não há limites a partir dessa idade.
- Está correto o contido em
- (A) I, apenas.
  - (B) II, apenas.
  - (C) I e II, apenas.
  - (D) I, II e III, apenas.
  - (E) I, II, III e IV.
- 60.** No relacionamento enfermeira – paciente, o profissional procura experimentar a chamada “empatia” quando
- (A) resolve rapidamente os problemas do paciente, sem que ele peça.
  - (B) tem a capacidade de tentar ver o mundo como o paciente o vê, sem perder a própria identidade.
  - (C) reconhece no paciente qualidade que é igual à que gostaria de possuir.
  - (D) experimenta sentimento de desagrado ao conversar com o paciente.
  - (E) mostra atitude de aceitação passiva sem promover desagrado ao paciente.





