

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO – PE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2011

15 QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA

01-Em 1981-1982, em Boa Vista - Roraima, ocorreu a primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente da dengue no Brasil causada pelos sorotipos 1 e 4. Desta forma, a partir de que ano e pela introdução de que sorotipo foram registradas epidemias em diversos estados brasileiros?

- A. A partir de 1986 / sorotipo 1.
- B. A partir de 1987 / sorotipo 2.
- C. A partir de 1988 / sorotipo 3.
- D. A partir de 1989 / sorotipo 4.
- E. A partir de 1990 / sorotipo 4.

02-Na efetivação da Política Nacional de Humanização (PNH) como política pública de saúde, o Ministério da Saúde estabeleceu alguns princípios norteadores que inclui, EXCETO:

- A. Valorização da dimensão subjetiva, coletiva e social garantindo os direitos dos cidadãos.
- B. Realização de trabalho em equipe multiprofissional.
- C. Valorização da busca por dados através da Vigilância Epidemiológica e Sanitária.
- D. Construção de redes cooperativas; fortalecimento do controle social.
- E. Valorização da ambiência possibilitando um saudável ambiente de trabalho.

03-A notificação (mesmo quando negativa, ou seja, quando nenhum caso de nenhuma das doenças da lista ocorreu) deve ser feita semanalmente. Para facilitar esta notificação, o ano é dividido em:

- A. 33 semanas, denominadas semanas epidemiológicas.
- B. 46 semanas, denominadas semanas epidemiológicas.
- C. 52 semanas, denominadas semanas epidemiológicas.
- D. 64 semanas, denominadas semanas epidemiológicas.
- E. 82 semanas, denominadas semanas epidemiológicas.

04-Referem-se aos princípios do SUS, EXCETO:

- A. Saúde como um direito de cidadania e responsabilidade do Estado.
- B. Unificação do Sistema com radical descentralização (MS único, implantação do INAMPS). Financiamento compartilhado entre os três níveis de governo.
- C. Participação social (Conselhos de Saúde e Conferências)
- D. Equidade
- E. Integralidade

05-Quanto a participação do setor privado no SUS é INCORRETO afirmar:

- A. Art. 199, § 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo as diretrizes deste, mediante contrato de direito público.
- B. As entidades não podem participar através de convênio.

- C. É permitida quando as unidades públicas de saúde não forem suficientes para garantir o atendimento às pessoas de uma determinada área.
- D. Dá-se de forma complementar.
- E. Tem prioridade as Instituições Filantrópicas e sem fins lucrativos

06-Referente à obtenção de medicamentos no SUS é INCORRETO afirmar:

- A. Os medicamentos básicos são adquiridos pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, dependendo do pacto feito na região.
- B. A insulina humana e os chamados medicamentos estratégicos - incluídos em programas específicos, como Saúde da Mulher, Tabagismo e Alimentação e Nutrição - são obtidos pelo Ministério da Saúde.
- C. Os medicamentos excepcionais (aqueles considerados de alto custo ou para tratamento continuado, como para pós-transplantados, síndromes – como Doença de Gaucher – e insuficiência renal crônica) são comprados pelas secretarias de saúde, o ressarcimento a elas é feito mediante comprovação de entrega ao paciente.
- D. Em média, o governo federal repassa 50% do valor dos medicamentos excepcionais, dependendo dos preços conseguidos pelas secretarias de saúde nos processos licitatórios.
- E. Os medicamentos para DST/AIDS são comprados pelo ministério e distribuídos para as secretarias de saúde.

07-Referente a responsabilidade financeira do governo federal na área de saúde é INCORRETO afirmar:

- A. A gestão federal da saúde é realizada por meio do Ministério da Saúde.
- B. O governo federal é o principal financiador da rede pública de saúde.
- C. Historicamente, o Ministério da Saúde aplica um terço de todos os recursos gastos no país em saúde pública em todo o Brasil. Estados e municípios, em geral, contribuem com o resto dos recursos.
- D. O Ministério da Saúde formula políticas nacionais de saúde, mas não realiza as ações. Para a realização dos projetos, depende de seus parceiros (estados, municípios, ONGs, fundações, empresas, etc.).
- E. O Ministério da Saúde tem a função de planejar, criar normas, avaliar e utilizar instrumentos para o controle do SUS.

08-Sobre as limitações da Proporção de Internações Hospitalares (SUS) por Causas Externas é INCORRETO afirmar:

- A. A oferta de serviços reflete a disponibilidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, bem como os critérios técnico-administrativos de pagamento adotados no âmbito do SUS.
- B. Não são consideradas as internações em unidades hospitalares sem vínculo com o SUS, as quais podem

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO – PE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2011

concentrar atendimento em determinadas especialidades assistenciais, influenciando o padrão de atendimento no SUS.

- C. O aumento proporcional de internações por determinado tipo de causa externa pode dever-se apenas a redução das ocorrências em outros tipos.
- D. O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsistências na classificação da causa informada.
- E. Até 1995, quando era utilizada a 9ª Revisão da CID (CID-9), as internações podiam ser classificadas tanto pelo capítulo XVII (Lesões e Envenenamentos, segundo a natureza da lesão) como pela Classificação Suplementar (Causas Externas de Lesões e Envenenamentos), impossibilitando o cálculo deste indicador.

09-Sobre os sistemas sentinelas é INCORRETO afirmar:

- A. Para intervir em determinados problemas de saúde, pode-se lançar mão de sistemas sentinelas de informações capazes de monitorar indicadores chaves na população geral ou em grupos especiais, que sirvam de alerta precoce para o sistema de vigilância.
- B. Existem vários tipos desses sistemas, como, por exemplo, a organização de redes constituídas de fontes sentinelas de notificação especializadas, que já vêm sendo bastante utilizadas para acompanhamento e vigilância da situação de tuberculose e de influenza.
- C. Evento sentinela é a detecção de doença prevenível, incapacidade, ou morte inesperada, cuja ocorrência serve como um sinal de alerta de que a qualidade terapêutica ou prevenção deve ser questionada. Entende-se que, toda vez que isso ocorre, o sistema de vigilância deve ser acionado para que o evento seja investigado e as medidas de prevenção adotadas.
- D. A instituição de unidades de saúde sentinela tem sido muito utilizada no Brasil para a vigilância das doenças infecciosas e parasitárias que demandam internamento hospitalar.
- E. O monitoramento de grupos alvos, através de exames periódicos, é de grande valor na área de prevenção de doenças ocupacionais. Mais recentemente, tem-se trabalhado no desenvolvimento de vigilância de espaços geográficos delimitados em centros urbanos, que tem sido denominada vigilância de áreas sentinelas.

10-Referente à coleta de dados e informações na vigilância epidemiológica é INCORRETO afirmar:

- A. Os responsáveis pela coleta devem ser preparados para aferir a qualidade do dado obtido. Tratando-se, por exemplo, da notificação de doenças transmissíveis, é fundamental a capacitação para o diagnóstico de casos e a realização de investigações epidemiológicas correspondentes.
- B. Como princípio organizacional, o sistema de vigilância deve abranger o maior número possível de fontes geradoras, cuidando-se de que seja assegurada a regularidade e oportunidade da transmissão dos dados.

- C. O fluxo, a periodicidade e os tipos de dados coletados devem corresponder a necessidades de utilização previamente estabelecidas, com base em indicadores adequados às características próprias de cada doença ou agravo sob vigilância.
- D. A prioridade de conhecimento do dado será concedida, preferencialmente, à instância responsável pela execução das medidas de prevenção e controle.
- E. Quando for necessário o envolvimento de outro nível do sistema, o fluxo deverá ser suficientemente rápido para que não ocorra atraso na adoção de medidas de prevenção e controle.

11-A partir dos relatórios padronizados ou dos dados da Ficha de Registro Ambulatorial (FRA) e da Ficha de Identificação Profissional (FIP), o Sigab pode fornecer, entre outras possibilidades, as seguintes informações, EXCETO:

- A. Distribuição de primeira vez e retornos.
- B. Distribuição de motivo de consulta ou de diagnósticos por especialidade.
- C. Procedimentos odontológicos por sexo e por faixa etária.
- D. Captação de adolescentes gestantes, por bimestre, para o pré-natal.
- E. Distribuição por sexo nas diferentes especialidades.

12-A Taxa de mortalidade materna para o Brasil utiliza o número total de óbitos maternos informados ao SIM, ajustado pelo fator de correção de:

- A. 1,04
- B. 1,13
- C. 1,36
- D. 1,42
- E. 2,02

13-O Plano Diretor de Regionalização - PDR deve garantir o acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas de assistência pré-natal, parto e puerpério, das quais NÃO inclui:

- A. Tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais frequentes.
- B. Cobertura universal do esquema preconizado pelo PNI para todas as faixas etárias.
- C. Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.
- D. Tratamento das intercorrências mais comuns na infância.
- E. Atendimento de afecções agudas de maior incidência.

14-A Regulação da Atenção à Saúde tem como objeto a produção de todas as ações diretas e finais da atenção à saúde, dirigida aos prestadores de serviços de saúde, públicos e privados. As ações da Regulação da Atenção à Saúde compreendem, EXCETO:

- A. A Regulação do Acesso à Assistência ou Regulação Assistencial.
- B. O Controle Assistencial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO – PE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2011

- C. A Avaliação da Atenção à Saúde.
- D. A Auditoria Assistencial.
- E. As regulamentações da Vigilância Epidemiológica (a sanitária não se inclui neste perfil).

15-Quanto ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) é INCORRETO afirmar:

- A. É o mais importante para a Vigilância Epidemiológica.
- B. O Sinan foi concebido pelo Centro Nacional de Epidemiologia, com o apoio técnico do DATASUS e da Prodabel (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte).
- C. É alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória.
- D. É obrigatório a estados e municípios incluírem outros problemas de saúde, importantes em sua região.
- E. A entrada de dados, no Sinan, é feita mediante a utilização de alguns formulários padronizados.

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16-Na classificação de Heath-Edwards (doenças vascular pulmonares), a Fibrose intimal relativamente acelarar com acúmulo de massas concêntricas ou excêntricas de tecido fibroso, levando à oclusão disseminada das artérias pulmonares menores e das arteríolas inclui-se no grau:

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

17-Em uma anormalidade na pressão e no pulso venoso, um refluxo hepatojugular positivo deve-se suspeitar de:

- A. Disfunção sistólica ventricular esquerda.
- B. Tamponamento cardíaco.
- C. Pericardite constrictiva.
- D. Cardiomiopatia restritiva.
- E. Hipertensão pulmonar.

18-A inflamação NÃO se caracteriza:

- A. Pela vasodilatação dos vasos sanguíneos locais, com o conseqüente excesso do fluxo sanguíneo local.
- B. Pelo aumento da permeabilidade dos capilares, com extravasamento de grande quantidade de líquidos para os espaços intersticiais.
- C. Sempre pela coagulação do líquido nos espaços intersticiais, devido às quantidades excessivas de fibrinogênio e de outras proteínas que vazaram dos capilares.
- D. Pela migração de grande número de granulócitos e monócitos para o tecido.
- E. Pela intumescência das células.

19-As úlceras neurotróficas podem ser descritas a partir das seguintes características, EXCETO:

- A. São lesões anestésicas.
- B. São circulares.
- C. São geralmente quentes.
- D. Apresentam sinais de infecção.
- E. Desenvolvem-se sobre áreas de proeminências ósseas, com maior frequência nos membros inferiores.

20-Os achados laboratoriais da Síndrome dos ovários policísticos incluem, EXCETO:

- A. Elevação da testosterona total ou livre ao redor de 3,5 vezes do normal.
- B. LH aumentado em aproximadamente 80% das pacientes.
- C. Relação LH/FSH aumentada em 75% dos casos.
- D. Aumento da concentração de SHBG (Sex Hormone-Binding Globulin).
- E. Elevação dos andrógenos DHEA-S e DHEA em 20% das pacientes, com elevação freqüente da 17OH progesterona basal ou após estímulo com GnRH, exigindo o diagnóstico diferencial com a hiperplasia adrenal congênita.

21-No quadro clínico da Leishmaniose Visceral, é sintoma do período final da doença:

- A. Tosse seca.
- B. Sopro sistólico panfocal.
- C. Febre recorrente.
- D. Adinamia.
- E. Emagrecimento.

22-A angioplastia é considerada efetiva se houver _____ de estenose residual após o término do procedimento. A alternativa que preenche corretamente a lacuna é:

- A. Menos de 10%.
- B. Mais de 10%.
- C. Menos de 20%.
- D. Mais de 20%.
- E. Menos de 30%.

23-As patologias que mais comumente apresentam valores altos de amilase são, EXCETO:

- A. Pancreatite aguda primária.
- B. Pancreatite crônica recidivante.
- C. Úlcera péptica perforada.
- D. Perfuração do intestino.
- E. Miosite.

24-Dos antidiabéticos orais, faz parte do grupo das biguanidas:

- A. Metformina.
- B. Acarbose.
- C. Rosiglitazona.
- D. Pioglitazona.
- E. Tiazolidinedionas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO – PE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2011

25-Sobre os aspectos legais do consentimento ao abortamento fetal é INCORRETO afirmar:

- A. Segundo o Código Penal, é imprescindível o consentimento por escrito da mulher para a realização do abortamento em caso de violência sexual, que deve ser anexado ao prontuário médico.
- B. O Código Civil estabelece que, a partir dos 18 anos, a mulher é considerada capaz de consentir sozinha para a realização do abortamento.
- C. Se a adolescente ou criança tem idade menor que 18 anos, deve ser representada pelos pais ou por seu representante legal, que se manifestam por ela.
- D. O consentimento do(a) representante legal também é necessário se a mulher, por qualquer razão, não tiver condição de discernimento e expressão de sua vontade, a exemplo das deficientes mentais.
- E. É desejável que conste no termo de consentimento a informação à mulher ou a seu representante legal da possibilidade de responsabilização criminal, caso as declarações prestadas forem falsas, conforme art. 299 do Código Penal, sem prejuízo para a credibilidade da palavra da mulher.

26-Os principais sintomas da Síndrome de Cushing são, EXCETO:

- A. Aumento de peso, com a gordura se depositando no tronco e no pescoço, preenchendo a região acima da clavícula e a parte detrás do pescoço.
- B. A gordura também se deposita no rosto, na região malar ("maças do rosto"), onde a pele fica também avermelhada, formando-se uma face que é conhecida como de "lua-cheia".
- C. Ocorre também afilamento dos braços e das pernas com diminuição da musculatura, e consequente, fraqueza muscular que se manifesta principalmente quando o paciente caminha ou sobe escadas.
- D. Sintomas gerais como fraqueza, cansaço fácil, nervosismo, insônia e labilidade emocional também podem ocorrer. Nas mulheres são muito frequentes as alterações menstruais e o surgimento de pêlos corporais na face, no tórax, abdômen e nos braços e pernas.
- E. Como grande parte dos pacientes desenvolve hipertensão arterial e diabetes, podem surgir sintomas associados ao aumento da glicose e da pressão arterial tais como dor de cabeça, sede exagerada, diminuição do volume urinário, diminuição do apetite e visão borrada.

27-São manifestações sugestivas de aplasia medular, EXCETO:

- A. Mal-estar.
- B. Dores musculares.
- C. Cefaléia.
- D. Sinais de infecção do trato respiratório superior.
- E. Redução acentuada dos níveis basais de hemoglobina (redução de 10% ou queda de 1 a 2 g/dl de Hb ou mais) e do número de reticulócitos.

28-No HIPERDIA para o tratamento da Hipertensão arterial, foram estabelecidos os medicamentos:

- A. Captopril comp. 25 mg, Hidroclorotiazida comp. 25 mg e Propranolol comp. 30 mg.
- B. Captopril comp. 25 mg, Hidroclorotiazida comp. 25 mg e Propranolol comp. 40 mg.
- C. Captopril comp. 25 mg, Hidroclorotiazida comp. 40 mg e Propranolol comp. 60 mg.
- D. Captopril comp. 40 mg, Hidroclorotiazida comp. 25 mg e Propranolol comp. 60 mg.
- E. Captopril comp. 40 mg, Hidroclorotiazida comp. 40 mg e Propranolol comp. 60 mg.

29-São vantagens da veia jugular interna (VJI), EXCETO:

- A. Menor risco de complicações graves em relação à VSC (veia subclávia).
- B. A VJI é relativamente superficial, o local é compressível manualmente e o acesso ao vaso e estruturas subjacentes é fácil se houver necessidade de controle cirúrgico de complicações.
- C. Em discrasias sanguíneas de moderada gravidade, sua punção é possível, utilizando-se cuidadosamente a técnica de Seldinger.
- D. Durante a ressuscitação cardiopulmonar, a VJI pode ser canulada por pessoa treinada.
- E. Anatomia bem fixa.

30-Sobre as vias aéreas em pacientes queimados é INCORRETO afirmar:

- A. Sinais objetivos de injúria pulmonar ou história de queimadura em ambiente fechado requerem um imediato plano de ação.
- B. As manifestações clínicas de queimaduras de vias aéreas são frequentemente inaparentes nas primeiras 06-12 h após a lesão.
- C. Importante edema da faringe pode se formar, sendo imperativas a intubação orotraqueal e a ventilação mecânica.
- D. Broncoscopia com fibra óptica pode ser realizada para a confirmação do diagnóstico.
- E. A gasometria arterial deve ser realizada inicialmente, servindo de base para o acompanhamento evolutivo.

31-Sobre o diagnóstico da hepatite A é INCORRETO afirmar:

- A. A doença pode ocorrer de forma esporádica ou em surtos e, devido à maioria dos casos cursar sem icterícia e com sinais e sintomas pouco específicos, pode passar na maioria das vezes despercebida, favorecendo a não identificação da fonte de infecção.
- B. Nos pacientes sintomáticos, o período de doença se caracteriza pela presença de colúria, hipocolia fecal e icterícia.
- C. A frequência da manifestação icterícia aumenta de acordo com a faixa etária, variando de 5 a 10% em menores de seis anos e chegando até 70-80% nos adultos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO – PE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2011

- D. O diagnóstico específico de hepatite A aguda é confirmado, de modo rotineiro, através da detecção de anticorpos anti-HAV da classe IgG.
- E. Em surtos pode-se confirmar a hepatite A também por vínculo epidemiológico, depois que um ou dois casos apresentaram anticorpos anti-HAV da classe IgM.

32-São elementos da estrutura organizacional do serviço de enfermagem, EXCETO:

- A. Responsabilidade: - são as atividades e obrigações que o indivíduo tem que cumprir na sua unidade de trabalho.
- B. Autoridade: - é o direito de tomar decisões – está relacionada à hierarquia, isto é, quanto maior a hierarquia, maior é a autoridade e vice-versa.
- C. Comunicação: - é o processo de transmissão das informações entre os profissionais da empresa.
- D. Capacidade decisória: - significa analisar antecipadamente os problemas e priorizar as decisões a serem tomadas.
- E. Formalização: - organização do trabalho por meio de regras, normas, regulamentos, instruções que pretendem determinar o comportamento dos trabalhadores.

33-M.A.F., 10 anos, três dias após ser atendida anteriormente com febre alta e cefaléia intensa, foi diagnosticada com dengue hemorrágica/síndrome de choque da dengue; sendo referida para internação hospitalar. Os elementos clínico-laboratoriais que sugerem este diagnóstico são, EXCETO:

- A. Dor abdominal.
- B. Leucopenia.
- C. Plaquetopenia.
- D. Hemoconcentração.
- E. Vômitos volumosos.

34-A fibrose é a formação de um tecido substitutivo fibroso duro, formado por fibrócitos (células fibrosas). São exemplo de fibrose, EXCETO:

- A. As lesões necróticas da parede intestinal e do fígado provocadas pelo agente patógeno da amebíase (*Schistosoma histolítica*) tendem para a cura, obtida com a proliferação do tecido conjuntivo.
- B. Lesões degenerativas do fígado e do baço no curso da malária e da leishmaniose visceral podem sofrer um processo cirrótico cicatricial.
- C. Lesões hiperplásicas, como as da filariose e da sarna crostosa, podem regredir lentamente para a normalidade.
- D. Lesões inflamatórias de tipo exsudativo também podem regredir à normalidade tecidual sob a ação de fármacos.
- E. As lesões intestinais de febre tifóide evoluem de uma fase hiperplásica para a necrose, e posteriormente, para uma cicatrização.

35-As anemias hemolíticas constituem estados anêmicos decorrentes da diminuição da sobrevivência/precoce dos glóbulos vermelhos (Eritrócitos). São anemias de origem hereditária, EXCETO:

- A. Síndrome de Crosby.
- B. Síndrome de Rundles Falls.
- C. Síndrome de Dresbach.
- D. Síndrome de Evans (associada a púrpura trombocitopênica).
- E. Síndrome de Minkowski-Chauffard-Gaensslen.

36-Referente a sífilis adquirida tardia é INCORRETO afirmar:

- A. É considerada tardia após o primeiro ano de evolução e ocorre em doentes que não receberam tratamento adequado ou que não foram tratados.
- B. Suas manifestações clínicas surgem depois de um período variável de latência e compreendem as formas cutânea, óssea, cardiovascular, nervosa e outras.
- C. As reações sorológicas são negativas.
- D. A sífilis tardia cutânea caracteriza-se por lesões gomosas e nodulares, de caráter destrutivo.
- E. Na sífilis óssea, pode haver osteíte gomosa, periostite, osteíte esclerosante, artralgias, artrites, sinovites e nódulos justo-articulares.

37-Considera-se como alto um coeficiente de mortalidade infantil a partir de:

- A. 20 ou mais para 1.000 nascidos vivos.
- B. 30 ou mais para 1.000 nascidos vivos.
- C. 40 ou mais para 1.000 nascidos vivos.
- D. 50 ou mais para 1.000 nascidos vivos.
- E. 60 ou mais para 1.000 nascidos vivos.

38-A Lei Eloy Chaves foi aprovada em:

- A. 1915
- B. 1923
- C. 1932
- D. 1941
- E. 1945

39-O estreptococo A beta-hemolítico é o agente etiológico de, EXCETO:

- A. Faringite.
- B. Escarlatina.
- C. Impetigo.
- D. Endocardite bacteriana.
- E. Legionelose.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO – PE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2011

40-Sobre a Leucemia linfoblástica aguda é INCORRETO afirmar:

- A. É caracterizada pelo crescimento rápido de células sanguíneas imaturas.
- B. O crescimento de células torna a medula óssea incapaz de produzir células sanguíneas saudáveis.
- C. O tratamento imediato é necessário na leucemia aguda devido à rápida progressão e acúmulo de células malignas, ocasionando metástase.
- D. Se não houver tratamento, o paciente morrerá em alguns anos ou até meses.
- E. Tratamentos: transplante de medula óssea e poliquimioterapia.