

01. Assinale a opção INCORRETA a respeito da fluoroterapia.
- Os dentifrícios fluoretados são o método de disponibilização de flúor desenvolvido com mais sucesso.
  - O flúor incorporado aos dentes durante o desenvolvimento resulta por si só em alta resistência à cárie.
  - Dentifrícios contendo 5.000 ppm de fluor, podem ser indicados para o controle de formas de cárie rampante por períodos limitados.
  - O modo de ação primário do flúor é o tópico.
  - A intoxicação por flúor pode provocar hipotensão e náusea.
02. Com relação à esterilização, assinale a opção correta.
- A autoclave deve ser preenchida na sua totalidade a fim de permitir a circulação do vapor de água.
  - As autoclaves não devem ser testadas quanto à sua eficiência por risco de perder a garantia.
  - Na autoclave não se corre o risco de perder o corte dos instrumentos.
  - Na autoclave, as caixas metálicas não devem ser fechadas.
  - Durante a esterilização, o processo pode ser interrompido a qualquer momento sem prejuízo nenhum.
03. Em relação à biossegurança, assinale a opção correta.
- A antisepsia visa o controle da infecção a partir do uso de substâncias bactericidas ou bacteriostáticas de uso em superfícies.
  - Artigos críticos são instrumentos que não penetram na pele ou mucosa, mas que precisam de esterilização ou uso único.
  - É recomendável o uso de óculos de proteção no paciente.
  - O uso de equipamentos de proteção individual não evita a propagação de patógenos.
  - Pessoas portadoras de asma não necessitam o uso de máscaras de proteção.
04. Para evitar a contaminação de mercúrio no consultório odontológico, alguns procedimentos são necessários. Frente a essa afirmação, assinale a opção INCORRETA.
- Os resíduos de amálgama e mercúrio devem ser colocados em frascos inquebráveis e tratados como resíduos radioativos.
  - Não devem ser usadas cortinas em locais onde se manipula mercúrio.
  - O amalgamador deve ser manipulado com cuidado e mantido em local isento de calor.
  - O piso do consultório deve ser liso, impermeável e de fácil limpeza.
  - O uso de luvas descartáveis é essencial para a manipulação de mercúrio.
05. O ACD é de fundamental importância para o cirurgião dentista, mas NÃO é função deste auxiliar:
- agendamento
  - esterilização
  - organização
  - higiene do consultório
  - interpretação de exames
06. Assinale a alternativa que apresenta o alimento com maior potencial para desenvolver a doença cárie.
- Suco natural de frutas.
  - Bolacha salgada.
  - Carne bovina.
  - Barra de chocolate.
  - Verduras.
07. Sabe-se que é de fundamental importância para o sucesso de um procedimento odontológico a escolha do instrumental adequado. Tendo em vista a exodontia do elemento 38 (terceiro molar inferior esquerdo permanente) em um paciente, assinale a alternativa que NÃO contém um instrumental indicado neste procedimento.
- Fórceps.
  - Seringa carpule.
  - Colher de dentina.
  - Sindesmótomo.
  - Porta agulha.
08. Sobre a dentição humana, assinale a alternativa INCORRETA.
- A fonação é auxiliada pelos dentes, tornando a articulação das palavras mais fácil.
  - Os caninos são dentes com pontas agudas que servem para cortar os alimentos.
  - Os dentes decíduos, também conhecidos como “dente de leite”, possuem essa denominação devido à sua cor leitosa.
  - Normalmente, os primeiros dentes temporários a erupcionarem são os incisivos centrais inferiores.
  - A dentição temporária é composta por dentes incisivos, caninos, pré-molares e molares.

09. São consideradas medidas de biossegurança em Odontologia todas as alternativas abaixo, EXCETO:
- O uso de óculos de proteção, tanto para o cirurgião dentista e sua equipe, quanto para o paciente.
  - A utilização de luvas de borracha grossas para lavagem do instrumental.
  - Após procedimentos radiográficos, descartar o envoltório da película em lixeira apropriada para este fim.
  - Descartar agulhas e instrumentais descartáveis pérfuro-cortantes no lixo comum.
  - A roupa utilizada na clínica deve ser lavada separadamente das demais.
10. A comunicação entre o Cirurgião Dentista e a(o) Auxiliar de Cirurgião Dentista é facilitada por números, os quais designam, entre outras coisas, se o dente está no quadrante inferior ou superior e o lado (direito e esquerdo).  
Tendo em vista esta afirmação, como podemos designar um quadrante cuja fórmula seja  $\frac{1}{4} \frac{2}{3}$ .
- 4 – Lado inferior esquerdo.
  - 2 – Lado superior direito.
  - 3 – Lado inferior esquerdo.
  - 1 – Lado superior esquerdo.
  - 1 – Lado inferior direito.
11. Assinale a sequência correta para se adquirir a imagem da película de Raio X, dentro de uma Câmara Escura.
- Fixador – Revelador – Água.
  - Fixador – Água – Revelador.
  - Água – Revelador – Fixador.
  - Água – Fixador – Revelador.
  - Revelador – Água – Fixador.
12. O Cirurgião Dentista, ao fazer um Exame Clínico, necessita de três instrumentos básicos. Quais são eles?
- Sonda Exploradora, Espelho Plano e Pinça.
  - Sonda Exploradora, Fórceps e Pinça.
  - Espelho Plano, Pinça e Micromotor.
  - Pinça, Espelho Plano e Motor de Alta Rotação.
  - Sonda Exploradora, Espelho Plano e Amalgamador.
13. Quanto à prevenção de contaminação dentro do Consultório Odontológico, assinale a alternativa INCORRETA.
- Ao cair um instrumento cirúrgico ao chão devemos ignorá-lo e substituí-lo por outro.
  - Não é necessária a lavagem antecipada de mãos e antebraços quando se usa luvas descartáveis.
  - Descartar máscaras, luvas, gazes e restos de fios de sutura em local adequado para lixo contaminado.
  - Orientar o paciente a bochechar solução antisséptica, principalmente antes das cirurgias.
  - Utilização de óculos de proteção em procedimentos.
14. Um paciente, antes de ser atendido pelo cirurgião dentista, informa ao ACD, em sigilo, que é portador do vírus HIV. Quando esse paciente entrar no consultório para a consulta, o auxiliar deverá:
- informar ao cirurgião-dentista, antes da entrada do paciente, que se trata de um portador do vírus HIV e sugerir que não devem atendê-lo;
  - recusar-se a participar no atendimento;
  - reforçar as condições de biossegurança e fazer um atendimento normal;
  - transmitir a outros profissionais da equipe as condições do paciente, para que o mesmo seja dispensado;
  - encaminhar o paciente para outro profissional, antes que ele seja atendido pelo cirurgião-dentista da clínica.
15. Assinale a alternativa INCORRETA, quanto ao armazenamento do material esterilizado.
- O instrumental deve ser armazenado em local exclusivo, separado dos demais, em armário fechado.
  - Os pacotes esterilizados devem ser manipulados o mínimo possível e com cuidado, respeitando o prazo de validade da esterilização.
  - O armário deve estar a uma distância mínima de 20 cm do chão, 50cm do teto e 5cm da parede.
  - Não há necessidade de reprocessar os instrumentais com pacotes danificados.
  - O local de armazenamento deve ser limpo e organizado periodicamente.

16. Durante qualquer procedimento odontológico, o ACD deve estar portando:
- roupas adequadas, jaleco manga longa, touca, máscara e sapato fechado;
  - roupas frescas, jaleco manga curta, touca, máscara e sapato fechado;
  - roupas adequadas, jaleco sem manga, touca, máscara e sapato fechado;
  - roupas adequadas, jaleco manga longa, touca, máscara e sapato fechado, luvas grossas de borracha;
  - roupas adequadas, touca, máscara, fitas amarelas e sapato fechado.
17. Considere os equipamentos de proteção individual que o atendente de consultório dentário deve utilizar no atendimento ao paciente.
- Gorro
  - Óculos de proteção
  - Sapatilhas
  - Avental
  - Luva grossa de borracha
- São verdadeiros apenas os itens:
- I e II.
  - I e III.
  - II e IV.
  - I, II e III.
  - I, II, III e IV
18. O tipo de isolamento em que se utilizam roletes de algodão ou gaze, introduzidos na boca do paciente com a ajuda de uma pinça clínica e sugador, é:
- absoluto;
  - relativo;
  - complementar;
  - adjacente;
  - conjugado.
19. A dentição decídua e a permanente apresentam, respectivamente:
- 20 e 32 dentes;
  - 18 e 30 dentes;
  - 20 e 36 dentes;
  - 12 e 32 dentes;
  - 22 e 32 dentes.
20. Relacione corretamente as duas colunas.
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| I. Fórceps                 | 1. Servem para medir a profundidade das bolsas periodontais.      |
| II. Espátulas de inserção  | 2. Levam material à cavidade preparada.                           |
| III. Sondas milimetradas   | 3. Servem também para remover cárie.                              |
| IV. Brocas                 | 4. Fixam o isolamento com dique de borracha no elemento dentário. |
| V. Grampos para isolamento | 5. Utilizados para exodontia.                                     |
- Escolha a alternativa que apresenta a correlação correta.
- I-5, II-3, III-1, IV-2, V-4.
  - I-2, II-1, III-3, IV-4, V-5.
  - I-5, II-2, III-1, IV-3, V-4.
  - I-3, II-4, III-1, IV-5, V-2.
  - I-3, II-5, III-2, IV-4, V-1
21. Em relação ao Equipamento de Proteção Individual (EPI), assinale a alternativa CORRETA.
- Os óculos devem ser confortáveis, com boa vedação lateral, totalmente transparentes, mas não podem permitir a lavagem com água e sabão.
  - Calçados devem ser fechados com solado antiderrapante.
  - Luvas de procedimentos cirúrgicos e luvas grossas de borracha podem ser usadas indiferentemente para qualquer procedimento e previnem a infecção cruzada.
  - O avental deve ser de mangas curtas, de tecido claro e confortável.
  - A mesma máscara pode ser usada durante uma semana.

22. Assinale a alternativa que apresenta, CORRETA E RESPECTIVAMENTE, a numeração dos seguintes dentes: segundo molar superior esquerdo, primeiro molar superior direito, primeiro molar inferior direito decíduo, incisivo central inferior direito e incisivo central inferior esquerdo decíduo.
- 27, 16, 84, 41 e 71.
  - 26, 17, 45, 31 e 41.
  - 27, 16, 45, 31 e 32.
  - 17, 26, 85, 41 e 71.
  - 16, 18, 48, 31 e 41.
23. Em relação à lavagem das mãos, é correto afirmar que:
- a acetona e o éter são recomendados como antissépticos;
  - é a ação menos importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares;
  - o uso de luvas dispensa a lavagem das mãos;
  - deve ser realizada somente no início e no final de cada turno de trabalho;
  - é a fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos e punhos, utilizando-se sabão e água corrente abundante.
24. São funções da ACD, EXCETO:
- Organizar o agendamento dos pacientes.
  - Esterilizar o instrumental a ser utilizado.
  - Desinfectar o campo operatório.
  - Diagnosticar lesões peribucais.
  - Agendar o retorno dos pacientes e entrega de receituário.
25. Durante o dia a dia da clínica odontológica, vários são os procedimentos realizados. Para que haja uma organização e uma sequência lógica de atendimento, o ACD deve atentar-se para:
- indicar ao CD a melhor técnica anestésica;
  - aplicar métodos de esterilização e desinfecção corretos;
  - realizar a prescrição de medicamentos, aliviando assim a atividade do dentista;
  - colaborar com o dentista no diagnóstico;
  - administrar medicação endovenosa e intra-muscular.
26. Qual alternativa completa, respectivamente, os espaços com a forma verbal adequada?
- \_\_\_\_\_ casas e apartamentos.
  - \_\_\_\_\_ de secretárias bilíngues.
  - \_\_\_\_\_ a janela da sua sala.
- Alugam-se – Precisa-se – Abra
  - Alugam-se – Precisam-se – Abra
  - Aluga-se – Precisa-se – Abra
  - Alugam-se – Precisa-se – Abre
  - Aluga-se – Precisa-se – Abre
27. Assinale a alternativa que completa CORRETA E RESPECTIVAMENTE as lacunas do seguinte texto.
- “Caravaggio, o pintor que fez do embate entre luz e sombras uma \_\_\_\_\_, ganha sua maior mostra no Brasil. Foi um \_\_\_\_\_ imenso para trazer um \_\_\_\_\_pequeno, \_\_\_\_\_ de valor \_\_\_\_\_.
- obsessão – esforço – asservo – mas – extraordinário
  - obseção – esforço – acervo – mas – extraordinário
  - obscessão – esforço – acervo – mais – extraordinário
  - obseção – esforço – asservo – mais – extraordinário
  - obsessão – esforço – acervo – mas – extraordinário
28. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do sinal indicativo da crase.
- O filho da Regina foi o primeiro à chegar.
  - Dei o recado àquele homem que está saindo.
  - Os dois lutadores estavam, enfim, frente à frente.
  - Atende-se de segunda-feira à sábado.
  - Um à um os candidatos foram se aproximando.

29. Qual alternativa completa, respectivamente, os espaços com a forma verbal adequada?

- I. As secretárias não haviam \_\_\_\_\_ o documento.
- II. O pedido foi \_\_\_\_\_ logo em seguida.
- III. As reuniões tinham sido \_\_\_\_\_ pelo presidente.
- IV. Os funcionários tinham \_\_\_\_\_ atrasados.
- V. A louça já estava \_\_\_\_\_.

- a) impresso – aceito – suspensas – chego – enxuta
- b) imprimido – aceito – suspendidas – chego – enxugada
- c) imprimido – aceito – suspensas – chegado – enxuta
- d) impresso – aceito – suspendidas – chego – enxugada
- e) imprimido – aceitado – suspendidas – chegado – enxugada

30. Quanto à concordância, que frases estão corretas?

- I. É necessário muita disposição.
- II. É necessário disposição.
- III. É necessária muita disposição.
- IV. É necessária disposição.

- a) Todas.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e IV.
- d) Apenas II e III.
- e) Apenas III e IV.