



MÉDICO III - PEDIATRA

PORTUGUÊS

01. Assinale a única opção cujas palavras completam corretamente as lacunas da sentença:

“O amor às vezes quer um \_\_\_\_\_, pois o coração sofre toda vez que o sentimento ameaça \_\_\_\_\_ . É que os amantes, com suas \_\_\_\_\_, navegam mares revoltos pelas \_\_\_\_\_ emocionais, mares difíceis de \_\_\_\_\_.”

- (A) remanço, recrudecer, suscetibilidades, proscelas, singlar;
- (B) remansço, recrudescer, sussetibilidades, prosselas, cingrar;
- (C) remanso, recrudecer, sucetibilidades, procelas, singlar;
- (D) remanso, recrudescer, suscetibilidades, procelas, cingrar;
- (E) remanso, recrudescer, suscetibilidade, procelas, singlar.

02. Analise as assertivas e depois responda à questão proposta.

- I. De acordo com a recente reforma ortográfica, a palavra “heroi” perdeu o acento agudo que ostentava.
- II. A palavra “Luís” recebe acento agudo, pois se trata de uma oxítone terminada em “is”.
- III. “Até” é palavra que recebe acento por ser uma monossílabo tônica terminada em “e”.

- (A) apenas I está correta;
- (B) apenas II está correta;
- (C) apenas III está correta;
- (D) todas as estão corretas;
- (E) todas as estão incorretas.

03. Em face do uso dos porquês, assinale a única opção cujo período ostente emprego correto:

- (A) “Por quê Deus permite que as mães vão-se embora?” (Carlos Drummond de Andrade);
- (B) Noel Rosa explicou o porquê: “Roupa preta é vaidade/ para quem se veste a rigor/ o meu luto é a saudade/ e a saudade não tem cor”;
- (C) “Estou-me a vir/e tu como é que te tens por dentro?/Porquê não te vens também?” (Caetano Veloso);
- (D) “Não sei porque você se foi, tantas saudades eu senti.” (Tim Maia);
- (E) “Eu sem você/Não tenho por quê/Sem você, não sei nem chorar.” (Vinicius de Moraes).

04. Todas as palavras são formadas por aglutinação na opção:

- (A) aguardente, girassol, foto;
- (B) desleal, planície, cobalto;
- (C) água-viva, amoníaco, alface;
- (D) embora, Fonseca, planalto;
- (E) cooptar, micro-ondas, contralto.

05. Considerando as hipóteses de incidência do acento grave (denotativo da crase), analise as assertivas e depois responda à questão proposta.

- I. Voltei à Curitiba dos pinheiros, do leite quente e da polquinha de Dalton!
  - II. Daí à César o que é de César e a Deus o que é de Deus!
  - III. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto à ti.
- (A) apenas I está correta;
  - (B) apenas II está correta;
  - (C) apenas III está correta;
  - (D) todas as assertivas estão corretas;
  - (E) todas as assertivas estão incorretas.

06. “Depois do café, Paulinho pegava o papel do embrulho, alisava, cortava as partes amassadas e esticava o barbante, sempre sob o olhar curioso do irmão Francisco. Paulinho fazia pipas e vendia pela vizinhança, ganhando o dinheirinho que, segundo ele, seria usado para comprar uma camisa do Atlético Paranaense”.

Sintaticamente, os trechos sublinhados devem ser classificados, respectivamente, como:

- (A) Adjunto adverbial de tempo, oração coordenada sindética aditiva, objeto direto, complemento nominal;
- (B) Adjunto adnominal, oração subordinada substantiva aditiva, objeto direto, complemento nominal;
- (C) Aposto explicativo, oração coordenada assindética, objeto direto, predicativo do objeto;
- (D) Aposto explicativo, oração subordinada adverbial de modo, objeto indireto, predicativo do objeto;
- (E) Adjunto adverbial de causa, oração coordenada sindética causal, objeto direto, agente da passiva.

07. “Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu.”

(Darcy Ribeiro)

Quanto ao trecho **NÃO** se pode afirmar que:

- (A) a oração “alfabetizar as crianças brasileiras” deve ser classificada como subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo;

- (B) apresenta sujeito indeterminado evidenciado pelo uso da partícula “se”, apassivadora do sujeito;
- (C) em “Mas os fracassos são minhas vitórias”, tem-se conjunção adversativa;
- (D) “Tentei fazer uma universidade séria” - no período, o verbo “tentar” é transitivo direto;
- (E) “... os fracassos são minhas vitórias” - no período, o verbo “ser” é de ligação.

08. Assinale a única opção que apresenta uso de vocativo.

- (A) O São Francisco lá pras bandas da Bahia diz que - dia, menos dia - o sertão vai se acabar.
- (B) Tudo que a gente precisa é isto: fé em Deus e pé na tábua!
- (C) Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria.
- (D) Ó minha amada, que olhos os teus!
- (E) A Constituição cidadã - promulgada naquela manhã de cinco de outubro - previa novos direitos e, mais do que isso, restaurava a esperança!

09. Considerando as normas afetas à Regência Verbal, analise as assertivas e responda à questão proposta.

- I. Eu nunca namoraria com uma médica!
- II. Receosa, Nayara gostou do vinho e depois declarou: “ele é ácido demais!”
- III. Assisti o filme sentado numa poltrona desconfortável!

- (A) apenas I está correta;
- (B) apenas II está correta;
- (C) apenas III está correta;
- (D) todas estão corretas;
- (E) todas estão incorretas.

10. Dadas as ocorrências, assinale aquela que estiver em desacordo com as normas gramaticais atinentes à Regência Nominal:

- (A) Raul é incapaz de fazer um gesto grosseiro.
- (B) Os estudantes fizeram apologia da maconha e foram corretamente admoestados.
- (C) Teu comportamento é passível de multa.
- (D) Celso é versado em Química.
- (E) O aluno dedicado conseguiu um triunfo sobre a insípida cartilha.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. “Lactente de 4 meses é trazida por seu pai ao pronto-atendimento com história de ter caído do berço. Ao exame, a criança apresentava hematoma em tronco e fratura em metáfise proximal da tibia direita. Foram realizados os cuidados clínicos.”

A conduta seguinte deve incluir:

- (A) observação;
- (B) notificação ao conselho tutelar sobre a suspeita de maus-tratos;
- (C) alertar a mãe sobre maiores cuidados com relação a acidentes;
- (D) chamar ao hospital o médico legista para exame de corpo delito;
- (E) chamar a polícia.

12. “Pré-escolar de 5 anos, portador de linfoma, está internado para realização de quimioterapia de indução. Na mesma enfermaria está internada outra criança com diagnóstico de varicela.”

Qual a sua conduta em relação à primeira criança?

- (A) Observação e evitar contato com a 2ª criança.
- (B) Vacinação contra varicela de forma urgente.
- (C) Interrupção da quimioterapia e iniciar administração de Aciclovir ev.
- (D) Completar a quimioterapia e alta com 14 dias Aciclovir via oral em altas doses.
- (E) Administrar imunoglobulina específica.

13. “Paciente feminina, 4 anos, apresenta quadro de oligoartrite afetando joelhos, tornozelo e cotovelo direito de início há 1 ano e meio. Não apresenta lombalgia ou outros sintomas extra-articulares. Exames laboratoriais mostraram elevação das provas de atividade inflamatória e FAN 1/160 pontilhado fino denso. Iniciado tratamento com anti-inflamatórios e metotrexate.”

A próxima preocupação do pediatra é a seguinte:

- (A) realizar infiltração com corticoesteróide nos joelhos;
- (B) avaliação dos irmãos para casos semelhantes;
- (C) dosagem em 1 semana das enzimas hepáticas;
- (D) encaminhamento ao oftalmologista;
- (E) iniciar proteção gástrica com bloqueadores de bomba de prótons.

14. “Recém-nato a termo, 45 segundos após adequada assistência na sala de parto por 2 pediatras, evolui com taquicardia (FC: 120) e cianose central e periférica, porém eupnéico.”

Qual a sua conduta?

- (A) Intubação orotraqueal.
- (B) Observação por mais 30 segundos.
- (C) Oxigênio inalatório.
- (D) Ventilação com balão e máscara.
- (E) Administração de beta-bloqueador.

15. Ainda sobre o caso clínico da questão anterior, se o recém-nato, após 30 segundos do tratamento correto, persistir com cianose generalizada, a conduta mais adequada seria:

- (A) ventilação com balão e máscara;
- (B) oxigenoterapia;
- (C) intubação orotraqueal;
- (D) administração de corticoesteróides;
- (E) observação.

16. “2 dias após a aplicação da vacina tríplice bacteriana, uma criança de 5 anos apresentou alterações do comportamento (que duraram 5 dias) e 2 crises convulsivas.”

Na aplicação da próxima dose da vacina, a melhor conduta é a seguinte:

- (A) aplicação da tríplice bacteriana celular;
- (B) aplicação da dupla infantil;
- (C) aplicação da tríplice bacteriana acelular;
- (D) aplicação da dupla do adulto;
- (E) não aplicar nenhuma forma dessa vacina.

17. “Adolescente de 11 anos do sexo feminino é trazida pelos pais ao seu pediatra de longa data por perda de peso de forma acentuada. Ao conversar com a adolescente, o pediatra observa que há uma intensa preocupação com o peso, além de abuso de diuréticos e de laxantes. Ao exame físico, IMC de 11, dados vitais sem alterações e exame segmentar normal.”

Qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Bulimia nervosa.
- (B) Depressão maior.
- (C) Normalidade.
- (D) Anorexia nervosa.
- (E) Hipocondríase.

18. Com relação à doença de Kawasaki, assinale (V) se verdadeiro ou (F) se falso:

- ( ) Acomete principalmente crianças acima dos 5 anos.
- ( ) Trombocitose é achado frequente.
- ( ) O tratamento é realizado com AAS associado à imunoglobulina.
- ( ) A principal complicação é a formação dos aneurismas de aorta.
- ( ) Todos os pacientes, após a fase de convalescência da doença, devem fazer uso de AAS para o resto da vida.

Assinale a sequência correta:

- (A) F, V, V, F, F;
- (B) F, V, V, F, V;
- (C) V, F, V, F, V;
- (D) V, V, V, V, V;
- (E) V, V, F, V, F.

19. “Criança de 10 anos sofreu queda de bicicleta em moderada velocidade. Foi atendido por seu vizinho e já naquele momento se queixava de dor em ombro esquerdo. Evoluiu com sinais de choque e foi transferido com urgência para o hospital mais próximo.”

Qual o diagnóstico mais provável e tratamento?

- (A) Laceração hepática / reposição volêmica.
- (B) Contusão de ombro com síncope devido à dor / analgesia e observação.
- (C) Fratura de costela com lesão pulmonar / toracotomia de urgência.

(D) Fratura de ombro / reposição volêmica e tipoia canadense.

(E) Rotura de baço / cirurgia.

20. “Criança de 8 anos, com diagnóstico de SIDA, atualmente em tratamento com esquema antirretroviral, apresentou ao seu pediatra seu último exame com contagem de CD4 (180 células/mm<sup>3</sup>).”

Qual a profilaxia indicada?

- (A) Tuberculose.
- (B) Criptococose.
- (C) Pneumocistose.
- (D) Complexo MAC.
- (E) CMV.

21. “Criança de 8 anos, que atualmente mora em zona rural, comparece à consulta por ferida no dedão do pé esquerdo. Ao exame, pápula única com ponto purulento escuro central.”

Qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Esporotricose.
- (B) Tungíase.
- (C) Larva migrans cutânea.
- (D) Abscesso cutâneo por estafilococos.
- (E) Estrongiloidíase em fase cutânea.

22. Sobre diarreia na infância é correto afirmar que:

- I. A etiologia da diarreia aguda deve ser rotineiramente pesquisada por meio de exames complementares.
- II. A principal etiologia viral é o rotavírus e sua vacina deve ser indicada principalmente aos imunossuprimidos.
- III. A intolerância à proteína do leite de vaca não costuma persistir na idade adulta.
- IV. Em pediatria, as alterações nutricionais são muito frequentes nos pacientes com doença inflamatória intestinal.

Assinale a alternativa correta:

- (A) todas estão corretas;
- (B) apenas I, III e IV estão corretas;
- (C) apenas I está incorreta;
- (D) apenas II e III estão corretas;
- (E) apenas III e IV estão corretas.

23. São causas clássicas de anemia com volume corpuscular médio (VCM) aumentado, **EXCETO**:

- (A) deficiência de folato;
- (B) anemia sideroblástica;
- (C) deficiência de vitamina B12;
- (D) anemia hemolítica autoimune;
- (E) doença hepática.

24. Qual a causa mais de obstrução intestinal entre 3 meses e 6 anos de idade e qual o tratamento inicial?
- (A) Ascariíase / albendazol.
  - (B) Intussuscepção / cirúrgico.
  - (C) Intussuscepção / redução hidrostática com enema baritado.
  - (D) Síndrome de Ogilve / colonoscopia.
  - (E) Distúrbio hidroeletrólítico / correção endovenosa do distúrbio.

25. “Criança de 4 anos apresenta lesões eritematosas e escamosas, às vezes com formação de vesículas, pruriginosas, com localização mais frequente em regiões poplíteas e antecubitais. O caráter das lesões é recidivante. Há nítida piora com o calor.” Qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Eritema multiforme recidivante.
- (B) Dermatite de contato.
- (C) Escabiose.
- (D) Dermatite atópica.
- (E) Dermatite herpetiforme.

26. “Criança de 5 anos é trazida pela mãe à consulta com quadro de tosse produtiva com piora marcante no período noturno e obstrução nasal, de início há 2 semanas. No início do quadro consultou e o diagnóstico do pediatra em plantão naquele momento foi de IVAS.”

O diagnóstico atual mais provável e o agente etiológico mais comum são respectivamente os seguintes:

- (A) sinusite aguda / pneumococo;
- (B) rinite alérgica persistente / alérgenos ambientais;
- (C) pneumonia atípica / pneumococo;
- (D) epiglotite / hemófilo;
- (E) coqueluche / B. pertussis.

27. Segundo as cardiopatias congênitas, assinale (V) se verdadeiro ou (F) se falso:

- ( ) A comunicação interventricular (CIV) é a cardiopatia congênita mais comum.
- ( ) A comunicação interatrial mais frequente é do tipo septum secundum.
- ( ) Exemplos de cardiopatia congênita cianótica são a coarctação de aorta e a tetralogia de Fallot.
- ( ) A presença de sopro em dorso deve levantar a suspeita do diagnóstico de coarctação de aorta.
- ( ) O tratamento padrão do ducto arterioso patente, exceto em prematuros, é o fechamento por cateter.

Assinale a sequência correta:

- (A) V, F, V, V, F;
- (B) V, V, F, V, V;
- (C) V, V, F, V, F;
- (D) V, V, F, F, V;
- (E) F, V, F, V, V.

28. “Criança de 6 anos, portadora de artrite idiopática juvenil (AIJ) forma sistêmica, inicia quadro de sangramento gengival e cutâneo espontâneos, alteração do comportamento, febre refratária e linfadenopatia generalizada. Exames laboratoriais mostram leucopenia, trombocitopenia e fibronogênio reduzido, além de VHS baixo.”

Qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Atividade da AIJ.
- (B) Leucemia mieloide aguda.
- (C) Mononucleose infecciosa.
- (D) Síndrome de ativação macrofágica.
- (E) Sarcoidose.

29. Com relação às convulsões febris, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) São mais frequente entre 6 meses e 6 anos de idade.
- (B) A maioria dos episódios ocorre no primeiro dia de doença.
- (C) Se for o primeiro episódio da criança, mesmo que característica, deve ser realizada uma punção lombar.
- (D) Quando o episódio for persistente, o tratamento com benzodiazepínicos está indicado.
- (E) A taxa de recorrência é relativamente elevada.

30. Qual a neoplasia não-hematológica mais frequente em crianças?

- (A) Tumor de Wilms.
- (B) Neuroblastoma.
- (C) Tumores primários do sistema nervoso central.
- (D) Tumores de células germinativas.
- (E) Tumores de tireoide.

31. “O pacto pela saúde, instituído pela portaria número 399/06, é dividido em componentes: pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto de gestão do SUS.”

Dentre os objetivos do pacto pela vida podemos citar os seguintes, **EXCETO**:

- (A) saúde do idoso: inclui promover o envelhecimento ativo e saudável;
- (B) controle do câncer de colo de útero e de mama: inclui realizar a punção de lesões mamárias em 100% dos casos necessários;
- (C) redução da mortalidade materna e infantil: inclui reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica e 1% por pneumonia;
- (D) fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias: inclui atingir pelo menos 85% de cura nos casos novos de tuberculose bacilífera;
- (E) promoção de saúde: inclui promover medidas concretas pelo hábito de alimentação saudável.

32. “Ainda sobre o pacto pela vida, um dos seus pilares é o fortalecimento da atenção básica.”

Isso poderá ser alcançado pela seguinte medida:

- (A) assumir a estratégia de saúde da família como estratégia prioritária para o fortalecimento da atenção básica;
- (B) estimular que os médicos já contratados nas unidades de saúde básica façam programa de residência médica em medicina da família;
- (C) garantir o financiamento da atenção básica por meio da esfera municipal e das associações de bairro;
- (D) inserir na atenção básica médicos de todas as especialidades com o intuito de reduzir a participação da atenção secundária e terciária;
- (E) desvio do foco preventivo para um foco resolutivo dos problemas médicos.

33. Com relação ao SUS, assinale (V) se verdadeiro ou (F) se falso:

- ( ) São princípios doutrinários: universalidade e integralidade.
- ( ) São princípios organizativos: equidade, regionalização e hierarquização.
- ( ) Não está entre os princípios organizativos a complementariedade do setor privado.
- ( ) O SUS será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, além de outras fontes.
- ( ) Os agentes comunitários de saúde estão atualmente em processo de extinção.

Assinale a sequência correta:

- (A) V, V, V, F, V;
- (B) V, F, F, V, F;
- (C) F, V, V, V, F;
- (D) V, V, F, V, F;
- (E) F, V, F, V, F.

34. Qual lei é conhecida como a Lei do Controle Social?

- (A) 8080/90.
- (B) 8112/90.
- (C) 8666/93.
- (D) 8142/90.
- (E) 8429/92.

35. Segundo a Lei Nº 8080/90, as seguintes entidades privadas terão preferência para participar no SUS:

- (A) hospitais que tenham programa de residência médica;
- (B) as clínicas de especialidades que ofereçam o menor preço mensal por um pacote de consultas;
- (C) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos;
- (D) hospitais que façam doações anuais maiores que R\$ 100.000,00 a entidades carentes;
- (E) não há preferência determinada em lei.

36. A Lei Nº 8080/90 dispõe sobre:

- I. As condições de promoção, proteção e recuperação de saúde.
- II. A organização e funcionamento dos serviços correspondentes.
- III. As transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
- IV. A estruturação da estratégia de saúde da família.

Assinale a alternativa correta:

- (A) todas estão corretas;
- (B) apenas II e III estão corretas;
- (C) apenas IV está incorreta;
- (D) apenas III está correta;
- (E) apenas I e II estão corretas.

37. O princípio do SUS que define que os recursos devem ser distribuídos de maneira desigual, assegurando maiores recursos para a parcela da população que necessita de maiores cuidados é o seguinte:

- (A) Hierarquização;
- (B) Integralidade;
- (C) Universalidade;
- (D) Equidade;
- (E) Participação da comunidade.

38. “O índice de Swaroop & Uemura é considerado um bom indicador das condições de vida de uma população. Em países desenvolvidos chega a 80/90%, enquanto em regiões subdesenvolvidas atinge 50% ou menos. Dentre suas vantagens podemos citar o cálculo simples, os dados disponíveis na maioria dos países e permite a comparabilidade nacional e internacional.”

Ele indica o seguinte:

- (A) a proporção de óbitos em pessoas com 50 anos ou mais no conjunto de todos os óbitos;
- (B) a mortalidade por causas relacionadas ao trauma;
- (C) a taxa da população que tem cobertura verdadeira por serviços médicos, seja público ou particular;
- (D) o número de óbitos em cada grupo etário dividido pelo número total de óbitos;
- (E) a divisão entre mortalidade infantil e materna.

39. São 3 (três) os níveis de atenção à saúde no modelo do SUS. Sobre o nível secundário, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) compreende a média complexidade;
- (B) resolve ao redor de 15% dos problemas de saúde;
- (C) inclui os centros de especialidades, mas não os hospitais;
- (D) inclui clínicas de realização de raio X, ultrassonografia e exames laboratoriais;
- (E) ter participação do sistema privado de saúde.

40. Sobre o calendário básico de imunizações do Ministério da Saúde, assinale (V) se verdadeiro (V) ou (F) se falso:

- ( ) A BCG previne contra todas as formas de tuberculose.
- ( ) Vacina contra rotavírus pode ser aplicada em imunossuprimidos.
- ( ) A vacina oral contra poliomielite (Sabin) está contraindicada em imunossuprimidos.
- ( ) A vacina contra o meningococos C (conjugada) protege apenas contra as formas invasivas de doença causada por essa bactéria.
- ( ) A vacina contra a febre amarela é feita em 3 doses, com intervalos semelhantes à da vacina contra hepatite B.

Assinale a sequência correta:

- (A) F, F, V, V, F;
- (B) V, F, V, F, F;
- (C) F, F, F, V, F;
- (D) V, F, V, V, F;
- (E) V, V, V, V, V.