



P.M. Itaquaquetuba
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA 12H

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Língua Portuguesa

Texto para as questões 01 a 05

Google avisa quando você é espiado pelo governo

Além de dar algumas dicas de segurança para proteger o seu Gmail, o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus dados. Isso mesmo, uma mensagem personalizada avisa que o governo pode estar de olho em seu email.

Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.

De acordo com o Google, o aviso não quer dizer que sua conta já foi hackeada, mas sim que você é alvo de um *malware* ou de um *phising attack* (quando tentam buscar dados como senhas ou logins através de emails).

(<http://revistagalileu.globo.com>)

01. Sobre a linguagem utilizada no texto, podemos dizer que:
- a) Foi escrita na norma culta, sem traços de coloquialidade, uma vez que foi publicada numa revista científica.
 - b) Apesar de ser publicação em revista de assuntos científicos, apresenta linguagem coloquial, pois seu público alvo são os jovens.
 - c) A linguagem é predominantemente técnica, pois se trata de uma revista científica.
 - d) Apresenta erros grosseiros como “dicas” e “estar de olho”, que são gírias e não poderiam ser usadas numa revista.

02. Embora seja uma revista brasileira, portanto escrita em língua portuguesa, notam-se várias palavras de origem inglesa. Isso se deve ao fato de:
- a) O autor querer mostrar que domina mais de uma língua.
 - b) Colocar palavras em inglês dá mais credibilidade à informação.
 - c) Tratar-se de palavras comuns ao contexto da informática, por isso foram utilizadas.
 - d) O autor não conhece as traduções das palavras estrangeiras, por isso as manteve.

03. Em “hackeada”, ocorreu um processo de derivação:
- a) Sufixal.
 - b) Prefixal.
 - c) Parassintética.
 - d) Imprópria.

04. “o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus dados”, haveria mudança da relação de sentido em:
- a) O Google agora avisa sempre que o Estado tenta acessar seus dados.
 - b) O Google agora avisa enquanto o Estado tenta acessar seus dados.
 - c) O Google agora avisa logo que o Estado tenta acessar seus dados.
 - d) O Google agora avisa mesmo que o Estado tente acessar seus dados.

05. No período “Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.”, temos:
- a) Duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e uma coordenada sindética adversativa.
 - b) Uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma coordenada adversativa.
 - c) Três orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
 - d) Apenas uma oração coordenada adversativa.

Texto para as questões 06 a 10

Maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória! Sem ela mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me falta por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo parceladamente, pois responder a um assunto em que haja muitas

coisas importantes ultrapassa a minha capacidade. (Michel Montaigne)

06. Segundo o texto:
- a) Tem-se mal desempenho de memória se o raciocínio não for bom.
 - b) Memória e raciocínio estão diretamente ligados.
 - c) Não é necessário ter boa memória para ter bom raciocínio.
 - d) O autor tem boa memória, embora seu raciocínio não seja tão claro.

07. As palavras “maravilhoso” e “utilíssimo” apresentam:
- a) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de advérbio.
 - b) Sufixos formadores de substantivo comum e adjetivo comparativo.
 - c) Sufixo formador de advérbio de modo e grau superlativo.
 - d) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de superlativo.

08. De acordo com o contexto, em “O que me desejam perguntar devem fazê-lo parceladamente” ocorre:
- a) Sujeito determinado simples.
 - b) Sujeito determinado desinencial.
 - c) Sujeito indeterminado.
 - d) Oração sem sujeito.

09. No trecho: “responder a um assunto em que haja muitas coisas importantes ultrapassa a minha capacidade”, se retirássemos as preposições A e EM, haveria um desvio de:
- a) Concordância verbal.
 - b) Concordância nominal.
 - c) Regência verbal.
 - d) Regência nominal.

10. O sujeito do verbo ULTRAPASSAR em “ultrapassa a minha capacidade” é:
- a) Responder a um assunto.
 - b) Assunto.
 - c) Muitas coisas.
 - d) Coisas importantes.

11. No quadrinho abaixo ocorre um desvio da norma culta correspondente a:



(<http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm>)

- a) Colocação pronominal.
- b) Concordância verbal.
- c) Regência verbal.
- d) Acentuação gráfica.

12. Analise as afirmativas abaixo sobre o quadrinho seguinte:



(<http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm>)

I – A babá usa os pronomes “seu” e “te” de acordo com a norma culta da língua.

II – A palavra “criança” indica uma criança grande.

III – “Crianção” refere-se a um adulto que tem atitudes de criança.

Estão corretas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) Todas as afirmativas.

13. UNIVERSO CINEMATOGRAFICO

Ele, um astro. Ela, uma estrela. Filmavam uma cena romântica, quando rolou um beijo. Entraram em órbita.

O profissionalismo foi para o espaço.

(<http://omuroeoutraspgs.blogspot.com.br/>)

O texto acima se caracteriza como uma:

- a) Micronarrativa.
- b) Descrição subjetiva.
- c) Argumentação.
- d) Injunção.

14. Leia com atenção:

O AGOURENTO

- Há dias sinto uma dor aqui, no joelho. Parece inchado, não?
- Um pouco. O do meu tio também começou assim.
- Seu tio?
- É. Aquele que toca gaita na Rodoviária.
- O pernetá?
- Antes não era.

Só não se pode inferir do texto que:

- a) Os interlocutores têm certo grau de conhecimento entre si, pois um deles refere-se ao tio pernetá do outro.
- b) O sujeito que fala do tio deduz que o amigo ficará pernetá também, pois foi por causa de um inchaço no joelho que seu tio perdeu a perna.
- c) “Antes não era” significa que o tio não tocava gaita na rodoviária.
- d) O título do texto já antecipa um sentido disfórico da narrativa.

15. A alternativa em que o texto está escrito de acordo com a norma culta é:

- a) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada à alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o bastante.
- b) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada a alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o bastante.
- c) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada a alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia a base de suco: um copo diariamente é o bastante.
- d) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada à alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o bastante.

16. Sobre a palavra “bastante” é correto o que se afirma em:

- a) Apresenta dois encontros consonantais.
- b) Um encontro consonantal e um dígrafo.
- c) Apresenta dois dígrafos.
- d) Apresenta 8 letras e 8 fonemas.

Conhecimentos Específicos

17. Criança de 2 anos com queixa de dor e edema no joelho direito, febre e astenia há 5 dias, apresenta claudicação e pseudoparalisia. Há bloqueio articular à manipulação da articulação. Os exames laboratoriais evidenciaram VHS > 40mm, PCR > 20 e leucocitose. Sobre o caso, analise as afirmativas a seguir:

I - Deve-se instalar antibioticoterapia endovenosa logo após realizada a punção articular.

II - Provavelmente trata-se de sinovite transitória.

III - Complicações prováveis são luxação patológica e destruição articular.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

18. Criança de 12 anos apresenta quadro de dor no terço distal da coxa direita há 4 semanas, febre baixa, discreta leucocitose ao hemograma, VHS pouco elevado. A imagem radiografia demonstra lesão lítica bem delimitada, na região metafisária e diafisária do fêmur direito. A abordagem inicial mais adequada ao caso, dentre as listadas abaixo é:

- a) Antibioticoterapia empírica com cobertura para *S. aureus*, via oral por 6 semanas.
- b) Debridamento cirúrgico do osso.
- c) Antibioticoterapia intravenosa por 6 a 12 semanas, incluindo cobertura para Gram negativos e *S. aureus* resistente à meticilina.
- d) Iniciar antibioticoterapia apenas se punção produzir material purulento ou hemocultura for positiva.

19. Sobre a síndrome do impacto com lesão dos músculos do manguito rotador, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O tendão do infraespinhal se insere no tubérculo maior.
- b) O tendão mais acometido é o supraespinhal, responsável pela elevação do membro.
- c) O paciente queixa-se de dor noturna, dor referida na lateral do braço e dor que piora à elevação do braço.
- d) O teste de Patte avalia o tendão do supraespinhal.

20. A tenossinovite de DeQuervain é a causa mais comum de tendente do membro superior. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Acomete o 1º compartimento extensor que contém os tendões extensor curto do polegar e abductor longo do polegar.
- b) Predomina em mulheres de meia idade, na mão dominante, muito relacionada às LER/DORT.
- c) O teste de Finkelstein, muito sensível mas pouco específico para o diagnóstico, é realizado com o polegar flexionado na palma e o examinador promove o desvio radial do punho.
- d) O tratamento cirúrgico para liberação do compartimento é indicado na falha do tratamento conservador por 6 meses ou após, pelo menos, 2 infiltrações.

21. A epicondilite lateral ou “cotovelo do tenista” caracteriza-se por dor na origem dos tendões extensores no epicôndilo lateral. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Ao exame físico, nota-se aumento da dor com a extensão do punho contra resistência.
- b) O tratamento cirúrgico deve ser realizado na maioria dos casos pelo elevado índice de falha ao tratamento clínico.
- c) O diferencial se faz com síndrome do interósseo superior, que se caracteriza por dor à extensão do 3º dedo contra resistência e aumento da dor com supinação contra resistência.
- d) O diagnóstico clínico, sendo as radiografias normais na maioria dos casos. A ultrassonografia é pouco específica e a ressonância magnética geralmente desnecessária na rotina.

22. Sobre a lesão do ligamento cruzado anterior (LCA), assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O mecanismo mais comum é uma desaceleração com o joelho em hiperextensão.

- b) Se a punção articular na fase aguda apresentar hematose, a probabilidade de lesão do LCA será maior que 70%.
- c) Na grande maioria das vezes o tratamento definitivo é clínico, com imobilização, repouso, gelo e exercícios isométricos.
- d) O exame de escolha para confirmação do diagnóstico é a ressonância magnética.

23. A respeito das lombalgias e lombociatalgias na prática clínica, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A presença de disfunção esfinteriana está relacionada a presença da síndrome da cauda equina, situação de urgência que exige tratamento cirúrgico imediato.
- b) O 1º episódio de dor em paciente com 70 anos exige a realização de ao menos exame radiográfico.
- c) Na história natural da lombalgia, 50% melhoram em 1 semana e 95% em 3 meses.
- d) A perda da flexão plantar está relacionada à lesão da raiz nervosa de L4-L5.

24. Sobre a síndrome do manguito rotador, analise as afirmativas a seguir:

I - O tratamento clínico deve ser feito quando há síndrome do impacto sem sinais de ruptura tendínea.

II - A ultrassonografia do ombro é o padrão-ouro, identificando lesões menores que 1cm.

III - O tratamento clínico é baseado em analgesia, AINE's e fisioterapia.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III
- d) I, II e III

25. Sobre a displasia de desenvolvimento do quadril, analise as afirmativas a seguir:

I - Como 60% dos quadris estabilizam sem tratamento até a 3ª semana de vida e 90% estabilizam até o 3º mês, mesmo com testes de Barlow e Ortoloni positivos, o tratamento ainda não deve ser indicado.

II - Antes dos 6 meses de idade, o diagnóstico por imagem deve ser realizado através da ultrassonografia e não da radiografia.

III - O uso do suspensório de Pavlik é indicado até os 6 meses de idade, devendo ser usado por 4 meses, podendo ser feito controle ultrassonográfico a cada 10 dias.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

26. A doença de Dupuytren predomina no sexo masculino entre a 5ª e 7ª décadas de vida, apresentando 5% de associação com a doença de Ledderhose e a de Peyronie. Sobre esta entidade, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) É uma fibrodisplasia proliferativa da fásia palmar que leva a contraturas progressivas e irreversíveis.
- b) Está relacionada ao uso de anticonvulsivantes, alcoolismo, trabalhos manuais, trauma e hereditariedade.
- c) Na maioria das vezes o tratamento é cirúrgico, porém se deve aguardar o término da fase proliferativa.
- d) A doença se caracteriza por acometer os tendões do 4º e 5º dedos, bilateralmente.

27. Menino de 5 anos com dor no quadril esquerdo, claudicação e limitação da amplitude do movimento, há 2 semanas, apresenta ao raio X simples radiopacidade da epífise femoral proximal à esquerda. O diagnóstico mais provável dentre os listados abaixo é:

- a) Epifisiólise.
- b) Artrite séptica do quadril.
- c) Sinovite transitória do quadril.
- d) Doença de Legg-Calvé-Perthes na 1ª fase.

28. A radiografia precoce nos casos de Osteomielite Aguda, na maioria das vezes, apresenta:

- a) Reação periosteal.

- b) Áreas radioluscentes com esclerose marginal.
- c) Sequestro ósseo.
- d) Sem alterações.

29. O tratamento da epifisiólise deve ser feito através de:

- a) Técnica cirúrgica de Steel.
- b) Gesso de broomstick.
- c) Fixação cirúrgica com parafusos canulados.
- d) Osteotomia de Salter.

30. Sobre as variações da angulação dos membros inferiores nas crianças, analise as afirmativas a seguir:

I - Fisiologicamente, a criança apresenta ao nascimento joelho varo de aproximadamente 10 a 15º.

II - O diagnóstico diferencial de joelho varo na faixa etária pediátrica se faz com tibia vara de Blount e raquitismo.

III - O tratamento cirúrgico do joelho valgo deve ser cogitado quando o o valgo ultrapassa 15 a 20º, por meio da hemiepifisiodesse.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

31. Sobre a síndrome compressiva do nervo mediano (síndrome do túnel do carpo), assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O exame complementar mais indicado é a ultrassonografia, mais sensível que a eletroneuromiografia por mostrar edema do nervo mediano.
- b) Ocorre compressão do nervo mediano na zona IV de Verdan, onde ele passa juntamente com 9 tendões flexores pelo mesmo túnel.
- c) Com a evolução do quadro, o paciente pode apresentar hipotrofia da musculatura tenar.
- d) O pós-operatório não necessita de imobilização e os resultados costumam ser muito bons.

32. A Síndrome de Maffucci é a associação de hemangiomas com qual dos seguintes tumores ósseos:

- a) Osteoma.
- b) Endondromas.
- c) Ewing.
- d) Condrossarcoma.

33. Sobre as manobras utilizadas para se determinar qual músculo está lesado na síndrome do manguito rotador, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O teste de Neer avalia o tendão do infraespinhal pelo exame da rotação externa contra resistência.
- b) O teste de Jobe avalia o tendão do supraespinhal, testando-se a elevação ativa do membro em rotação interna contra a resistência do examinador.
- c) O teste de Gerber avalia o tendão do subescapular através do teste da rotação interna do braço.
- d) O teste do impacto de Yocum é positivo se há dor provocada pelo impacto do tubérculo maior contra o arco acromial.

34. Fratura exposta de fêmur com dano grave às partes moles, devido à lesão de alta energia com componente de esmagamento importante, contaminação significativa, cominuição da fratura, onde é possível obter cobertura óssea, segundo a classificação de Gustilo e Anderson, é enquadrada em:

- a) II.
- b) III a.
- c) III b.
- d) III c.

35. Hipoestesia na porção radial dos dedos, teste de Phalen negativo e Tinel positivo proximal, alteração de sensibilidade próxima à região tenar e eletroneuromiografia normal, correspondem mais provavelmente ao diagnóstico de:

- a) Síndrome do túnel do carpo.
- b) Síndrome do canal de Guyon.

- c) Síndrome do pronador redondo.
- d) Síndrome de Wartenberg.

36. Quais os achados radiográficos mais comuns na osteoartrose.

- a) Rarefação óssea periarticular, redução simétrica do espaço articular e edema sinovial.
- b) Redução da densidade óssea na face articular, redução assimétrica do espaço articular e edema sinovial.
- c) Redução do espaço articular, osteófitos, geodos e esclerose marginal óssea.
- d) Redução simétrica do espaço articular, sequestro ósseo e reação periosteal.

37. Em relação ao exame físico do joelho, analise as afirmativas a seguir:

I - Os testes de Lachman e da Gaveta anterior avaliam a integridade do ligamento cruzado anterior.

II - O teste de Apley positivo em rotação interna indica lesão do menisco medial.

III - O teste de Steinmann é realizado com o paciente sentado na maca, com as pernas pendentes a 90°, fazendo-se rotações externa e interna da perna, segurando pelo pé.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

38. Sobre a fratura do processo odontoide, analise as afirmativas a seguir:

I - Ocorre por mecanismo de compressão axial associado a flexão forçada.

II - É importante a realização de 3 incidências radiográficas: frente, perfil e transoral.

III - As fraturas tipo III tem maior associação com pseudoartrose e devem ser submetidas a tratamento cirúrgico por meio de osteossíntese com parafuso canulado.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

39. Sobre a terminologia ortopédica, analise as afirmativas a seguir:

I - Anquilose é a cirurgia realizada para fundir uma articulação e levar a total perda da mobilidade, com objetivo de diminuir a dor.

II - Neuropraxia é a lesão de um nervo periférico que causa perda da função em grau variável, mas de retorno espontâneo, em tempo variável.

III - Neurotmele é a lesão completa de um nervo sem resolução espontânea.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

40. Em relação ao aparecimento dos núcleos de ossificação do cotovelo, aquele que ossifica mais tardiamente, em torno dos 12 anos de idade é o:

- a) Epicôndilo Medial.
- b) Epicôndilo Lateral.
- c) Tróclea.
- d) Capítulo.