

LÍNGUA PORTUGUESA

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 01 à questão 04	0,5	2,5	1,25
Da questão 05 à questão 08	1,0	2,5	2,5
Da questão 09 à questão 10	2,0	2,5	5,0

Texto I

A educação é uma arma

O brasileiro, principalmente o das grandes cidades, parece viver em pânico. O medo tornou banal desconfiar de crianças em semáforos ou de adultos maltrapilhos que andam pelas ruas.

A cada dia aumenta o número de crimes e criminosos. Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao enxergar quem os ameaça como inimigos a serem eliminados. Muitos defendem a pena de morte. Outros gostam de saber que os marginais estão em condições repugnantes nas prisões em que são lançados. Mas, os piores são os que acham impossível regenerar um homem.

Victor Hugo advertiu: "Quem abre uma escola fecha uma prisão". Muito antes, Pitágoras conclamou: "Educar crianças, para que não seja necessário castigar os adultos". Não é, portanto, nenhuma novidade, nem tampouco absurdo, exigir que se invista cada vez mais em educação. É ela que arrebenta grades, abre portas e liberta todos nós.

(Revista Educação, out. 1999. Adaptado)

01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Com base no texto acima, o título do texto I "A educação é uma arma" apresenta-se em qual figura de linguagem?

- Metáfora.
- Catacrese.
- Metonímia.
- Onomatopeia.

02. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Assinale a alternativa em que todas as palavras ou expressões recuperam, por coesão textual, o fato da advertência do escritor Vitor Hugo no texto I.

- liberdade, impaciência.
- impossibilidade, interesse.
- vontade, liberdade.
- solidariedade, condenação.

03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Segundo o Texto I, a pior forma de se observar os criminosos é:

- não tem como mudar a forma como eles levam a vida.
- são pessoas a serem dizimadas da sociedade.
- é muito melhor vê-los nas prisões.
- o pânico que acontece na sociedade é culpa deles.

04. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A expressão "parece viver em pânico", na primeira e na segunda linha do texto significa que:

- As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a criminalidade.
- Os grandes filósofos já alertavam para a teoria do pânico na vida das pessoas.
- Viver em grandes cidades transforma o cotidiano em um transtorno geral.
- Cada dia, mais e mais pessoas estão enfrentando problemas no cotidiano.

05. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Na oração "Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao enxergar". A partir dos estudos gramaticais podemos dizer que o termo destacado se refere à:

- Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.
- Oração Subordinada Substantiva Subjetiva.
- Oração Coordenada Sindética Explicativa.
- Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.

06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Na oração: Dentre eles, 86% fazem isso, mesmo durante o período de pânico. Substituindo 86% por 1% e flexionando o verbo FAZER no pretérito imperfeito do indicativo, obtenha-se:

- 1% fará.
- 1% farão.
- 1% fazia.
- 1% faziam.

07. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Assinale a alternativa que apresenta palavra em sentido conotativo.

- Não será preciso castigar os adultos.
- Vários pensadores falaram sobre a criminalidade.
- É o ensino que arrebenta as grades.
- Muitos querem a pena de morte.

08. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Atribuir-se-á o emprego de dois-pontos, em "Um poeta é sempre irmão do vento e da água: deixa seu ritmo por onde passa." (Cecília Meireles). A intenção é de anunciar:

- uma explicação;
- um esclarecimento;
- um vocativo;
- uma citação;

09. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

No fragmento de texto "Temos de cobrar dos deputados e senadores as leis necessárias para punir esses assassinos. Das autoridades do trânsito, fiscalização e multas vigorosas para quem desobedece às leis e à sinalização. E da justiça, rapidez e dureza com os infratores." (Nicole Puzzi, Veja 1280, ano 26, nº 12). Empregam-se as vírgulas para:

- a) separar termos coordenados;
- b) separar as orações adjetivas;
- c) isolar orações intercaladas;
- d) **indicar a supressão do verbo.**

10. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

O segmento sublinhado pode-se substituir, sem prejuízo para a correção e o sentido do texto em:

- a) O grupo que abrange os seis países mais ricos por onde se abarcam.
- b) São carentes de propostas políticas por imunes a.
- c) Sob a direção de Capangas o movimento foi declaradamente ilegal por em cuja direção.
- d) **E sobra-me uma raiva que deve valer a dos mais radicais interesses por talvez equivalha à.**

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE FISIOTERAPEUTA

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 11 à questão 22	0,5	2,5	1,25
Da questão 23 à questão 34	1,0	2,5	2,5
Da questão 35 à questão 40	2,0	2,5	5,0

11. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Qual o tipo de marcha assemelha-se com a marcha parkinsoniana?

- a) Ceifante.
- b) Tremores.
- c) Tabética.
- d) **Petit-pas.**

12. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Fratura da extremidade distal do rádio, com deslocamento dorsal do fragmento e luxação do carpo:

- a) Fratura de Colles.
- b) **Fratura de Barton.**
- c) Fratura de Smith.
- d) Fratura de Bennett.

13. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

O trajeto do sistema de condução elétrica do coração consiste:

- a) **Nó sinusal – Nó AV – Feixe de Hiss – Sistema de Purkinje.**
- b) Nó AV - Nó sinusal – Feixe de Hiss – Sistema de Purkinje.
- c) Nó sinusal – Feixe de Hiss – Nó AV – Sistema de Purkinje.
- d) Nó AV – Feixe de Hiss – Nó sinusal – Sistema de Purkinje.

14. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Qual onda do ECG corresponde à despolarização ventricular?

- a) Onda T.
- b) Onda P.
- c) **Onda QRS.**
- d) Intervalo PR.

15. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Marque a alternativa que apresente músculos inervados pelo nervo radial:

- a) **Extensor longo radial do carpo, extensor curto radial do carpo, extensor ulnar do carpo.**
- b) Extensor longo radial do carpo, extensor curto radial do carpo, flexor ulnar do carpo.
- c) Palmar longo, flexor ulnar do carpo, extensor longo radial do carpo.
- d) Flexor radial do carpo, extensor longo radial do carpo, extensor curto radial do carpo.

16. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Paciente sentado ou em pé, flexiona o ombro à 60° com cotovelo estendido e antebraço supinado, resistência isométrica aplicada no antebraço ventral distal, paciente deve elevar o braço contra resistência. É a descrição do seguinte teste:

- a) Ludington.
- b) Yergason.
- c) **SPEED.**
- d) Apley.

17. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

O teste de Lachman é utilizado para:

- a) **Identificar lesões de LCA.**
- b) Detectar artrite no quadril.
- c) Detectar ruptura do tendão de Aquiles.
- d) Identificar uma lesão meniscal.

18. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

As artérias cerebrais anterior e posterior se conectam na base do cérebro e formam o circuito arterial cerebral, também chamado de:

- a) **Círculo de Willis.**
- b) Trifurcação da artéria carótida.
- c) Espaço subaracnóideo.
- d) Polígono de Thompson.

19. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

De acordo com a evolução normal de um RN, marque a alternativa INCORRETA:

- a) No terceiro mês a criança começa a levar a mão à linha média.
- b) **No quarto mês, os reflexos plantares de preensão não se produzem.**
- c) O nono mês é caracterizado pelo estado de verticalização.
- d) No quinto mês desaparecem os padrões tônicos posturais, a reação de Moro e outras reações primárias do período neonatal.

20. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Na artroplastia de quadril alguns fatores contribuem para a luxação e subluxação do quadril, EXCETO:

- a) Posição inadequada de um ou ambos os componentes da artroplastia.
- b) O encurtamento do fêmur, fraqueza dos músculos abdutores.
- c) Avulsão do grande trocanter.
- d) **Flexão e extensão tíbio-társica com exercícios ativos livres.**

21. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Em uma avaliação pupilar, um paciente com midríase é sinal de:

- a) Pupilas com tamanhos normais.
- b) Pupilas alteradas sem lesão grave.
- c) **Lesão de tronco encefálico.**
- d) Edema bilateral.

22. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Caracteriza-se por ser uma doença inflamatória, progressiva, soronegativa que se apresenta com dor e rigidez da coluna vertebral com a fusão óssea bilateral da articulação sacroilíaca:

- a) Artrite reumatoide.
- b) Doença de Paget.
- c) **Espondilite Anquilosante.**
- d) Síndrome da dor lombar.

23. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Uma classificação bem comum usada no prognóstico e no tipo de tratamento das fraturas de colo femoral é a classificação de Garden. Sobre os tipos desta classificação marque a alternativa incorreta:

- a) Tipo I: Fratura incompleta impactada em valgo, a cortical inferior quase sempre está íntegra. Os vasos reticulares estão relaxados e a cabeça é viável.
- b) Tipo II: Fratura completa sem desvio, a cortical inferior do colo rompeu-se, mas não houve inclinação da cabeça femoral.
- c) Tipo III: Fratura completa com desvio parcial, não há rotação lateral completa do fragmento distal: existe contato no segmento posteroinferior do coto, e a cabeça femoral ainda viável. As trabéculas da cabeça femoral apontam para a cortical lateral da diáfise.
- d) **Tipo V: Fratura por cisalhamento com simples deslocamento, apresenta um grande fragmento lateral ou Spótero-lateral, mais raramente medial, sem afundamento da cartilagem articular ou do osso metafisário.**

24. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Se for friccionada para vertebralmente com o dedo, a criança forma com o corpo um arco. A concavidade volta-se na direção do estímulo, a bacia é puxada para cima. A perna e o braço estendem-se, as extremidades opostas fletem-se. Essa é a descrição refere-se a:

- a) **Reação de Galant.**
- b) Reação de marcha.
- c) Reflexo magnético.
- d) Reação de Landau.

25. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Uma das principais patologias respiratórias que acomete os idosos é a pneumonia que tem como característica clínica, EXCETO:

- a) Tosse
- b) Dor torácica.
- c) Expectoração.
- d) **Evolução lenta dos sintomas.**

26. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

O grau de obstrução na asma pode ser avaliado ambulatorialmente através da medição de:

- a) PaCO₂.
- b) PaO₂.
- c) Pressão respiratória máxima.
- d) **Pico de fluxo expiratório.**

27. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

A saúde do trabalhador é uma das preocupações de grandes empresas, que buscam na Ergonomia uma solução para a diminuição da ausência do trabalho. Sobre a Ergonomia, podemos afirmar que o seu objetivo central é:

- a) **Analisar a atividade do trabalho.**
- b) Definir a forma como os homens deveriam se comportar nas situações do trabalho.
- c) Analisar a natureza da atividade realizada pelo homem.
- d) Descrever as particularidades do trabalho humano.

28. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Reflexo é uma resposta motora ou secretora a um estímulo adequado, os reflexos estão presentes em recém-nascidos, demenciados e pacientes em coma. Qual das afirmativas sobre as características fisiológicas está correta?

- a) No período de latência não se obtém resposta a um estímulo adequado.
- b) O período refratário é o tempo entre a aplicação do estímulo e a resposta.
- c) Quando há fadiga não é necessário certo período de tempo para o reaparecimento do reflexo.
- d) **Na inervação recíproca a contração reflexa de um músculo se acompanha da inibição dos seus antagonistas.**

29. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

A vulvite é definida como uma irritação vulvar ocasionada pelo contato com o agente causador. Qual das alternativas NÃO corresponde à vulvite?

- a) Eritema difuso da pele vulvar acompanhado de prurido ou queimação.
- b) **Alteração edematosa, assimétrica e esbranquiçada do tecido.**
- c) Ulceração com lesões úmidas e possíveis infecções secundárias.
- d) A infecção pode ser por fungos, bactérias, vírus, parasitas.

30. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Correlacione cada item à sua fase e marque a alternativa correta.

- (1) Fase inflamatória.
- (2) Fase proliferativa.
- (3) Fase reparativa.

- () Menor densidade celular e vascularização
- () Tecido de granulação
- () Liberação e ação dos mediadores
- () Maturação do colágeno
- () Vasoconstrição rápida e transitória
- () Fibroplasia

- a) **321312.**
- b) 123321.
- c) 321313.
- d) 331312.

31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Paciente CSC, 42 anos, sexo feminino, realizou uma mastectomia, no pós-cirúrgico ela pode apresentar, EXCETO:

- a) Aderências na parede torácica.
- b) Alterações posturais.
- c) Restrição na mobilidade do ombro.
- d) **Grau de força normal do MS envolvido.**

32. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Sobre o sistema muscular em idoso é correto afirmar que:

- a) As fibras vermelhas diminuem em volume mais que as brancas.
- b) Miofibrilas completamente organizadas.
- c) Aumento na área de contato do axônio e placa motora.
- d) **Substituição das fibras musculares por tecido adiposo e conjuntivo.**

33. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Sobre a avaliação de uma órtese para tronco é incorreto afirmar que:

- a) São usualmente prescritas para reduzir a dor.
- b) A órtese deve ser confortável.
- c) A faixa deve estar entre as escápulas.
- d) **Cada haste vertical lateral deve situar-se na linha média lateral ao corpo e comprimir o tórax durante a respiração.**

34. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Sobre a escala de Hamsay, é incorreto afirmar que:

- a) No grau 3, o paciente está sonolento, atendendo aos comandos.
- b) No grau 5, o paciente encontra-se dormindo, responde lentamente ao estímulo glabelas ou ao estímulo sonoro vigoroso.
- c) No grau 4, o paciente está dormindo, responde rapidamente ao estímulo glabellar ou ao estímulo sonoro vigoroso.
- d) **No grau 2, o paciente está cooperativo, desorientado e inquieto.**

35. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Sobre a Estratégia de Saúde da Família (ESF), marque a alternativa incorreta:

- a) Caracteriza-se como a porta de entrada prioritária de um sistema de saúde constitucionalmente fundado no direito à saúde e na equidade do cuidado.
- b) A ESF vem provocando um importante movimento de reorientação do modelo de atenção à saúde em nosso país.
- c) **A ESF não é hierarquizada e regionalizada, como é o caso do SUS.**
- d) A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma vertente brasileira da APS.

36. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

O Nasf foi criado mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, sobre o Nasf analise as alternativas:

- () Um Nasf deve ser constituído por uma equipe, na qual profissionais de diferentes áreas de conhecimento atuam em conjunto com os profissionais das equipes de Saúde da Família, compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das equipes de SF.
 - () A composição do NASF deve ser definida pelos próprios gestores municipais e as equipes de SF, mediante critérios de prioridades identificadas a partir das necessidades locais e da disponibilidade de profissionais de cada uma das diferentes ocupações.
 - () O Nasf se constitui numa das portas de entrada do sistema para os usuários, podendo ser sempre realizada a intervenção direta frente a usuários e famílias.
 - () O Nasf deve atuar dentro de algumas diretrizes relativas à APS, a saber: ação interdisciplinar e intersetorial; educação permanente em saúde dos profissionais e da população; desenvolvimento da noção de território; integralidade, participação social, educação popular; promoção da saúde e humanização.
 - () A organização dos processos de trabalho dos Nasf tem sempre como foco o território sob sua responsabilidade e todas as áreas vizinhas já que é um direito universal.
- a) VFFVF.
 - b) **VFVF.**
 - c) FVVVF.
 - d) FVFFF.

37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

A organização e o desenvolvimento do processo de trabalho do Nasf dependem de algumas ferramentas já amplamente testadas na realidade brasileira, como é o caso:

- a) Do Apoio Matricial.
- b) Da Clínica Ampliada.
- c) Do Projeto Terapêutico Singular (PTS).
- d) **Do Pacto pela Vida.**

38. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

O Nasf é composto de nove áreas estratégicas. São elas:

- a) Saúde da criança/do adolescente e do jovem; Saúde da mulher;
- b) Saúde mental; Práticas corporais;
- c) **Reabilitação/saúde parcial da pessoa idosa;**
- d) Alimentação e nutrição; serviço social; assistência farmacêutica; atividade física;

39. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Sobre a hanseníase é incorreto afirmar que:

- a) Pacientes com hanseníase apresentam lesão(ões) de pele com alteração de sensibilidade.
- b) Espessamento de nervo(s) periférico(s).
- c) A baciloscopia será sempre positiva.
- d) A H. Dimorfa ou Boderline é maliga de caráter instável.

40. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

O treinamento em Cadeia Cinética Fechada é um método de exercícios no qual o segmento terminal está fixo e encontra-se considerável resistência, o que impede ou limita sua movimentação livre. São características desse exercício:

- a) Interdependência do movimento articular.
- b) Movimento que ocorre proximal e distal ao eixo da articulação de uma maneira previsível.
- c) Recrutamento das contrações musculares que são predominantemente excêntricas, com estabilização muscular dinâmica na forma de co-contração.
- d) Propriocepção diminuída em virtude do menor número de mecanorreceptores estimulados.