

CIRURGIA PEDIÁTRICA

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 – Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
- 2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
- 3 – Ao receber a **Folha de Respostas**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4 – **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5 – Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01

A	B	C	D
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (**alíneas a, b, d, h e m**).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 19 de outubro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **79 (setenta e nove) questões de múltipla escolha** com **4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão**, assim distribuídas: **BLOCO A**: 5 (cinco) questões de **Cooperativismo**, 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria**, 8 (oito) questões de **Saúde Pública e Saúde Suplementar**; **BLOCO B**: 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

BLOCO A

COOPERATIVISMO

QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de médicos, organizadas no formato societário de cooperativas de trabalho médico.
- B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro grau ou singular do Sistema Unimed.
- C) A entidade médica que liderou a formação da Mediminas, que posteriormente passou a ser denominada Unimed BH, foi o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.
- D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A instância máxima de deliberação em uma cooperativa é a Assembleia Geral dos Associados.
- B) O associado poderá ser eliminado da sociedade por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.
- C) A demissão do cooperado – saída voluntária da cooperativa – poderá ser impedida pelos órgãos da administração, caso o trabalho desse cooperado seja indispensável ao bom funcionamento da cooperativa.
- D) A prestação de contas da administração da cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária realizada no primeiro trimestre de cada ano.

QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a organização do setor no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa são democraticamente eleitos pelos associados e funcionários da cooperativa.
- B) A solidariedade, a democracia e a equidade são princípios universais do cooperativismo.
- C) Os fundos de investimento estão impedidos de adquirir parte do capital das cooperativas, ainda que de forma minoritária.
- D) A Confederação Nacional do Cooperativismo (CNCOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) são entidades do cooperativismo brasileiro que compõem o sistema OCB.

QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra os seguintes princípios universais do cooperativismo **EXCETO**:

- A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.
- B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.
- C) As cooperativas são sociedades de pessoas; sociedades essas não sujeitas à falência.
- D) As quotas-partes do capital da sociedade podem ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado por cooperativas singulares, por federações estaduais ou regionais e por uma confederação denominada Unimed do Brasil.
- B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de Cooperados, possui uma Assembleia Geral de Delegados formada por associados eleitos dentro das especialidades médicas.
- C) O Conselho Social da Unimed BH possui função consultiva, discute as macropolíticas e as estratégias da Cooperativa e é formado por delegados, conselheiros e membros do Núcleo de Integração com Cooperados.
- D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde Suplementar no Brasil e estabelece regras para os planos privados de assistência à saúde, exceto para as cooperativas que devem observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Homens com menos de 40 anos de idade, assintomáticos e sem comorbidades, que irão ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem previsão de sangramento, não necessitam de nenhum exame complementar pré-operatório.
- B) A história clínica constitui meio mais efetivo para diagnosticar fatores de risco associados a doenças coexistentes do que o exame físico e os exames complementares.
- C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos os sexos.
- D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a realização pré-operatória de ureia / creatinina, dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.

QUESTÃO 7

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os macrófagos apresentam mobilização mais rápida em direção à área traumatizada do que os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais curto.
- B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por diversos mecanismos, destacando-se a liberação de enzimas proteolíticas, como as elastases.
- C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de células e pode mediar a vasodilatação e regular o tônus vascular.
- D) As proteínas reactantes da fase aguda são produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na tentativa de manter a homeostasia.

QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à proliferação de células endoteliais.
- B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da permeabilidade vascular, mediada, entre outras, pela serotonina e histamina.
- C) Os leucócitos têm importante papel na remoção de detritos celulares e de bactérias do leito da lesão.
- D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que são responsáveis pela produção de interleucina 1.

QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de hipotensão sem taquicardia concomitante é sinal sugestivo de choque neurogênico.
- B) É característica do choque cardiogênico a redução da perfusão tecidual com volemia adequada.
- C) Gasometria arterial inalterada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo por embolia pulmonar.
- D) São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio, dissecação aguda da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

- I. A associação de lesões aftosas na boca com lesões anais e perianais pode sugerir a presença da doença de Crohn.
- II. É a manifestação clínica que mais frequentemente se associa a doenças do intestino delgado.
- III. Quando a origem é o intestino delgado, as dejeções são pequenas, com número diário muito aumentado, frequentemente com muco, pus e sangue.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa que **NÃO** é considerada causa dessa doença.

- A) Cirurgia abdominal
- B) Hiperlipidemia
- C) Hipocalcemia
- D) Trauma abdominal contuso

QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames complementares e as doenças ou situações que afetam o aparelho respiratório.

COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina
2. Dímero D
3. Dosagem de cloro no suor
4. Espirometria
5. Ultrassonografia

COLUNA II

- () Asma
- () Derrame pleural
- () Embolia pulmonar
- () Enfisema pulmonar
- () Mucoviscidose

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 5 2 1 3
- B) 1 5 3 4 2
- C) 3 1 2 5 4
- D) 5 4 3 1 2

QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes patológicos, apresenta há várias semanas parestesias nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Anemia falciforme
- B) Anemia perniciosa
- C) Esclerose múltipla
- D) Talassemia

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, halo perinuclear e multinucleação.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Infecção por papilomavírus humano
- B) Cervicite crônica bacteriana
- C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
- D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é recorrente. No momento, não apresenta queixas nem sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta: PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m²; mamas e exame ginecológico sem alterações.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a conduta a ser adotada.

- A) Solicitar exames complementares de rotina, como mamografia e ultrassonografia, e manter terapia hormonal até o resultado dos exames.
- B) Manter a terapia hormonal, independentemente dos resultados dos exames, pois a paciente teve diagnóstico de menopausa recentemente.
- C) Orientar a paciente sobre os riscos cardiovasculares da terapia hormonal e suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.
- D) Suspender a terapia hormonal e solicitar ultrassonografia transvaginal de urgência e, somente depois do resultado desse exame, discutir a possibilidade de retorno.

QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com 36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa (1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos cardíofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 2,0 cm.

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e indicar resolução da gestação.
- B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e recomendar controle materno-fetal.
- C) Prescrever Nifedipina via oral associada à Alfametildopa e recomendar controle materno-fetal.
- D) Pedir exames para avaliação da função renal e hepática e recomendar controle materno-fetal.

QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação e o último hemograma apresentou hemoglobina de 11 g/dL, em exame de rotina pré-natal.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Realizar coleta seriada de hemograma e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter orientação dietética considerando o estilo de vida da paciente.
- D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

PEDIATRIA

QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até:

- A) 4 meses.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 24 meses.

QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é **CORRETO** afirmar:

- A) Apesar da simplicidade da utilização da antropometria, a falta de uma curva nacional fez com que o Ministério da Saúde contraindicasse a sua utilização em saúde pública.
- B) Para avaliar o crescimento, a medida da altura é mais importante que a do peso, devido à facilidade de sua obtenção.
- C) A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas de percentil porque são mais fidedignas que as que utilizam escore z.
- D) O acompanhamento da medida de peso e sua localização em um gráfico é uma importante forma de avaliar o crescimento de uma criança.

QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda e com desidratação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar com hidratação endovenosa.
- B) A prescrição de antibióticos é necessária porque a maioria das diarreias agudas é de origem bacteriana.
- C) Na desidratação leve e moderada, na qual não há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação com terapia de reidratação oral.
- D) Em uma criança com diarreia e desidratada, e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é **CORRETO** afirmar que:

- A) todas as crianças após o diagnóstico de pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.
- B) as pneumonias virais são muito raras, por isso, a utilização de antibióticos é tão importante numa criança com quadro respiratório.
- C) a droga de escolha para o tratamento da pneumonia na comunidade é a Penicilina Benzatina, pelo seu baixo custo.
- D) a Amoxicilina é utilizada para tratamento da maioria das pneumonias bacterianas.

SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.
- C) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- D) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.

QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.

Região / ano	2010	2011	2012	2013
Norte	5.289	5.093	5.113	5.163
Nordeste	13.197	3.006	12.527	12.717
Sudeste	4.120	14.172	4.114	13.748
Sul	4.220	4.395	4.238	4.141
Centro-Oeste	3.044	3.050	3.131	3.197
Total	39.870	39.716	39.123	38.966

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É necessário conhecer a estimativa populacional para cada ano (número de óbitos / população x 1 000).
- B) É necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos vivos x 1 000).
- C) É necessário multiplicar o número de óbitos por 100, já que se trata de uma porcentagem (número de óbitos x 100).
- D) É necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em crianças de 0-7 dias).

QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em desenvolvimento vêm apresentando graves problemas relacionados à escassez de recursos financeiros, decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento das questões relativas à incorporação tecnológica desordenada.

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estratégias de enfrentamento incluem avaliações de eficácia / efetividade e custo das tecnologias em saúde.
- II. A avaliação de tecnologias em saúde não influencia a decisão clínica, visto que esta é uma decisão individual.
- III. A avaliação de tecnologias opera somente no campo de saúde pública, uma vez que, no sistema privado, o custo não é um fator limitante para a obtenção de produtos em saúde.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se elevado número de estabelecimentos de saúde privados no Brasil.

De acordo com a Constituição Federal, de que forma ocorre a participação do sistema de saúde privado?

- A) Complementar ao SUS.
- B) Opcional para o SUS.
- C) Compulsório para cidadãos com alto poder aquisitivo.
- D) Obrigatório para empresas.

QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas em prazos pré-estabelecidos.

Sobre esses prazos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 7 (sete) dias úteis.
- B) Consulta nas especialidades médicas (nefrologista, pneumologista, ortopedista): em até 14 (quatorze) dias úteis.
- C) Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis.
- D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias úteis.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-referência de assistência à saúde deve contemplar os seguintes procedimentos, **EXCETO**:

- A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar
- B) Centro de terapia intensiva
- C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental
- D) Tratamento antineoplásico

QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) "a cobrança feita aos beneficiários de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas indevidas".

Disponível em: < <http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf> >.
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa afirmativa se baseia.

- A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 (Integralidade das ações em saúde)
- B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição do plano-referência de assistência à saúde)
- C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 2013 (Dos princípios de atenção à saúde na saúde suplementar)
- D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 2006 (Das infrações a que estão submetidos os planos privados de assistência à saúde)

QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Centrar ações no cuidado médico para evitar falta de integração no cuidado ao paciente.
- B) Incorporar de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal.
- C) Usar a epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde.
- D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando o aumento de sua autonomia.

CIRURGIA PEDIÁTRICA

QUESTÃO 30

Sobre o controle hidroeletrólítico na criança, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A necessidade de manutenção diária de sódio é de 2 a 4 mEq/kg/dia.
- B) A necessidade de manutenção diária de potássio é de 1 a 3 mEq/kg/dia.
- C) Recém-nascidos com gastrosquise requerem menor quantidade de água.
- D) Caso seja necessário prescrever soroterapia de manutenção no primeiro dia de vida, não se deve usar sódio.

QUESTÃO 31

Sobre a fisiologia do recém-nascido prematuro, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os recém-nascidos prematuros estão mais propensos a perda de calor, dentre vários fatores, devido à sua maior superfície corpórea proporcional e ao escasso tecido subcutâneo.
- B) Devido à imaturidade do trato digestivo, pode haver dismotilidade intestinal.
- C) Devido à imaturidade do sistema nervoso central, pode ocorrer hemorragia subaracnóidea.
- D) Nos primeiros dias de vida, pode ocorrer hipertensão pulmonar transitória.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a causa mais comum de óbito num recém-nascido com atresia de esôfago.

- A) Fístula anastomótica
- B) Complicações da cardiopatia
- C) Sepsis
- D) Complicações da prematuridade

QUESTÃO 33

Considere o caso clínico a seguir.

Recém-nascido com atresia de esôfago sem fístula e com cotos distantes.

Em relação a esse caso, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** opção de estratégia operatória inicial.

- A) Anastomose esofageana primária retardada.
- B) Esofagostomia e gastrostomia.
- C) Substituição esofágica precoce.
- D) Confecção de anastomose esofageana tensa.

QUESTÃO 34

No que se refere à atresia de esôfago, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A classificação de Waterston é a mais usada atualmente.
- B) O diagnóstico de fístula traqueoesofageana sem atresia é sutil e requer elevado índice de suspeição.
- C) É imperioso que se realize ecocardiograma no pré-operatório.
- D) Pode haver anomalias associadas em até 70% dos casos.

INSTRUÇÃO: Leia o caso clínico a seguir para responder às questões **35** e **36**.

Recém-nascido apresenta-se com tosse logo após mamar, inclusive com crises de cianose.

QUESTÃO 35

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **menos** provável.

- A) Refluxo gastroesofageano
- B) Fenda laringotraqueal
- C) Fístula esofagotraqueal
- D) Atresia de coana

QUESTÃO 36

Para esse caso, o primeiro exame complementar que se deve solicitar é:

- A) estudo contrastado do esôfago, estômago e duodeno (REED).
- B) endoscopia digestiva.
- C) endoscopia da via aérea.
- D) tomografia de tórax.

QUESTÃO 37

Na suspeita de fenda laringotraqueal, qual seria o melhor método propedêutico para confirmar o diagnóstico?

- A) Endoscopia digestiva
- B) Endoscopia da via aérea
- C) Traqueobroncografia
- D) Tomografia computadorizada do tórax

QUESTÃO 38

Sobre os defeitos da parede abdominal no recém-nascido, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) na onfalocele ocorrem mais anomalias associadas do que na gastrosquise.
- B) no fechamento cirúrgico desses defeitos, deve-se considerar o fechamento por etapas.
- C) uma alternativa cirúrgica é a técnica de Gross.
- D) num caso de onfalocele grande associado a cardiopatia, deve-se sempre tentar o fechamento primário.

QUESTÃO 39

Analise o caso clínico a seguir.

Recém-nascido com fenótipo de síndrome de Down evolui com clínica de obstrução intestinal alta.

Nesse caso, assinale a alternativa que indica o diagnóstico **mais** provável.

- A) Doença de Hirschsprung
- B) Íleo meconial
- C) Atresia duodenal
- D) Atresia intestinal

INSTRUÇÃO: Leia o caso clínico a seguir para responder às questões **40** e **41**.

Recém-nascido apresenta-se com clínica de obstrução intestinal. Ao raio X de abdome, não se evidenciam níveis hidroaéreos, encontrando-se apenas dilatação de alças intestinais e imagem em “bolhas de sabão” em hipocôndrio direito.

QUESTÃO 40

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais** provável.

- A) Enterocolite necrosante
- B) Doença de Hirschsprung
- C) Peritonite meconial
- D) Íleo meconial

QUESTÃO 41

Qual seria a próxima conduta para esse caso?

- A) Realização de laparotomia exploradora.
- B) Realização de enema opaco.
- C) Estímulo retal com supositório de glicerina.
- D) Repetir radiografia de abdome de modo seriado.

QUESTÃO 42

Considere que um recém-nascido nasce com ascite.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta a causa **mais** comum de ascite congênita.

- A) Ascite urinária
- B) Ascite quilosa
- C) Ascite secundária a hipertensão porta
- D) Ascite de causa oncológica

QUESTÃO 43

Analise o caso clínico a seguir.

No conceito, realiza-se diagnóstico pré-natal de grande massa cervical, sendo que a ressonância nuclear magnética mostrou compressão traqueal e desvio cefálico do olhar. Não há sinais de sofrimento ou hidropisia fetal.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Ressecção intraútero do tumor, por meio de cirurgia fetal.
- B) Tentativa de intubação durante o parto, por meio de EXIT.
- C) Cirurgia precoce logo após o parto.
- D) Cirurgia eletiva no período neonatal.

QUESTÃO 44

Considere o caso clínico a seguir.

Recém-nascido com hérnia diafragmática congênita está com 24 horas de vida e apresenta-se bem, com baixos parâmetros de ventilação mecânica e estável hemodinamicamente.

Assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada nesse caso.

- A) Operar, pois mantém-se estável com 24 horas de vida.
- B) Aguardar mais 24 horas para operar depois de 48 horas de vida.
- C) Manter conduta inicial expectante e controlar clinicamente por meio de gasometrias e ecocardiogramas seriados, para depois se decidir pelo tratamento cirúrgico.
- D) Aguardar pelo menos 5 dias de vida.

QUESTÃO 45

Na enterocolite necrosante (NEC), são prováveis indicações de tratamento cirúrgico, **EXCETO**:

- A) Piora clínica num recém-nascido já com diagnóstico de NEC.
- B) Hiperemia na parede abdominal.
- C) Alça fixa à radiografia seriada do abdome.
- D) Pneumatose difusa.

INSTRUÇÃO: Leia o caso clínico a seguir para responder às questões **46** e **47**.

Recém-nascido prematuro extremo, com 800 gramas de peso, no 10º dia de vida evoluiu com piora hemodinâmica súbita associada a escurecimento do abdome.

QUESTÃO 46

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais** provável.

- A) Perfuração gástrica
- B) Enterocolite necrosante
- C) Sangramento intra-abdominal
- D) Sepsis

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada nesse caso.

- A) Laparotomia exploradora.
- B) Conduta expectante.
- C) Aguardar melhora clínica para avaliar o melhor momento cirúrgico.
- D) Drenagem abdominal.

QUESTÃO 48

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, 9 anos de idade, apresenta-se há 24 horas com dor abdominal que, inicialmente, era em cólica e difusa, e depois localizou-se em FID. Ao exame físico, apresenta-se abatido, em posição antiálgica, além de dor em fossa ilíaca direita, com defesa muscular nesse local.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Tratamento cirúrgico.
- B) Solicitação de hemograma, urinálise e radiografia de abdome.
- C) Solicitação de ultrassonografia abdominal.
- D) Observação e reavaliação clínica seriada.

QUESTÃO 49

Analise a situação clínica a seguir.

Lactente com 1 mês de vida, com icterícia com padrão colestatístico e acolia fecal.

Assinale a alternativa que apresenta o primeiro passo propedêutico para essa situação.

- A) Ultrassonografia abdominal
- B) Cintilografia hepática
- C) Sorologia para hepatites neonatais
- D) Tubagem duodenal

QUESTÃO 50

Sobre a atresia de vias biliares, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) À biopsia hepática, há intenso infiltrado inflamatório.
- B) A maioria dos pacientes, em algum momento, necessitará de transplante hepático.
- C) Apesar de controverso, a maioria dos autores indica o uso de imunoterapia adjuvante no pós-operatório.
- D) Em alguns casos, podem associar-se *situs inversus abdominalis* e poliesplenia.

QUESTÃO 51

Considere o caso clínico a seguir.

Lactente de 10 meses iniciou há 2 dias com dor abdominal em cólica, associado a vômitos, e, por último, fezes com sangue, tipo geleia de morango. À ultrassonografia abdominal identificou-se imagem em “alvo”.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Redução hidrostática, por meio de enema opaco.
- B) Redução por meio de infusão de ar.
- C) Conduta expectante.
- D) Laparotomia.

QUESTÃO 52

Sobre as doenças inflamatórias intestinais, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) na doença de Crohn, só se justifica o tratamento cirúrgico em suas complicações.
- B) na retocolite ulcerativa, só se justifica o tratamento cirúrgico em suas complicações.
- C) podem ocorrer afecções perianais.
- D) na retocolite ulcerativa, pode ocorrer megacólon tóxico.

QUESTÃO 53

Com relação à anomalia anorretal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Em casos de fístula retovestibular, na mulher, pode-se considerar o abaixamento colônico sem colostomia.
- B) O invertograma deve ser realizado em todos os casos.
- C) A incidência de fístula retovaginal é rara.
- D) Em crianças com síndrome de Down, pode haver anomalia anorretal sem fístula.

QUESTÃO 54

Sobre a anomalia anorretal, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) pode haver bexiga neuropática.
- B) na cloaca a incidência de uropatia associada é baixa.
- C) nos casos de anomalia anorretal com fístula perineal em “alça de balde”, pode ser realizado abaixamento precoce no período neonatal, sem colostomia.
- D) nos casos de fístula retovestibular, deve-se realizar colostomia.

QUESTÃO 55

Sobre a doença de Hirschsprung, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Nos casos de segmento agangliônico longo, a clínica pode ser mais sutil e pode haver episódios de diarreia intercalado.
- B) A minoria dos casos se apresenta no período neonatal.
- C) Nos casos de acometimento retossigmoidiano, deve-se considerar o abaixamento anal exclusivo.
- D) É mais frequente em crianças com síndrome de Down.

QUESTÃO 56

São técnicas cirúrgicas para alongamento intestinal na síndrome do intestino curto, **EXCETO**:

- A) Bianchi.
- B) STEP.
- C) Lova.
- D) Langer.

QUESTÃO 57

Sobre o cisto de colédoco, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O cisto do tipo fusiforme é o mais frequente.
- B) O exame ultrassonográfico pode ser suficiente para diagnóstico.
- C) Não é necessário ressecar o cisto.
- D) A reconstrução pode ser com o jejuno, em Y de Roux, ou com o duodeno.

QUESTÃO 58

Assinale a alternativa que apresenta a causa mais comum de hidronefrose fetal.

- A) Refluxo vesicoureteral.
- B) Estenose de junção ureteropélvica.
- C) Estenose de junção ureterovesical.
- D) Válvula de uretra posterior.

QUESTÃO 59

No que se refere à eventração diafragmática, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O melhor acesso cirúrgico é através de laparotomia, em ambos lados.
- B) Eventração diafragmática e hérnia diafragmática com saco herniário podem ser indistinguíveis no pré-operatório.
- C) Pode-se relacionar com paralisia de Erb.
- D) Grande eventrações assintomáticas não necessitam de tratamento cirúrgico.

QUESTÃO 60

Sobre hérnia inguinal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A maioria dos casos está localizada à direita.
- B) Pelos trabalhos mais recentes sobre o assunto, justifica-se a exploração contralateral em caso de hérnia inguinal unilateral.
- C) A maioria dos casos apresenta-se em crianças com menos de 1 ano de vida.
- D) Sua incidência é maior em crianças com mucopolissacaridose.

QUESTÃO 61

Assinale a técnica operatória **mais** indicada no tratamento de lactente com estenose hipertrófica do piloro.

- A) Píloromiotomia à Ramstedt
- B) Píloroplastia à Heineke-Mikulicz
- C) Gastrojejunoanastomose
- D) Duodenoduodenostomose

QUESTÃO 62

Sobre malformações pulmonares, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O sequestro pulmonar ocorre em 5% dos casos em crianças com hérnia diafragmática congênita.
- B) No enfisema lobar congênito, o tratamento é sempre cirúrgico, mesmo nos casos com clínica sutil.
- C) Nos casos que evoluem com hidropsia fetal, pode ser necessária intervenção intraútero.
- D) Nos casos de doença nas lesões císticas, pode haver transformação maligna.

QUESTÃO 63

São técnicas usadas para substituição esofágica na criança, **EXCETO**:

- A) Transposição gástrica.
- B) Esofagocoloplastia.
- C) Tubo gástrico.
- D) Cirurgia de Merendino.

QUESTÃO 64

Sobre o trauma torácico na criança, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É menos frequente que o trauma abdominal e, geralmente, ocorre em traumas com grande energia cinética.
- B) A lesão mais comum é a contusão pulmonar.
- C) O mecanismo de morte, normalmente, se relaciona a outras lesões associadas, em especial ao trauma cranioencefálico.
- D) As fraturas de costelas são mais comuns nas crianças do que nos adultos.

QUESTÃO 65

Sobre o trauma na criança, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) em crianças com menos de 1 ano de vida, a principal causa de óbito no trauma é a obstrução de via aérea.
- B) em crianças de 1 a 4 anos de vida, a principal causa de óbito no trauma é o afogamento.
- C) em crianças de 5 a 14 anos, acidentes automobilísticos são a principal causa de óbito no trauma.
- D) no geral, o trauma é a segunda causa de óbitos em crianças.

QUESTÃO 66

Sobre o trauma abdominal na criança, é **CORRETO** afirmar que:

- A) o lavado peritonial possui pouco valor propedêutico.
- B) o FAST possui pouco valor propedêutico.
- C) o uso de contraste não se faz necessário na realização da tomografia computadorizada.
- D) não se justifica o uso de laparoscopia.

QUESTÃO 67

No que se refere ao trauma abdominal na criança, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O baço e o fígado são os órgãos mais lesados.
- B) A maioria das lesões de víscera maciça são tratadas conservadoramente.
- C) O tratamento do hematoma duodenal é cirúrgico.
- D) A tomografia computadorizada de abdome é pouco específica para trauma intestinal.

QUESTÃO 68

Sobre o tumor de Wilms, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) pode associar-se às síndromes de Beckwith-Wiedeman, de WARG e de Denys-Drash.
- B) a tomografia computadorizada de abdome é pouco sensível na pesquisa de tumores bilaterais.
- C) as principais metástases ocorrem no pulmão e no fígado.
- D) patologicamente, no tumor de Wilms clássico, encontram-se os três componentes embrionários – blastematoso, estromal e epitelial.

QUESTÃO 69

Com relação ao neuroblastoma, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É o tumor sólido mais comum na criança.
- B) Pode iniciar-se em qualquer tecido originário da crista neural do embrião.
- C) O sítio mais comum são os gânglios paraespinhais no retroperitônio.
- D) No estágio IVS, a lesão está confinada ao local de origem e com metástases limitadas ao fígado, pele e medula óssea, e em crianças com menos de 1 ano de vida.

QUESTÃO 70

Sobre o neuroblastoma, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a classificação histológica mais utilizada é a de Shimada modificada.
- B) a amplificação de N-MYC (≥ 10 cópias) relaciona-se a um bom prognóstico.
- C) crianças com menos de 18 meses apresentam melhor prognóstico.
- D) crianças com tumores cervicais, pélvicos e mediastinais apresentam melhor prognóstico que crianças com tumores retroperitoniais.

QUESTÃO 71

Analise a situação clínica a seguir.

Recém-nascido apresenta ultrassonografia pré-natal que mostrou uretero-hidronefrose bilateral.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais** provável para essa situação.

- A) Estenose de junção ureteropélvica bilateral.
- B) Estenose de junção ureterovesical bilateral.
- C) Válvula de uretra posterior.
- D) Refluxo vesicoureteral primário bilateral.

QUESTÃO 72

Considere a situação clínica a seguir.

Recém-nascido apresenta-se com hipospádia médio peniana e encurvamento ventral leve.

Nessa situação, assinale a alternativa que apresenta a melhor idade para se programar o tratamento cirúrgico.

- A) Entre 6 e 9 meses de vida.
- B) Entre 18 e 24 meses de vida.
- C) Entre 24 e 36 meses de vida.
- D) Após 36 meses de vida.

QUESTÃO 73

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente apresenta-se com 2 anos e 6 meses de vida e evolui com infecção urinária bem documentada. Não há outras alterações clínicas. Ultrassonografia das vias urinárias mostra bexiga com capacidade bem aumentada para a idade, sendo que ureteres estão com calibres normais e não há hidronefrose.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais** provável.

- A) Bexiga neuropática
- B) Disfunção miccional
- C) Refluxo vesicoureteral
- D) Válvula de uretra posterior

QUESTÃO 74

Analise o caso clínico a seguir.

Recém-nascido apresenta-se com genitália ambígua. Palpa-se uma das gônadas na genitália, mas a outra não é palpável.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais** provável.

- A) Hiperplasia congênita de suprarenal.
- B) Insensibilidade periférica a testosterona.
- C) Disgenesia gonadal.
- D) Desordem do desenvolvimento sexual (DDS) ovotestis.

QUESTÃO 75

Analise a situação clínica a seguir.

Paciente do sexo masculino apresenta-se com hipospádia escrotal.

Nessa situação, assinale a alternativa que apresenta a técnica **mais** adequada para o tratamento cirúrgico.

- A) MAGPI
- B) Snodgrass
- C) Koff
- D) Bracka

QUESTÃO 76

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, 2 anos de vida, apresenta-se com megaureter primário obstrutivo à direita. Na sequência de ultrassonografias, ocorre piora lenta, mas progressiva, da dilatação do ureter e afilamento do parênquima renal. A despeito de uso adequado de antibioticoprofilaxia, houve duas infecções urinárias recentes.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta a conduta que **não** deve ser adotada.

- A) Conduta expectante.
- B) Dilatação endoscópica da junção ureterovesical.
- C) Ureterovesicostomia.
- D) Reimplante ureteral pela técnica de Hendren.

QUESTÃO 77

Analise a situação clínica a seguir.

Paciente do sexo masculino nasceu com criptorquia, com testículo não palpável à esquerda. É reavaliado aos 6 meses de vida e continua com o mesmo testículo não palpável.

Nessa situação, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Reavaliar por volta dos 12 meses de vida.
- B) Reavaliar por volta dos 24 meses de vida.
- C) Solicitar ultrassonografia pélvica.
- D) Tratamento cirúrgico com uso de laparoscopia.

QUESTÃO 78

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino de 1 ano de vida apresenta-se com síndrome de *Prune Belly*. A ultrassonografia das vias urinárias mostra grave dilatação da via urinária bilateral. Há boa função renal. Não houve história de infecção urinária, dilatação e uretero-hidronefrose (bilateral) estão estabilizadas.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Conservadora.
- B) Reimplante ureteral pela técnica de Hendren.
- C) Injeção endoscópica de polímero antirrefluxo.
- D) Derivação urinária.

QUESTÃO 79

Analise o caso clínico a seguir.

Recém-nascido apresenta-se com extrofia vesical.

Nesse caso, assinale a alternativa que indica o **melhor** momento para fechar a placa vesical.

- A) Nas primeiras 72 horas.
- B) No período neonatal, porém após 72 horas.
- C) Entre 1 e 2 meses de vida.
- D) A partir de 6 meses de vida.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**