

## MEDICINA INTENSIVA

### LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 – Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
- 2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
- 3 – Ao receber a **Folha de Respostas**:
  - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
  - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4 – **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

### ATENÇÃO:

**FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

5 – Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01  A  B  C  D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02  A  B  C  D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03  A  B  C  D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04  A  B  C  D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

**NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**ATENÇÃO:** Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (**alíneas a, b, d, h e m**).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico <[www.gestaodeconcursos.com.br](http://www.gestaodeconcursos.com.br)> no dia 19 de outubro de 2015.

**DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS**

# ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **79 (setenta e nove) questões de múltipla escolha** com **4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão**, assim distribuídas: **BLOCO A**: 5 (cinco) questões de **Cooperativismo**, 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria**, 8 (oito) questões de **Saúde Pública e Saúde Suplementar**; **BLOCO B**: 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

## BLOCO A

### COOPERATIVISMO

#### QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de médicos, organizadas no formato societário de cooperativas de trabalho médico.
- B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro grau ou singular do Sistema Unimed.
- C) A entidade médica que liderou a formação da Mediminas, que posteriormente passou a ser denominada Unimed BH, foi o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.
- D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

#### QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A instância máxima de deliberação em uma cooperativa é a Assembleia Geral dos Associados.
- B) O associado poderá ser eliminado da sociedade por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.
- C) A demissão do cooperado – saída voluntária da cooperativa – poderá ser impedida pelos órgãos da administração, caso o trabalho desse cooperado seja indispensável ao bom funcionamento da cooperativa.
- D) A prestação de contas da administração da cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária realizada no primeiro trimestre de cada ano.

#### QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a organização do setor no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa são democraticamente eleitos pelos associados e funcionários da cooperativa.
- B) A solidariedade, a democracia e a equidade são princípios universais do cooperativismo.
- C) Os fundos de investimento estão impedidos de adquirir parte do capital das cooperativas, ainda que de forma minoritária.
- D) A Confederação Nacional do Cooperativismo (CENCOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) são entidades do cooperativismo brasileiro que compõem o sistema OCB.

#### QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra os seguintes princípios universais do cooperativismo **EXCETO**:

- A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.
- B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.
- C) As cooperativas são sociedades de pessoas; sociedades essas não sujeitas à falência.
- D) As quotas-partes do capital da sociedade podem ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

#### QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado por cooperativas singulares, por federações estaduais ou regionais e por uma confederação denominada Unimed do Brasil.
- B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de Cooperados, possui uma Assembleia Geral de Delegados formada por associados eleitos dentro das especialidades médicas.
- C) O Conselho Social da Unimed BH possui função consultiva, discute as macropolíticas e as estratégias da Cooperativa e é formado por delegados, conselheiros e membros do Núcleo de Integração com Cooperados.
- D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde Suplementar no Brasil e estabelece regras para os planos privados de assistência à saúde, exceto para as cooperativas que devem observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).

### CIRURGIA GERAL

#### QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Homens com menos de 40 anos de idade, assintomáticos e sem comorbidades, que irão ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem previsão de sangramento, não necessitam de nenhum exame complementar pré-operatório.
- B) A história clínica constitui meio mais efetivo para diagnosticar fatores de risco associados a doenças coexistentes do que o exame físico e os exames complementares.
- C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos os sexos.
- D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a realização pré-operatória de ureia / creatinina, dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.

### QUESTÃO 7

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os macrófagos apresentam mobilização mais rápida em direção à área traumatizada do que os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais curto.
- B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por diversos mecanismos, destacando-se a liberação de enzimas proteolíticas, como as elastases.
- C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de células e pode mediar a vasodilatação e regular o tônus vascular.
- D) As proteínas reactantes da fase aguda são produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na tentativa de manter a homeostasia.

### QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à proliferação de células endoteliais.
- B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da permeabilidade vascular, mediada, entre outras, pela serotonina e histamina.
- C) Os leucócitos têm importante papel na remoção de detritos celulares e de bactérias do leito da lesão.
- D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que são responsáveis pela produção de interleucina 1.

### QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de hipotensão sem taquicardia concomitante é sinal sugestivo de choque neurogênico.
- B) É característica do choque cardiogênico a redução da perfusão tecidual com volemia adequada.
- C) Gasometria arterial inalterada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo por embolia pulmonar.
- D) São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio, dissecação aguda da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo.

### CLÍNICA MÉDICA

### QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

- I. A associação de lesões aftosas na boca com lesões anais e perianais pode sugerir a presença da doença de Crohn.
- II. É a manifestação clínica que mais frequentemente se associa a doenças do intestino delgado.
- III. Quando a origem é o intestino delgado, as dejeções são pequenas, com número diário muito aumentado, frequentemente com muco, pus e sangue.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

### QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa que **NÃO** é considerada causa dessa doença.

- A) Cirurgia abdominal
- B) Hiperlipidemia
- C) Hipocalcemia
- D) Trauma abdominal contuso

### QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames complementares e as doenças ou situações que afetam o aparelho respiratório.

#### COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina
2. Dímero D
3. Dosagem de cloro no suor
4. Espirometria
5. Ultrassonografia

#### COLUNA II

- ( ) Asma
- ( ) Derrame pleural
- ( ) Embolia pulmonar
- ( ) Enfisema pulmonar
- ( ) Mucoviscidose

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 5 2 1 3
- B) 1 5 3 4 2
- C) 3 1 2 5 4
- D) 5 4 3 1 2

### QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes patológicos, apresenta há várias semanas parestesias nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Anemia falciforme
- B) Anemia perniciosa
- C) Esclerose múltipla
- D) Talassemia

### GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

#### QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, halo perinuclear e multinucleação.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Infecção por papilomavírus humano
- B) Cervicite crônica bacteriana
- C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
- D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

#### QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é recorrente. No momento, não apresenta queixas nem sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta: PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m<sup>2</sup>; mamas e exame ginecológico sem alterações.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a conduta a ser adotada.

- A) Solicitar exames complementares de rotina, como mamografia e ultrassonografia, e manter terapia hormonal até o resultado dos exames.
- B) Manter a terapia hormonal, independentemente dos resultados dos exames, pois a paciente teve diagnóstico de menopausa recentemente.
- C) Orientar a paciente sobre os riscos cardiovasculares da terapia hormonal e suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.
- D) Suspender a terapia hormonal e solicitar ultrassonografia transvaginal de urgência e, somente depois do resultado desse exame, discutir a possibilidade de retorno.

### QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com 36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa (1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos cardíofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 2,0 cm.

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e indicar resolução da gestação.
- B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e recomendar controle materno-fetal.
- C) Prescrever Nifedipina via oral associada à Alfametildopa e recomendar controle materno-fetal.
- D) Pedir exames para avaliação da função renal e hepática e recomendar controle materno-fetal.

### QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação e o último hemograma apresentou hemoglobina de 11 g/dL, em exame de rotina pré-natal.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Realizar coleta seriada de hemograma e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter orientação dietética considerando o estilo de vida da paciente.
- D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

### PEDIATRIA

#### QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até:

- A) 4 meses.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 24 meses.

### QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é **CORRETO** afirmar:

- A) Apesar da simplicidade da utilização da antropometria, a falta de uma curva nacional fez com que o Ministério da Saúde contraindicasse a sua utilização em saúde pública.
- B) Para avaliar o crescimento, a medida da altura é mais importante que a do peso, devido à facilidade de sua obtenção.
- C) A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas de percentil porque são mais fidedignas que as que utilizam escore z.
- D) O acompanhamento da medida de peso e sua localização em um gráfico é uma importante forma de avaliar o crescimento de uma criança.

### QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda e com desidratação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar com hidratação endovenosa.
- B) A prescrição de antibióticos é necessária porque a maioria das diarreias agudas é de origem bacteriana.
- C) Na desidratação leve e moderada, na qual não há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação com terapia de reidratação oral.
- D) Em uma criança com diarreia e desidratada, e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

### QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é **CORRETO** afirmar que:

- A) todas as crianças após o diagnóstico de pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.
- B) as pneumonias virais são muito raras, por isso, a utilização de antibióticos é tão importante numa criança com quadro respiratório.
- C) a droga de escolha para o tratamento da pneumonia na comunidade é a Penicilina Benzatina, pelo seu baixo custo.
- D) a Amoxicilina é utilizada para tratamento da maioria das pneumonias bacterianas.

## SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

### QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.
- C) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- D) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.

### QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.

Região / ano	2010	2011	2012	2013
Norte	5.289	5.093	5.113	5.163
Nordeste	13.197	3.006	12.527	12.717
Sudeste	4.120	14.172	4.114	13.748
Sul	4.220	4.395	4.238	4.141
Centro-Oeste	3.044	3.050	3.131	3.197
Total	39.870	39.716	39.123	38.966

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É necessário conhecer a estimativa populacional para cada ano (número de óbitos / população x 1 000).
- B) É necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos vivos x 1 000).
- C) É necessário multiplicar o número de óbitos por 100, já que se trata de uma porcentagem (número de óbitos x 100).
- D) É necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em crianças de 0-7 dias).



#### QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em desenvolvimento vêm apresentando graves problemas relacionados à escassez de recursos financeiros, decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento das questões relativas à incorporação tecnológica desordenada.

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estratégias de enfrentamento incluem avaliações de eficácia / efetividade e custo das tecnologias em saúde.
- II. A avaliação de tecnologias em saúde não influencia a decisão clínica, visto que esta é uma decisão individual.
- III. A avaliação de tecnologias opera somente no campo de saúde pública, uma vez que, no sistema privado, o custo não é um fator limitante para a obtenção de produtos em saúde.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

#### QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se elevado número de estabelecimentos de saúde privados no Brasil.

De acordo com a Constituição Federal, de que forma ocorre a participação do sistema de saúde privado?

- A) Complementar ao SUS.
- B) Opcional para o SUS.
- C) Compulsório para cidadãos com alto poder aquisitivo.
- D) Obrigatório para empresas.

#### QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas em prazos pré-estabelecidos.

Sobre esses prazos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 7 (sete) dias úteis.
- B) Consulta nas especialidades médicas (nefrologista, pneumologista, ortopedista): em até 14 (quatorze) dias úteis.
- C) Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis.
- D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias úteis.

#### QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-referência de assistência à saúde deve contemplar os seguintes procedimentos, **EXCETO**:

- A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar
- B) Centro de terapia intensiva
- C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental
- D) Tratamento antineoplásico

#### QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) "a cobrança feita aos beneficiários de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas indevidas".

Disponível em: < <http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf> >.  
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa afirmativa se baseia.

- A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 (Integralidade das ações em saúde)
- B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição do plano-referência de assistência à saúde)
- C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 2013 (Dos princípios de atenção à saúde na saúde suplementar)
- D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 2006 (Das infrações a que estão submetidos os planos privados de assistência à saúde)

#### QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Centrar ações no cuidado médico para evitar falta de integração no cuidado ao paciente.
- B) Incorporar de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal.
- C) Usar a epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde.
- D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando o aumento de sua autonomia.

## MEDICINA INTENSIVA

## QUESTÃO 30

São causas de acidose metabólica com ânion gap aumentado, **EXCETO**:

- A) Intoxicação exógena por metanol
- B) Acidose láctica
- C) Uso de inibidor da anidrase carbônica
- D) Rabdomiólise

## QUESTÃO 31

Em relação à injúria renal aguda (I.R.A.), uma entidade clínica frequente no centro de tratamento intensivo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As medidas preventivas, como a restauração da volemia e dos níveis pressóricos, assim como a não exposição a drogas nefrotóxicas, são importantes para se evitar injúria renal adicional.
- B) Os seguintes índices urinários sugerem etiologia pré-renal: sódio urinário inferior a 10-20 mEq/L, fração de excreção do sódio (FeNa) menor que 1%, fração de excreção da ureia maior que 35% e osmolalidade urinária superior a 500 mOsm/L.
- C) O uso da Dopamina em dose dopaminérgica no paciente crítico não se mostrou eficaz na prevenção da I.R.A.
- D) A taxa de mortalidade ainda permanece elevada, apesar de todos os avanços do tratamento dialítico, refletindo a gravidade da doença de base.

## QUESTÃO 32

A hiperpotassemia é frequente em pacientes internados no centro de terapia intensiva.

Entre os tratamentos da hiperpotassemia, assinale o que promove a redução do nível dos potássios sérico e corporal totais.

- A) Resina de troca iônica, diurético de alça e hidratação venosa.
- B) Resina de troca iônica, bicarbonato de sódio e B-2 inalatório.
- C) Infusão de glicose e insulina, bicarbonato de sódio e diurético de alça.
- D) Hemodiálise, bicarbonato de sódio e gluconato de cálcio.

## QUESTÃO 33

Nos pacientes críticos, são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da úlcera de estresse e que requerem indicação de tratamento profilático específico, **EXCETO**:

- A) Ventilação mecânica há mais de 48 horas.
- B) Coagulopatia definida por contagem plaquetária inferior a  $50\ 000/\text{mm}^3$ , R.N.I. superior a 1,5 ou TTPa superior a duas vezes o valor de referência.
- C) Passado de úlcera gastroduodenal com sangramento digestivo alto agudo no último ano.
- D) Insuficiência renal crônica.

## QUESTÃO 34

Em relação à curva da dissociação da oxí-hemoglobina, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A hipotermia é vantajosa, uma vez que desvia a curva para a esquerda.
- B) A acidose metabólica promove maior liberação de oxigênio para o tecido periférico.
- C) A transfusão de glóbulos vermelhos induz a uma queda do 2,3 difosfoglicerato, desviando a curva para a direita.
- D) A elevação do 2,3 difosfoglicerato desvia a curva para a esquerda, promovendo maior afinidade do oxigênio pela hemoglobina.

## QUESTÃO 35

Em relação às anemias e às coagulopatias nos doentes críticos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A trombocitopenia induzida pela heparina tipo II acomete 1-3% dos indivíduos em uso de heparina não fracionada, estando associada a eventos trombóticos em 30-80% dos casos, a maioria em território venoso.
- B) Os pacientes com disfunção hepática e alteração dos tempos de coagulação devem receber transfusão com plasma fresco congelado para profilaxia de sangramentos.
- C) Geralmente, indica-se a transfusão de glóbulos vermelhos nos pacientes críticos estáveis, sem sinais de sangramento ativo, quando os níveis de hemoglobina caem para cifras inferiores a 7 g/dL.
- D) Pacientes com contagem plaquetária inferior a  $50\ 000/\text{mm}^3$  e sangramento ativo devem receber transfusão de plaquetas.



### QUESTÃO 36

São situações clínicas que podem ser causas de choque obstrutivo, **EXCETO**:

- A) Aneurisma dissecante da aorta
- B) Pneumotórax hipertensivo
- C) Coma mixedematoso
- D) Tromboembolismo pulmonar maciço

### QUESTÃO 37

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente portador de hipertensão arterial sistêmica e *diabetes mellitus* de longa data é atendido no pronto-socorro com quadro de hiporexia, náuseas, vômitos, confusão mental e oligúria há 5 dias. Realizado eletrocardiograma, que revelou alargamento do complexo QRS.

Diante desse caso, assinale a alternativa que apresenta o tratamento de primeira escolha a ser adotado.

- A) Bicarbonato de sódio
- B) B-2 inalatório
- C) Solução polarizante
- D) Gluconato de cálcio

### QUESTÃO 38

Analise a gasometria arterial a seguir.

pH: 7,22; PaCO<sub>2</sub>: 55 mmHg; PaO<sub>2</sub>: 56 mmHg; Bicarbonato: 18 mEq/L; BE: -12 e SO<sub>2</sub>: 85%.

Considerando esses valores, assinale o distúrbio ácido-base e respiratório **CORRETO**.

- A) Acidose respiratória em fase de compensação e hipoxemia.
- B) Acidose metabólica descompensada e hipoxemia.
- C) Acidose respiratória descompensada e hipoxemia.
- D) Acidose metabólica e respiratória descompensadas e hipoxemia.

### QUESTÃO 39

A hipoxemia pode ser causada por mecanismos fisiopatológicos diversos.

Com relação a esses mecanismos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A baixa pressão parcial do oxigênio inspirado pode levar à hipoxemia.
- B) A hipoventilação pode resultar em hipercapnia.
- C) O distúrbio de ventilação/ perfusão pode levar à hipoxemia e à hipercapnia.
- D) A baixa pressão parcial do CO<sub>2</sub> inspirado pode ser um importante distúrbio fisiopatológico.

### QUESTÃO 40

Com relação à insuficiência respiratória, o cálculo do gradiente alvéolo-arterial pode ser útil no diagnóstico diferencial das causas de insuficiência respiratória.

São causas de hipercapnia com gradiente alvéolo-arterial normal, **EXCETO**:

- A) Síndrome da hipoventilação do obeso
- B) Depressão do centro respiratório por drogas
- C) Doença pulmonar obstrutiva crônica
- D) Estenose traqueal

### QUESTÃO 41

São causas de alcalose respiratória, **EXCETO**:

- A) Hipoventilação na ventilação mecânica
- B) Excesso de hormônio tireoidiano
- C) Embolia pulmonar
- D) Gravidez

### QUESTÃO 42

Em paciente internado no centro de terapia intensiva, a presença de candidúria é considerada frequente.

Com relação ao manuseio da candidúria, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Uma cultura quantitativa maior que 1 000 UFC/ml é considerada significativa para o diagnóstico de infecção urinária por *Candida*, em pacientes sem sonda vesical de demora.
- B) O achado de bola fúngica é considerado significativo para o diagnóstico de infecção urinária por *Candida*.
- C) O tratamento de infecção secundária a *Candida spp* por 5 a 7 dias é considerado suficiente.
- D) A irrigação vesical com anfotericina B é considerada um tratamento viável para pacientes sem candidíase disseminada.

### QUESTÃO 43

Em relação à hipertensão intracraniana e seu manejo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A hipertensão intracraniana leva à redução do nível de consciência.
- B) Massas cerebrais podem causar hipertensão intracraniana e herniação cerebral.
- C) Elevação da cabeça, manitol e solução salina hipertônica podem ser usados no tratamento da hipertensão intracraniana.
- D) O desenvolvimento de papiledema geralmente é precoce, ficando evidente após alguns minutos de hipertensão intracraniana.

#### QUESTÃO 44

Sobre a abordagem clínica inicial do paciente neurológico, o diagnóstico diferencial possível do paciente com redução do nível de consciência pode ser realizado tendo em vista a avaliação dos sintomas e dos sinais presentes no quadro clínico.

São diagnósticos do paciente com redução no nível de consciência, **EXCETO**:

- A) Redução do nível de consciência associado com hemiparesia: tumor cerebral.
- B) Redução do nível de consciência associado com sinais de irritação meníngea: hemorragia subaracnoidea.
- C) Redução do nível de consciência sem sinais motores unilaterais e de irritação meníngea: intoxicação por monóxido de carbono.
- D) Redução do nível de consciência associado com sinais de irritação meníngea: abscesso cerebral.

#### QUESTÃO 45

Com relação à síndrome de Guillain-Barré, são consideradas características clínicas e laboratoriais, **EXCETO**:

- A) Hiperreflexia
- B) Fraqueza muscular rapidamente progressiva
- C) Disfunção autonômica
- D) Líquido cérebro espinhal acelular

#### QUESTÃO 46

O transplante de fígado é indicado para uma série de doenças agudas e crônicas.

São indicações de transplante hepático, **EXCETO**:

- A) Fibrose cística
- B) Falência hepática fulminante
- C) Esquistossomose hepatoesplênica
- D) Doença hepática etílica

#### QUESTÃO 47

Em relação às intoxicações, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Chama-se de toxíndrome a síndrome clínica que envolve múltiplos sistemas fisiológicos e facilita a identificação de um agente de intoxicação.
- B) Agitação, midríase, hipertensão, hipertermia e taquicardia são características da toxíndrome simpaticomimética.
- C) Salivação, lacrimejamento e cólicas gastrointestinais são características da toxíndrome colinérgica.
- D) Miose, bradicardia e diarreia são características da toxíndrome anticolinérgica.

#### QUESTÃO 48

Considere o caso clínico a seguir.

Um paciente de 80 anos de idade, acamado por seqüela de AVC, foi admitido no CTI com história de tosse com expectoração, febre e prostração importante. Apresentou uma redução na ingesta alimentar devido à dificuldade de deglutição. O paciente foi avaliado pela equipe do CTI e indicado suporte nutricional.

Com relação ao suporte nutricional indicado para esse paciente, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O suporte nutricional enteral é preferido ao parenteral.
- B) A presença de ausculta sugestiva de peristaltismo intestinal é necessária para início do suporte nutricional enteral.
- C) Protocolos que promovem um controle da glicemia nos pacientes com suporte nutricional são recomendados.
- D) Fórmulas de dieta enteral que contêm moduladores imunológicos devem ser usadas com cuidado em pacientes com sepses grave.

#### QUESTÃO 49

Com relação ao suporte nutricional, assinale a alternativa que apresenta uma indicação **INCORRETA** para um paciente crítico.

- A) A dosagem do fósforo é recomendada.
- B) Na ausência de calorimetria indireta, os pacientes do CTI devem receber 25 Kcal/Kg/dia.
- C) Quando existir indicação de nutrição parenteral, a suplementação de glutamina não está indicada.
- D) No paciente crítico, o aporte de calorias deve ser o mais próximo do consumo estimado do paciente, com o objetivo de minimizar o balanço negativo.

#### QUESTÃO 50

São ocorrências na síndrome da "superalimentação" (*overfeeding*), **EXCETO**:

- A) Hipermetabolismo
- B) Hiperglicemia
- C) Hipercapnia
- D) Hiperfosfatemia

#### QUESTÃO 51

São características da insuficiência renal pré-renal, **EXCETO**:

- A) Concentração urinária de sódio < 10 mEq/L
- B) Osmolaridade urinária alta
- C) Fração de excreção de sódio > 1%
- D) Aumento da reabsorção renal de sódio

### QUESTÃO 52

No paciente intensivo, o quadro de anafilaxia e consequente choque apresenta tratamento e condutas específicas.

Com relação ao tratamento da anafilaxia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O uso de adrenalina 0,2 a 0,5 ml a cada 1-3 minutos até um total de 03 doses está indicado para o tratamento.
- B) Intubação orotraqueal para os quadros de insuficiência respiratória está indicado.
- C) O uso de Ranitidina não está indicado.
- D) Difenidramina 1,25 mg/Kg está indicada para o tratamento.

### QUESTÃO 53

No paciente intensivo, o quadro de *Delirium* é muito frequente.

São causas de *Delirium*, **EXCETO**:

- A) Encefalopatia hipertensiva
- B) Hiperparatireoidismo e hipoparatireoidismo
- C) Deficiência de vitamina B12
- D) Aumento dos níveis de tiamina

### QUESTÃO 54

No tratamento dos quadros de intoxicação exógena, em alguns casos está indicado o uso de antídotos.

Com relação ao uso de antídotos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Intoxicação por bloqueador de canal de cálcio: uso de Atropina como antídoto.
- B) Intoxicação por Benzodiazepínico: uso de Flumazenil como antídoto.
- C) Intoxicação por Acetaminofem: uso de n-acetilcisteína como antídoto.
- D) Intoxicação por ferro: uso de Deferoxamina como antídoto.

### QUESTÃO 55

Em relação à sedação e analgesia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Propofol é indicado para prover sedação e analgesia.
- B) A Ketamina aumenta o consumo de oxigênio pelo miocárdio.
- C) A Morfina pode causar náuseas, vômitos e reduzir a motilidade intestinal.
- D) O Midazolam causa amnésia anterógrada.

### QUESTÃO 56

Em relação às doenças pleurais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os derrames pleurais são mais comumente decorrentes de doenças pulmonares, mas também podem ser decorrentes de doenças do trato gastrointestinal.
- B) Edema pulmonar unilateral pode ser uma complicação de toracocentese terapêutica.
- C) Pacientes com pneumotórax espontâneo primário apresentam diminuição da capacidade vital e do gradiente artério-alveolar  $P(A-a)O_2$ .
- D) No paciente em ventilação mecânica, redução ipsilateral dos sons pulmonares, efisema subcutâneo, taquicardia e hipotensão são sinais de pneumotórax hipertensivo.

### QUESTÃO 57

Em relação à insuficiência renal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Aumento de ureia pode ocorrer na ausência de redução da taxa de filtração glomerular em casos de sangramento gastrointestinal e hipercatabolismo.
- B) O uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINE) no paciente hipovolêmico pode levar à insuficiência renal, pois estimula a liberação de prostaglandinas, reduzindo o tônus da arteríola glomerular aferente.
- C) Obstrução ureteral pode causar insuficiência renal pós-renal.
- D) Hipoalbuminemia, cirrose hepática e insuficiência cardíaca de ventrículo esquerdo podem ser causas de insuficiência renal pré-renal.

### QUESTÃO 58

Em relação ao manejo do paciente febril, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Vasculites, pancreatite e grandes hematomas podem ser causas não infecciosas de febre.
- B) A temperatura retal é cerca de 0,3 a 0,4 graus Celsius maior que a temperatura oral simultânea.
- C) Os termômetros timpânicos devem ser propriamente posicionados no canal auditivo externo para a aferição da temperatura.
- D) Medidas de temperatura axilar são confiáveis, sendo o método mais fidedigno de aferir a temperatura central dos pacientes internados em unidades de tratamento intensivo.

### QUESTÃO 59

Em relação ao tétano, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O tétano é causado pelo *Clostridium tetani*, que produz a neurotoxina tetanospamina.
- B) A neurotoxina tetânica bloqueia a liberação de neurotransmissores que inibem a transmissão dos impulsos do nervo motor.
- C) A forma clínica mais comum de apresentação do tétano é a localizada, que se caracteriza pela contração de grupos musculares próximos ao sítio de inoculação.
- D) Na apresentação clínica de tétano cefálico há, tipicamente, envolvimento de nervos cranianos, especialmente o VII par.

### QUESTÃO 60

Em relação aos derrames pleurais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O transudato tem as seguintes características, conforme os critérios de *Light*: lactato desidrogenase (LDH) no líquido pleural menor que dois terços da LDH sérica, uma razão da LDH pleural para sérica menor que 0,6 e uma razão da proteína pleural para sérica maior que 0,5.
- B) De maneira geral, quando um transudato é identificado, testes adicionais no fluido pleural não são necessários.
- C) O transudato pode ser causado por alterações de pressão hidrostática ou oncótica.
- D) O exsudato pode ser causado por acometimento inflamatório do pulmão ou pleura.

### QUESTÃO 61

Em relação às drogas vasoativas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Taquicardia e taquiarritmias estão entre os efeitos adversos da Dopamina.
- B) A Noradrenalina é um potente agonista alfa-1 adrenérgico, sem efeito beta-adrenérgico.
- C) A Epinefrina é um potente agonista não seletivo dos receptores alfa-adrenérgicos e beta-adrenérgicos.
- D) A Fenilefrina é uma amina simpaticomimética sintética que estimula seletivamente os receptores alfa-1 adrenérgicos.

### QUESTÃO 62

Sobre a escala de coma de Glasgow, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Localiza a dor: ganha 4 pontos.
- B) Abertura ocular espontânea: ganha 4 pontos.
- C) Ausência de resposta verbal: ganha 1 ponto.
- D) Sons incompreensíveis de resposta verbal: ganha 2 pontos.

### QUESTÃO 63

Em relação à insuficiência cardíaca, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Níveis plasmáticos de Norepinefrina e o peptídeo natriurético do tipo B (BNP) são preditores prognósticos na insuficiência cardíaca crônica.
- B) Os diuréticos são usados para o controle de sintomas congestivos na insuficiência cardíaca, mas não melhoram a mortalidade.
- C) O Carvedilol está associado à redução de mortalidade na insuficiência cardíaca.
- D) O uso de Digoxina na insuficiência cardíaca está associado à melhor tolerância a exercícios, redução de hospitalizações e redução da mortalidade.

### QUESTÃO 64

Em relação à estenose aórtica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Aproximadamente 25% das valvopatias cardíacas são devidas a estenose aórtica com aproximadamente 80% dos casos sintomáticos ocorrendo em adultos do sexo feminino.
- B) A área valvar menor que 1,0 cm<sup>2</sup> é um sinal ecocardiográfico de gravidade na estenose aórtica.
- C) Os sintomas típicos da estenose aórtica são dispneia, angina e síncope.
- D) Na estenose aórtica, o pulso arterial corotídeo eleva-se lentamente e tem um pico tardio ao exame físico.

### QUESTÃO 65

Em relação às taquicardias ventriculares, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A taquicardia ventricular (TV) é definida como uma taquicardia de QRS largo de 3 ou mais batimentos consecutivos com frequência maior que 100 por minuto.
- B) Taquicardia supraventricular com condução aberrante é um diagnóstico diferencial de taquicardia ventricular (TV) ao eletrocardiograma.
- C) A torsades de pointes é um tipo de taquicardia ventricular polimórfica associada à redução do intervalo QT.
- D) Uma taquicardia ventricular (TV) pode apresentar-se clinicamente com estabilidade hemodinâmica, com instabilidade hemodinâmica ou sem pulso.

### QUESTÃO 66

Em relação às taquicardias supraventriculares, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A fibrilação atrial é comum em pós-operatório de cirurgia cardíaca, sobretudo em cirurgias valvares combinadas com revascularização.
- B) No flutter, a atividade atrial tem uma morfologia característica descrita como “dente de serra” com uma frequência atrial em torno de 240 a 320 batimentos por minuto.
- C) A taquicardia atrial multifocal caracteriza-se por pelo menos 3 morfologias diferentes da onda P em uma mesma derivação com intervalo PR variável.
- D) Assim como na fibrilação atrial, no flutter é comum a recorrência imediata da arritmia após uma cardioversão elétrica bem sucedida, motivo pelo qual um antiarrítmico deve ser iniciado.

### QUESTÃO 67

Em relação à síndrome hepatorenal (SHR), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O mecanismo primário da síndrome hepatorenal é uma intensa vasoconstrição renal.
- B) A síndrome hepatorenal do tipo II tem melhor prognóstico que a do tipo I.
- C) Na síndrome hepatorenal do tipo I, o paciente geralmente apresenta hipernatremia, ascite e sódio urinário > 20 mEq/L.
- D) A síndrome hepatorenal pode ser precipitada por peritonite bacteriana espontânea e sangramento gastrointestinal.

### QUESTÃO 68

Em relação à esclerose sistêmica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É uma doença imunomediada, caracterizada por fibrose progressiva, com acometimento de pele, coração, pulmão, rins e trato gastrointestinal.
- B) O acometimento pulmonar caracteriza-se por um padrão restritivo, associado à fibrose da parede pulmonar, diafragma e pleura.
- C) O fenômeno de Raynaud secundário à doença pode levar à ulceração digital ou até gangrena.
- D) O acometimento gastrointestinal é raro, ocorrendo em menos de 15% dos casos.

### QUESTÃO 69

Em relação à intubação orotraqueal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A manobra de Sellick pode prevenir a regurgitação de conteúdo gástrico para a traqueia durante a intubação orotraqueal.
- B) O laringoscópio deve ser manuseado com a mão direita e sua lâmina inserida do lado esquerdo da boca, sendo, então, avançado até a base da língua, deslocando-a para a direita.
- C) Considerando-se a classificação de Cormack-Lehane, apenas a epiglote é vista à laringoscopia por visão direta no grau III.
- D) Laceração de traqueia e lesão em dentes são exemplos de complicações de intubação orotraqueal.

### QUESTÃO 70

Em relação aos cateteres venosos centrais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Nutrição parenteral total e monitorização da saturação de oxigênio venoso central são indicações para um cateter venoso central.
- B) O ultrassom pode ser usado para a obtenção de acesso venoso central em múltiplos sítios.
- C) Um cateter venoso central, que é longo e está dentro de uma veia mais calibrosa, infunde volume mais rapidamente que cateteres periféricos, que são mais curtos e têm maior diâmetro.
- D) O posicionamento adequado do cateter central é muito importante, sendo que devemos evitar que sua ponta fique localizada dentro do átrio ou ventrículo direitos.

### QUESTÃO 71

Em relação à punção da veia jugular interna, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O paciente deve ser colocado na posição de Trendelenburg para a punção.
- B) A ponta da agulha de punção deve ser inserida na base do triângulo formado entre os braços do músculo esternocleidomastoideo e a clavícula.
- C) Em caso de resistência à inserção do fio guia, uma leve rotação desse fio pode facilitar a passagem, porém, manipulação excessiva e aplicação de força devem ser evitadas.
- D) Durante a inserção do cateter pelo fio guia, deve-se assegurar o controle, proximal ou distal, desse fio durante todo o tempo, a fim de se evitar embolia deste.



### QUESTÃO 72

Em relação ao desenvolvimento de febre em paciente com acesso venoso central, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A ausência de sinais flogísticos no sítio de inserção do cateter exclui a possibilidade de infecção pelo cateter.
- B) Os pacientes com cateter venoso central frequentemente desenvolvem febre.
- C) Os hospitais devem ter protocolos para manejo do paciente febril com cateter venoso central.
- D) No paciente febril, o cateter venoso central deve ser retirado, em caso de sinais de infecção no sítio de inserção deste.

### QUESTÃO 73

Em relação ao estabelecimento de linhas arteriais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Monitorização hemodinâmica e necessidade de múltiplas coletas de sangue arterial são indicações de canulação arterial.
- B) Bolhas de ar no cateter do sistema de monitorização de uma linha arterial manifestam-se por uma curva hiperaguda ao monitor (*underdamping*).
- C) O posicionamento em dorsoflexão de 30 a 60 graus da mão facilita o cateterismo da artéria radial.
- D) A avaliação frequente da perfusão da mão é importante para se prevenir isquemia em pacientes com cateter em artéria radial.

### QUESTÃO 74

Em relação ao uso de marca-passo cardíaco, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Bradiarritmias sintomáticas são causas comum de indicação do uso de marca-passo cardíaco.
- B) O marca-passo cardíaco temporário pode ser usado para interromper taquiarritmias supraventriculares e ventriculares.
- C) O bloqueio atrioventricular idiopático de terceiro grau sintomático é uma indicação do uso de marca-passo temporário.
- D) O marca-passo transcutâneo tem pás adesivas e deve gerar correntes menores que o marca-passo transvenoso para seu correto funcionamento, uma vez que correntes maiores podem causar dor e queimaduras na pele.

### QUESTÃO 75

Em relação à cardioversão elétrica e desfibrilação, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As pás devem ser colocadas no tórax em posição anterolateral, sendo contraindicada a posição anteroposterior.
- B) A forma de onda bifásica tem como vantagem um menor limiar de desfibrilação.
- C) No paciente alerta, devemos prover sedo-analgesia antes de uma cardioversão elétrica.
- D) No momento da aplicação da carga elétrica, todos os envolvidos devem se afastar para evitar o contato acidental com o paciente.

### QUESTÃO 76

Em relação às complicações da cardioversão elétrica e desfibrilação, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Ocasionalmente, observa-se elevação transitória do segmento ST em registros eletrocardiográficos após cardioversão elétrica e desfibrilação.
- B) Taquicardia ventricular e fibrilação ventricular podem ocorrer após uma cardioversão elétrica, especialmente em pacientes com hipocalcemia.
- C) No último trimestre de gravidez, a cardioversão elétrica e a desfibrilação estão associadas a efeitos adversos no feto e ao risco de induzir parto prematuro.
- D) Dor e queimaduras de primeiro grau são complicações observadas após uma cardioversão elétrica.

### QUESTÃO 77

Em relação à paracentese, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A paracentese pode ter caráter propedêutico ou terapêutico.
- B) A paracentese propedêutica pode determinar a etiologia da ascite ou a presença de infecção do líquido ascítico.
- C) É importante introduzir a agulha lateral ao músculo reto abdominal para evitar lesão da artéria e veia epigástrica inferior.
- D) Deve-se preferir realizar a paracentese no quadrante inferior direito da parede abdominal.

### QUESTÃO 78

Em relação ao exame neurológico das pupilas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As pupilas devem ser examinadas quanto ao tamanho, simetria e reatividade à luz.
- B) A herniação de uncus manifesta-se com midríase contralateral ao lado herniado e reflexo pupilar contralateral consensual abolido.
- C) Grandes lesões de ponte podem causar miose intensa, descrita como pupilas puntiformes.
- D) Midríase bilateral arreativa à luz após uma ressuscitação cardiopulmonar pode ser causada pelo uso de atropina durante as manobras de ressuscitação.

### QUESTÃO 79

Em relação à ressuscitação cardiopulmonar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O débito cardíaco durante as manobras de ressuscitação cardiopulmonar depende da adequada compressão torácica.
- B) No adulto, a ausência de pulso central é melhor determinada pela palpação da artéria carótida.
- C) Deve-se procurar o pulso central por, no mínimo, 20 segundos, para se ter certeza da ausência de circulação e não iniciar compressões potencialmente lesivas em um paciente com circulação espontânea.
- D) Durante as compressões torácicas, deve-se permitir o completo recolhimento elástico do tórax.



# FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**