

OFTALMOLOGIA

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 – Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
- 2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
- 3 – Ao receber a **Folha de Respostas**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4 – **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5 – Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01

A	B	C	D
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (**alíneas a, b, d, h e m**).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br no dia 19 de outubro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **79 (setenta e nove) questões de múltipla escolha** com **4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão**, assim distribuídas: **BLOCO A**: 5 (cinco) questões de **Cooperativismo**, 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria**, 8 (oito) questões de **Saúde Pública e Saúde Suplementar**; **BLOCO B**: 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

BLOCO A

COOPERATIVISMO

QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de médicos, organizadas no formato societário de cooperativas de trabalho médico.
- B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro grau ou singular do Sistema Unimed.
- C) A entidade médica que liderou a formação da Mediminas, que posteriormente passou a ser denominada Unimed BH, foi o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.
- D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A instância máxima de deliberação em uma cooperativa é a Assembleia Geral dos Associados.
- B) O associado poderá ser eliminado da sociedade por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.
- C) A demissão do cooperado – saída voluntária da cooperativa – poderá ser impedida pelos órgãos da administração, caso o trabalho desse cooperado seja indispensável ao bom funcionamento da cooperativa.
- D) A prestação de contas da administração da cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária realizada no primeiro trimestre de cada ano.

QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a organização do setor no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa são democraticamente eleitos pelos associados e funcionários da cooperativa.
- B) A solidariedade, a democracia e a equidade são princípios universais do cooperativismo.
- C) Os fundos de investimento estão impedidos de adquirir parte do capital das cooperativas, ainda que de forma minoritária.
- D) A Confederação Nacional do Cooperativismo (CENCOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) são entidades do cooperativismo brasileiro que compõem o sistema OCB.

QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra os seguintes princípios universais do cooperativismo **EXCETO**:

- A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.
- B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.
- C) As cooperativas são sociedades de pessoas; sociedades essas não sujeitas à falência.
- D) As quotas-partes do capital da sociedade podem ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado por cooperativas singulares, por federações estaduais ou regionais e por uma confederação denominada Unimed do Brasil.
- B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de Cooperados, possui uma Assembleia Geral de Delegados formada por associados eleitos dentro das especialidades médicas.
- C) O Conselho Social da Unimed BH possui função consultiva, discute as macropolíticas e as estratégias da Cooperativa e é formado por delegados, conselheiros e membros do Núcleo de Integração com Cooperados.
- D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde Suplementar no Brasil e estabelece regras para os planos privados de assistência à saúde, exceto para as cooperativas que devem observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Homens com menos de 40 anos de idade, assintomáticos e sem comorbidades, que irão ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem previsão de sangramento, não necessitam de nenhum exame complementar pré-operatório.
- B) A história clínica constitui meio mais efetivo para diagnosticar fatores de risco associados a doenças coexistentes do que o exame físico e os exames complementares.
- C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos os sexos.
- D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a realização pré-operatória de ureia / creatinina, dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.

QUESTÃO 7

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os macrófagos apresentam mobilização mais rápida em direção à área traumatizada do que os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais curto.
- B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por diversos mecanismos, destacando-se a liberação de enzimas proteolíticas, como as elastases.
- C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de células e pode mediar a vasodilatação e regular o tônus vascular.
- D) As proteínas reactantes da fase aguda são produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na tentativa de manter a homeostasia.

QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à proliferação de células endoteliais.
- B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da permeabilidade vascular, mediada, entre outras, pela serotonina e histamina.
- C) Os leucócitos têm importante papel na remoção de detritos celulares e de bactérias do leito da lesão.
- D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que são responsáveis pela produção de interleucina 1.

QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de hipotensão sem taquicardia concomitante é sinal sugestivo de choque neurogênico.
- B) É característica do choque cardiogênico a redução da perfusão tecidual com volemia adequada.
- C) Gasometria arterial inalterada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo por embolia pulmonar.
- D) São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio, dissecação aguda da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

- I. A associação de lesões aftosas na boca com lesões anais e perianais pode sugerir a presença da doença de Crohn.
- II. É a manifestação clínica que mais frequentemente se associa a doenças do intestino delgado.
- III. Quando a origem é o intestino delgado, as dejeções são pequenas, com número diário muito aumentado, frequentemente com muco, pus e sangue.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa que **NÃO** é considerada causa dessa doença.

- A) Cirurgia abdominal
- B) Hiperlipidemia
- C) Hipocalcemia
- D) Trauma abdominal contuso

QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames complementares e as doenças ou situações que afetam o aparelho respiratório.

COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina
2. Dímero D
3. Dosagem de cloro no suor
4. Espirometria
5. Ultrassonografia

COLUNA II

- () Asma
- () Derrame pleural
- () Embolia pulmonar
- () Enfisema pulmonar
- () Mucoviscidose

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 5 2 1 3
- B) 1 5 3 4 2
- C) 3 1 2 5 4
- D) 5 4 3 1 2

QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes patológicos, apresenta há várias semanas parestesias nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Anemia falciforme
- B) Anemia perniciosa
- C) Esclerose múltipla
- D) Talassemia

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, halo perinuclear e multinucleação.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Infecção por papilomavírus humano
- B) Cervicite crônica bacteriana
- C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
- D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é recorrente. No momento, não apresenta queixas nem sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta: PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m²; mamas e exame ginecológico sem alterações.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a conduta a ser adotada.

- A) Solicitar exames complementares de rotina, como mamografia e ultrassonografia, e manter terapia hormonal até o resultado dos exames.
- B) Manter a terapia hormonal, independentemente dos resultados dos exames, pois a paciente teve diagnóstico de menopausa recentemente.
- C) Orientar a paciente sobre os riscos cardiovasculares da terapia hormonal e suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.
- D) Suspender a terapia hormonal e solicitar ultrassonografia transvaginal de urgência e, somente depois do resultado desse exame, discutir a possibilidade de retorno.

QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com 36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa (1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos cardíofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 2,0 cm.

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e indicar resolução da gestação.
- B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e recomendar controle materno-fetal.
- C) Prescrever Nifedipina via oral associada à Alfametildopa e recomendar controle materno-fetal.
- D) Pedir exames para avaliação da função renal e hepática e recomendar controle materno-fetal.

QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação e o último hemograma apresentou hemoglobina de 11 g/dL, em exame de rotina pré-natal.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Realizar coleta seriada de hemograma e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter orientação dietética considerando o estilo de vida da paciente.
- D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

PEDIATRIA

QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até:

- A) 4 meses.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 24 meses.

QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é **CORRETO** afirmar:

- A) Apesar da simplicidade da utilização da antropometria, a falta de uma curva nacional fez com que o Ministério da Saúde contraindicasse a sua utilização em saúde pública.
- B) Para avaliar o crescimento, a medida da altura é mais importante que a do peso, devido à facilidade de sua obtenção.
- C) A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas de percentil porque são mais fidedignas que as que utilizam escore z.
- D) O acompanhamento da medida de peso e sua localização em um gráfico é uma importante forma de avaliar o crescimento de uma criança.

QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda e com desidratação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar com hidratação endovenosa.
- B) A prescrição de antibióticos é necessária porque a maioria das diarreias agudas é de origem bacteriana.
- C) Na desidratação leve e moderada, na qual não há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação com terapia de reidratação oral.
- D) Em uma criança com diarreia e desidratada, e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é **CORRETO** afirmar que:

- A) todas as crianças após o diagnóstico de pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.
- B) as pneumonias virais são muito raras, por isso, a utilização de antibióticos é tão importante numa criança com quadro respiratório.
- C) a droga de escolha para o tratamento da pneumonia na comunidade é a Penicilina Benzatina, pelo seu baixo custo.
- D) a Amoxicilina é utilizada para tratamento da maioria das pneumonias bacterianas.

SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.
- C) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- D) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.

QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.

Região / ano	2010	2011	2012	2013
Norte	5.289	5.093	5.113	5.163
Nordeste	13.197	3.006	12.527	12.717
Sudeste	4.120	14.172	4.114	13.748
Sul	4.220	4.395	4.238	4.141
Centro-Oeste	3.044	3.050	3.131	3.197
Total	39.870	39.716	39.123	38.966

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É necessário conhecer a estimativa populacional para cada ano (número de óbitos / população x 1 000).
- B) É necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos vivos x 1 000).
- C) É necessário multiplicar o número de óbitos por 100, já que se trata de uma porcentagem (número de óbitos x 100).
- D) É necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em crianças de 0-7 dias).

QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em desenvolvimento vêm apresentando graves problemas relacionados à escassez de recursos financeiros, decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento das questões relativas à incorporação tecnológica desordenada.

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estratégias de enfrentamento incluem avaliações de eficácia / efetividade e custo das tecnologias em saúde.
- II. A avaliação de tecnologias em saúde não influencia a decisão clínica, visto que esta é uma decisão individual.
- III. A avaliação de tecnologias opera somente no campo de saúde pública, uma vez que, no sistema privado, o custo não é um fator limitante para a obtenção de produtos em saúde.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se elevado número de estabelecimentos de saúde privados no Brasil.

De acordo com a Constituição Federal, de que forma ocorre a participação do sistema de saúde privado?

- A) Complementar ao SUS.
- B) Opcional para o SUS.
- C) Compulsório para cidadãos com alto poder aquisitivo.
- D) Obrigatório para empresas.

QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas em prazos pré-estabelecidos.

Sobre esses prazos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 7 (sete) dias úteis.
- B) Consulta nas especialidades médicas (nefrologista, pneumologista, ortopedista): em até 14 (quatorze) dias úteis.
- C) Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis.
- D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias úteis.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-referência de assistência à saúde deve contemplar os seguintes procedimentos, **EXCETO**:

- A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar
- B) Centro de terapia intensiva
- C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental
- D) Tratamento antineoplásico

QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) "a cobrança feita aos beneficiários de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas indevidas".

Disponível em: < <http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf> >.
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa afirmativa se baseia.

- A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 (Integralidade das ações em saúde)
- B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição do plano-referência de assistência à saúde)
- C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 2013 (Dos princípios de atenção à saúde na saúde suplementar)
- D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 2006 (Das infrações a que estão submetidos os planos privados de assistência à saúde)

QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Centrar ações no cuidado médico para evitar falta de integração no cuidado ao paciente.
- B) Incorporar de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal.
- C) Usar a epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde.
- D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando o aumento de sua autonomia.

OFTALMOLOGIA

QUESTÃO 30

Em relação ao hemangioma capilar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Acomete principalmente crianças do sexo feminino.
- B) Canais vasculares estão restritos à derme, poupando tecido subcutâneo.
- C) Pode apresentar elevação transitória durante manobra de Valsalva.
- D) A maioria das lesões ocorre no primeiro ano de vida.

QUESTÃO 31

Em relação às neoplasias palpebrais, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) o xeroderma pigmentoso está associado a carcinoma de células basais, carcinoma de células escamosas e melanoma palpebral.
- B) embora esteja relacionado a exposição à luz solar, o xeroderma pigmentoso apresenta padrão de herança autossômico recessivo.
- C) a síndrome de Gorlin-Goltz está relacionada a carcinoma de células escamosas multifocal até 20 anos de idade.
- D) a principal via de metástase do carcinoma de células escamosas são os linfonodos regionais.

QUESTÃO 32

Em relação às infecções das vias lacrimais, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) os principais agentes etiológicos da canaliculite crônica são anaeróbios Gram positivos, especialmente o *Acninyces israelii*.
- B) a maioria dos casos de canaliculite crônica está relacionada a obstrução canalicular.
- C) a canaliculotomia pela face conjuntival é considerada o procedimento cirúrgico de escolha para a canaliculite crônica.
- D) a dacriocistorrinostomia deve ser adiada em presença de epífora persistente.

QUESTÃO 33

Em relação à celulite infecciosa orbitária, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Pode ser devida a foco dentário, via sinusite maxilar intermediária.
- B) Os principais agentes da celulite orbitária associada a trauma palpebral na criança são o *S. aureus* e *S. pyogenes*.
- C) Uma das indicações para intervenção cirúrgica é a presença de abscesso subperiósteo em parede medial.
- D) A celulite orbitária relacionada ao trauma orbitário evolui após 72 horas.

QUESTÃO 34

Em relação à ceratoconjuntivite seca, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) A hiperosmolaridade lacrimal está relacionada à lesão do epitélio corneano.
- B) A reação inflamatória conjuntival está presente na maioria dos pacientes.
- C) A disfunção das glândulas de Meibomius é uma causa bem estabelecida de ceratoconjuntivite seca evaporativa.
- D) Não há indicação para o uso de corticoide tópico, mesmo em presença de reação inflamatória conjuntival significativa, quando há desepitelização corneana *punctata*.

QUESTÃO 35

Em relação à síndrome de Sjögren, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O aumento das glândulas salivares, resíduos de mucina no filme lacrimal e menisco lacrimal inferior a 1 mm são achados bem estabelecidos.
- B) A coloração com rosa bengala e filtro *red-free* favorecem a identificação de filamentos corneanos e placas mucosas.
- C) A neovascularização corneana periférica é uma complicação bem descrita.
- D) A síndrome de Sjögren constitui contraindicação formal ao uso de lentes de contato siliconadas.

QUESTÃO 36

Em relação à conjuntivite por adenovírus, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a conjuntivite folicular aguda é a forma de apresentação mais comum.
- B) a conjuntivite crônica é caracterizada por lesões papilares e foliculares.
- C) a presença de pseudomembranas não é compatível com o diagnóstico.
- D) microcistos epiteliais são comuns durante o estágio inicial.

QUESTÃO 37

Em relação às ceratites fúngicas, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a ceratite por *Fusarium* e *Aspergillus* são frequentemente associadas a trauma com matéria vegetal.
- B) a ceratite por *Candida* se caracteriza pelo infiltrado estromal amarelo-esbranquiçado de margens indistintas, progressivas, e lesões satélites e infiltrados em forma de anel.
- C) o afilamento corneano e a penetração através da membrana de Descemet são mais característicos da ceratite por fungos filamentosos.
- D) a natamicina é a droga de escolha para o tratamento tópico da ceratite por fungos filamentosos.

QUESTÃO 38

Em relação às ceratites herpéticas, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) defeitos epiteliais persistentes, mesmo após iniciado o processo de cicatrização, são sugestivos de replicação viral ativa.
- B) as ceratites epitelial e disciforme se caracterizam pela diminuição da sensibilidade corneana.
- C) edema epitelial e opacidade epitelial em padrão pontilhado ocorrem antes da formação da úlcera dendrítica.
- D) a opacificação intersticial difusa é característica da ceratite estromal necrotizante.

QUESTÃO 39

Em relação ao herpes-zóster oftálmico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A ceratite intersticial se desenvolve usualmente entre 4 e 6 semanas a partir do *rash* cutâneo.
- B) A ceratite numular usualmente ocorre em até 10 dias a partir do *rash* cutâneo, e sua distribuição coincide com a das lesões epiteliais.
- C) A episclerite usualmente coincide com o início do *rash* cutâneo.
- D) A conjuntivite associada à infecção pelo herpes-zóster pode apresentar reação folicular e/ou papilar.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que apresenta a adição teórica necessária, em dioptrias, para a leitura de texto de tamanho 1M em paciente de 38 anos de idade com acuidade visual de 20/200, e que não apresenta melhora com correção para longe.

- A) 4
- B) 10
- C) 18
- D) 20

QUESTÃO 41

Em relação à ceratite por *Acanthamoeba*, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) o diagnóstico diferencial com herpes simples se justifica especialmente pela presença de pseudodendritos.
- B) infiltrados perineurais de distribuição radial ocorrem nas primeiras quatro semanas de evolução e são considerados patognomônicos.
- C) a esclerite ocorre a partir da segunda semana e indica extensão da ceratite.
- D) culturas negativas no ágar são frequentemente negativas.

QUESTÃO 42

Em relação às ceratites químicas, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a coagulação proteica que ocorre na presença de ácidos limita sua penetração, que tende a ser mais superficial em relação aos álcalis.
- B) a necrose do epitélio corneano e conjuntival e a oclusão vascular no limbo são efeitos iniciais do contato com álcalis.
- C) a transparência da córnea e a intensidade da isquemia límbica são critérios utilizados na classificação de Roper-Hall.
- D) a ulceração corneana ocorre usualmente na primeira semana a partir do contato com o agente químico.

QUESTÃO 43

Em relação às ectasias corneanas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Embora usualmente bilateral, a forma de apresentação do ceratocone é assimétrica, com acuidade visual frequentemente preservada no olho menos comprometido.
- B) A presença de anéis de Fleischer e as estrias de Vogt são características do ceratocone, e constituem critérios importantes no diagnóstico diferencial com a degeneração marginal pelúcida.
- C) Medidas ceratométricas entre 48 e 54 são compatíveis com ceratocone moderado.
- D) A ceratoplastia lamelar profunda anterior não está indicada no ceratocone, mesmo na presença de opacidades corneanas.

QUESTÃO 44

Em relação às distrofias corneanas estromais, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a distrofia de Reis-Bücklers envolve o estroma anterior e a camada de Bowman, e se caracteriza pela substituição da camada de Bowman e da membrana basal epitelial por tecido fibroso.
- B) a distrofia de Reis-Bücklers se caracteriza por opacidades subepiteliais arredondadas ou poligonais, finas e de coloração branco-acinzentadas, que evolui para um padrão reticular.
- C) a distrofia cristalíniana central de Schnyder é caracterizada por opacidade central associada a *haze* corneano difuso.
- D) a distrofia granular tipo I se manifesta por erosões recorrentes após a primeira década de vida.

QUESTÃO 45

Em relação à distrofia corneana endotelial de Fuchs, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) pontos escuros ao exame por reflexão especular à lâmpada de fenda sugerem perda da regularidade do mosaico endotelial.
- B) a córnea *guttata* está relacionada a defeitos localizados no endotélio e na membrana de Descemet.
- C) o edema estromal relacionado à descompensação endotelial é tipicamente central e mais intenso pela manhã.
- D) a ceratoplastia penetrante ou endotelial lamelar profunda apresenta elevada taxa de sucesso.

QUESTÃO 46

Em relação à conjuntivite tracomatosa, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) o estágio inflamatório é caracterizado por reação papilofolicular sem secreção purulenta.
- B) reação papilofolicular, ceratite epitelial superior e *pannus* são manifestações características do estágio inflamatório.
- C) as cicatrizes lineares conjuntivais, características do estágio cicatricial, não se restringem ao tarso superior.
- D) a destruição de células calciformes contribui para o estabelecimento da ceratoconjuntivite seca.

QUESTÃO 47

Em relação à conjuntivite neonatal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A infecção pela *Neisseria gonorrhoeae* se manifesta na primeira semana de vida.
- B) A infecção pela *Chlamydia trachomatis* se manifesta a partir da terceira semana de vida.
- C) Formas graves da conjuntivite neonatal são usualmente relacionadas à infecção por *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* e herpes simples tipo 2.
- D) A presença de ceratite associada sugere infecção por *Neisseria gonorrhoeae* ou herpes simples.

QUESTÃO 48

Em relação à conjuntivite limbar superior, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) está frequentemente associada à tireoidopatia, principalmente em presença de hipertireoidismo.
- B) constitui contraindicação formal ao uso de lente de contato.
- C) são achados característicos as erosões corneanas superiores e a ceratite filamentar superior.
- D) a ressecção da conjuntiva limbar superior apresenta bons resultados em casos resistentes ao tratamento clínico.

QUESTÃO 49

Em relação às episclerites, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a distribuição interpalpebral é característica da episclerite nodular.
- B) os episódios de episclerite nodular são autolimitados e usualmente regredem sem tratamento.
- C) a episclerite nodular está associada a desconforto intenso de início agudo.
- D) a episclerite simples apresenta usualmente caráter recorrente.

QUESTÃO 50

Em relação à neurofibromatose, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) o glioma bilateral do nervo óptico é compatível com neurofibromatose tipo 1.
- B) neurofibromas palpebrais usualmente ocorrem em adultos jovens.
- C) os nódulos de Lisch representam hamartomas de íris.
- D) ela pode estar associada a tumores intracranianos.

QUESTÃO 51

Em relação às esclerites, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Usualmente ocorre infiltração inflamatória na espessura total da esclera.
- B) A esclerite anterior não necrosante ocorre principalmente em mulheres com até 40 anos de idade.
- C) Nas esclerites anteriores não necrosantes, os nódulos esclerais se desenvolvem usualmente na região interpalpebral.
- D) O glaucoma é causa frequente de perda visual na esclerite anterior necrosante.

QUESTÃO 52

Em relação às uveítes anteriores, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a uveíte anterior aguda associada ao HLA B-27 usualmente se cursa com deposição intensa de fibrina no endotélio corneano.
- B) hipópio denso, de absorção lenta, é usualmente encontrado em pacientes com uveíte anterior aguda associada ao HLA-B27 ou síndrome de Behçet.
- C) a uveíte herpética está frequentemente associada a elevação da pressão intraocular.
- D) tanto o herpes simples quanto o herpes-zóster usualmente produzem atrofia setorial da íris, enquanto na uveíte de Fuchs, a atrofia tende a ser difusa.

QUESTÃO 53

Em relação às uveítes associadas às espondiloartropatias, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) na síndrome de Reiter, a conjuntivite usualmente precede a artrite e apresenta característica mucopurulenta.
- B) a uveíte associada a espondiloartropatias e HLA B-27 é usualmente bilateral, discreta e recidivante.
- C) uveíte anterior associada à espondiloartrite, fascíte plantar e tenossinovite de Aquiles sugere síndrome de Reiter.
- D) a síndrome de Reiter pode ser desencadeada por doenças sexualmente transmissíveis no homem e infecções entéricas por *Shigella*, *Salmonella* e *Campylobacter* na mulher.

QUESTÃO 54

Em relação à uveíte associada à artrite idiopática juvenil, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a artrite idiopática juvenil é um diagnóstico de exclusão em pacientes com fator reumatoide negativo.
- B) a artrite em até quatro articulações é a forma de apresentação mais frequente e usualmente precede a uveíte anterior.
- C) a ausência de formação de sinéquias posteriores é característica, mesmo em casos de uveíte anterior crônica.
- D) a uveíte anterior é usualmente assintomática e não cursa com hiperemia conjuntival.

QUESTÃO 55

Em relação às uveítes intermediárias, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A vitreíte é a manifestação clínica mais frequente da uveíte intermediária.
- B) Cursam frequentemente com membrana epirretiniana macular.
- C) Hemorragia vítrea pode ocorrer a partir de membranas fibrovasculares associadas ao *snowbanking*.
- D) O descolamento tracional da retina a partir de contração de membranas fibrovasculares no *snowbanking* é causa frequente de baixa visual definitiva.

QUESTÃO 56

Em relação às uveítes posteriores por *Toxocara canis*, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) endoftalmite crônica com leucocoria é usualmente encontrada antes dos 2 anos de idade.
- B) granulomas de polo posterior estão frequentemente associados a traves vitreoretinianas e descolamento tracional localizado da retina em crianças com mais de 6 anos de idade.
- C) os granulomas de polo posterior usualmente não estão associados a vitreíte.
- D) a baixa visual relacionada aos granulomas periféricos ocorre usualmente por distorção macular, assim como tração retiniana e ou descolamento de retina.

QUESTÃO 57

Em relação à retinite por citomegalovírus, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a retinite periférica associada a hemorragias puntiformes são características das fases iniciais.
- B) a vitreíte intensa, restrita à periferia e com aspecto semelhante a *snowbanking*, é característica da retinite fulminante.
- C) áreas extensas de opacificação retiniana associadas a embainhamento perivascular e hemorragias são características da retinite fulminante.
- D) o descolamento de retina está associado a formação de roturas de retina extensas.

QUESTÃO 58

Em relação à retinocoroidopatia de Birdshot, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) placas menores que um diâmetro papilar e com limites pouco definidos são frequentemente encontradas na área macular.
- B) a principal forma de apresentação é a redução progressiva da visão central associada a focias.
- C) caracteriza-se por ser bilateral, crônica, recorrente e mais prevalente no sexo feminino.
- D) as lesões usualmente apresentam irradiação a partir do disco óptico.

QUESTÃO 59

Em relação às neoplasias conjuntivais, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) no melanoma, células neoplásicas são identificadas no epitélio conjuntival, sem invasão do estroma subconjuntival.
- B) a maioria dos casos de melanoma conjuntival são originários de melanose adquirida primária.
- C) a melanose adquirida primária com atipia celular se caracteriza por áreas planas que envolvem o limbo e a região interpalpebral.
- D) considerando o espectro histológico da neoplasia escamosa da superfície ocular, o carcinoma *in situ* se caracteriza por células displásicas na espessura total do epitélio.

QUESTÃO 60

Em relação à leucocoria na criança, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a catarata associada à persistência do vítreo hiperplásico primário é devida à reação inflamatória associada.
- B) o retinoblastoma exofítico se caracteriza por massas brancas multilobulares subretinianas e descolamento de retina.
- C) o retinoblastoma endofítico se caracteriza por massas brancas que se projetam no vítreo e tendem a produzir sementeira vítrea.
- D) a membrana ciclítica e a leucocoria são características da endoftalmite crônica por *Toxocara canis*.

QUESTÃO 61

Em relação à catarata congênita, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) seu modo de transmissão é mais frequentemente autossômico dominante, embora o autossômico recessivo e ligado ao X sejam descritos.
- B) as cataratas hereditárias são caracteristicamente coronárias (supranucleares).
- C) cataratas nucleares apresentam associação com microftalmia.
- D) a catarata polar anterior apresenta associação com membrana pupilar, lenticone anterior e aniridia.

QUESTÃO 62

Em relação à retinopatia da prematuridade, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a doença *plus* agressiva posterior caracteristicamente progride pelos estágios 1 a 3 em poucas semanas, com envolvimento preferencial da zona 2.
- B) há vasodilatação e aumento da tortuosidade em pelo menos um quadrante.
- C) o estágio 3 se caracteriza pela formação de tecido fibrovascular extrarretiniano contínuo com a face posterior da crista e que infiltra o vítreo.
- D) o estágio 4 se caracteriza pelo descolamento de retina parcial, tanto foveal quanto extrafoveal, usualmente côncavo e orientado circunferencialmente.

QUESTÃO 63

Em relação à doença de Eales, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Usualmente manifesta-se por hemorragia vítrea na primeira década de vida.
- B) O embainhamento vascular periférico e a não perfusão capilar são característicos, assim como a oclusão de ramo venoso retiniano.
- C) A neovascularização tende a ocorrer na junção entre a retina perfundida e a não perfundida, e pode se acompanhar por hemorragia vítrea recorrente.
- D) A hemorragia vítrea e o descolamento tracional de retina são causas frequentes de baixa visual.

QUESTÃO 64

Em relação à degeneração macular relacionada à idade (DMRI), é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a DMRI não exsudativa se caracteriza por drusas, áreas de atrofia do epitélio pigmentar da retina e defeito em janela à angiofluoresceinografia.
- B) o descolamento do epitélio pigmentar da retina (EPR) é caracteristicamente assintomático.
- C) a presença de líquido subretiniano em distribuição irregular, hemorragia sub-EPR e dobras coriorretinianas sugerem membrana neovascular subretiniana.
- D) a presença de rupturas do EPR está frequentemente associada a piora súbita da acuidade visual.

QUESTÃO 65

Em relação à retinopatia diabética, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) os microaneurismas caracteristicamente se desenvolvem na camada nuclear interna.
- B) os exsudatos lipídicos estão localizados usualmente na camada plexiforme externa.
- C) os exsudatos algodonosos estão localizados usualmente na camada plexiforme interna.
- D) as hemorragias intrarretinianas são caracteristicamente encontradas nas camadas retinianas médias.

QUESTÃO 66

Em relação ao glaucoma crônico de ângulo fechado, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a maioria dos pacientes não apresenta sintomas relacionados à elevação intermitente da pressão intraocular.
- B) no ângulo fechado primário, ocorre contato iridotrabecular nos quatro quadrantes.
- C) a íris em platô se caracteriza pelo aplanamento iriano central, recesso estreito do ângulo e processos ciliares posicionados anteriormente.
- D) o contato iridotrabecular intermitente pode estar relacionado a sinéquias anteriores periféricas.

QUESTÃO 67

Em relação à síndrome pseudoesfoliativa, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a linha de Sampaolesi, localizada anteriormente ou sobre a linha de Schwalbe, é característica.
- B) a maioria dos pacientes apresenta ângulo estreito ou fechado.
- C) a cirurgia de facoemulsificação está associada a risco aumentado de rotura de cápsula posterior.
- D) o pós-operatório da cirurgia de facoemulsificação está associado a risco aumentado de edema corneano, contração da cápsula posterior e subluxação da lente intraocular.

QUESTÃO 68

Em relação à propedêutica do glaucoma primário de ângulo aberto, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) defeitos paracentrais constituem achados iniciais em aproximadamente 20% dos pacientes.
- B) defeitos arqueados ocorrem usualmente entre 10° e 20° do ponto de fixação.
- C) o degrau nasal é usualmente associado a outros defeitos de campo, como depressões paracentrais e defeitos arqueados.
- D) defeitos arqueados tendem a se alongar circunferencialmente, configurando o chamado escotoma de Seidel.

QUESTÃO 69

Em relação ao glaucoma facolítico, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) não ocorre reação autoimune granulomatosa a proteínas do cristalino.
- B) além das proteínas cristalínicas, a presença de macrófagos na câmara anterior contribui para o bloqueio trabecular.
- C) catarata hipermadura, ângulo aberto e câmara anterior rasa são achados característicos.
- D) material brancacento na câmara anterior e pseudo-hipópio são achados ocasionais.

QUESTÃO 70

Em relação ao glaucoma traumático, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a recidiva do hifema traumático usualmente ocorre na segunda semana após o trauma, quando já existe clareamento da câmara anterior.
- B) o hifema traumático não constitui contraindicação ao uso de corticoide tópico.
- C) pacientes com ressecção do ângulo e hifema traumático evoluem ocasionalmente para glaucoma crônico ou elevação persistente da pressão intraocular.
- D) a trabeculoplastia a laser não está indicada em pacientes com glaucoma crônico associado a ressecção traumática do ângulo.

QUESTÃO 71

Em relação ao glaucoma congênito primário, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Usualmente é bilateral, embora o comprometimento seja assimétrico.
- B) Subluxação do cristalino é achado infrequente em pacientes com aumento significativo do diâmetro anteroposterior.
- C) As estrias de Haab representam rupturas da membrana de Descemet e apresentam-se como opacidades lineares verticais.
- D) O diâmetro corneano maior ou igual a 12 mm antes do primeiro ano de vida ou maior ou igual a 14 mm em qualquer idade deve ser considerado suspeito.

QUESTÃO 72

Em relação às distrofias maculares, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) o eletro-oculograma está caracteristicamente alterado na fase pré-viteliforme em crianças assintomáticas.
- B) a neovascularização subretiniana com atrofia do epitélio pigmentar da retina é uma das principais causas de baixa visual intensa pela distrofia macular juvenil de Best após 50 anos de idade.
- C) a neovascularização subretiniana com fibrose é uma das principais causas de baixa visual intensa associada à distrofia de Sorsby após 50 anos de idade.
- D) nas drusas familiares dominantes, o eletro-oculograma está preservado mesmo no comprometimento extenso do epitélio pigmentar da retina.

QUESTÃO 73

Em relação à doença de Stargardt, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) o início das manifestações na idade adulta não é compatível com a doença.
- B) a localização dos *flecks* restrita ao polo posterior é compatível com a doença.
- C) o aspecto de bronze batido e a atrofia geográfica são achados descritos ao exame fundoscópico.
- D) a hiperfluorescência por defeito em janela e o “silêncio coroidiano” são achados descritos à angiofluoresceinografia.

QUESTÃO 74

Em relação à degeneração em paliçada (*lattice*), é **INCORRETO** afirmar que:

- A) está associada à descontinuidade da membrana limitante interna e aumento da adesão vítrea ao redor de suas margens.
- B) usualmente se localiza entre o equador e a borda posterior da base do vítreo.
- C) roturas retinianas associadas ao *lattice* ocorrem usualmente antes dos 20 anos de idade.
- D) o *lattice* com buracos atróficos está raramente associado a descolamento de retina, que neste caso pode ocorrer sem sinais de descolamento súbito do corpo vítreo.

QUESTÃO 75

Em relação ao descolamento de retina, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) as degenerações microcística e reticular não estão associadas a risco aumentado de descolamento de retina.
- B) pacientes com síndrome de Stickler apresentam baixo risco de descolamento de retina, mesmo em presença de membranas vítreas e degenerações semelhantes ao *lattice*.
- C) as diálises retinianas estão localizadas ao longo da ora serrata e apresentam adesão vítrea em sua margem posterior.
- D) as roturas gigantes estão localizadas usualmente na retina pós-oral e apresentam adesão vítrea em sua margem anterior.

QUESTÃO 76

Em relação aos tumores vasculares retinianos, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) o hemangioma capilar apresenta associação frequente com doença de von Hippel-Lindau.
- B) os tumores iniciais no hemangioma capilar apresentam localização têmporo-superior ou têmporo-inferior.
- C) o trauma ocular é causa estabelecida de tumores vasoproliferativos secundários da retina.
- D) a principal causa de baixa visual nos tumores proliferativos é a hemorragia vítrea recorrente.

QUESTÃO 77

Em relação aos tumores coroidianos, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) lesão pigmentada de margens indistintas, diâmetro basal menor que 5 mm e espessura menor que 1 mm são compatíveis com nevus de coroide típico.
- B) a presença de lipofuscina e descolamento de retina seroso em uma lesão pigmentada de diâmetro maior que 5 mm sugere melanoma.
- C) no melanoma de coroide, a alta densidade de células epiteloideas e a infiltração linfocítica sugerem pior prognóstico.
- D) heterogeneidade interna, escavação da coroide e presença de sombra acústica são achados característicos ao ultrassom nos melanomas de coroide.

QUESTÃO 78

Em relação aos tumores metastáticos de coroide, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) o descolamento exsudativo da retina é restrito a casos de metástases avançadas.
- B) o tumor primário se localiza com maior frequência nas mamas e nos brônquios.
- C) se manifestam por lesões placoides de margens pouco definidas, localizadas usualmente no polo posterior.
- D) ao ultrassom, observa-se espessamento difuso da coroide, com refletividade interna moderada.

QUESTÃO 79

Em relação às manifestações do corpo estranho intraocular metálico, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a presença de um corpo estranho intraocular com alto conteúdo de cobre apresenta prognóstico reservado, com alto risco de progressão para *phthisis bulbi*.
- B) corpos estranhos intraoculares com baixo conteúdo de cobre podem se manifestar como placas retinianas douradas.
- C) catarata subcapsular anterior, heterocromia iriana, glaucoma secundário a lesão trabecular são achados descritos na presença de corpos estranhos com alto conteúdo de ferro.
- D) a atenuação progressiva da onda a à eletrorretinografia é achado descrito na presença de corpos estranhos com alto conteúdo de ferro.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**