

OTORRINOLARINGOLOGIA

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 – Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
- 2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
- 3 – Ao receber a **Folha de Respostas**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4 – **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5 – Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01 A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02 A B C D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03 A B C D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
- 04 A B C D

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (**alíneas a, b, d, h e m**).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 19 de outubro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **79 (setenta e nove) questões de múltipla escolha** com **4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão**, assim distribuídas: **BLOCO A**: 5 (cinco) questões de **Cooperativismo**, 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria**, 8 (oito) questões de **Saúde Pública e Saúde Suplementar**; **BLOCO B**: 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

BLOCO A

COOPERATIVISMO

QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de médicos, organizadas no formato societário de cooperativas de trabalho médico.
- B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro grau ou singular do Sistema Unimed.
- C) A entidade médica que liderou a formação da Mediminas, que posteriormente passou a ser denominada Unimed BH, foi o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.
- D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A instância máxima de deliberação em uma cooperativa é a Assembleia Geral dos Associados.
- B) O associado poderá ser eliminado da sociedade por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.
- C) A demissão do cooperado – saída voluntária da cooperativa – poderá ser impedida pelos órgãos da administração, caso o trabalho desse cooperado seja indispensável ao bom funcionamento da cooperativa.
- D) A prestação de contas da administração da cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária realizada no primeiro trimestre de cada ano.

QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a organização do setor no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa são democraticamente eleitos pelos associados e funcionários da cooperativa.
- B) A solidariedade, a democracia e a equidade são princípios universais do cooperativismo.
- C) Os fundos de investimento estão impedidos de adquirir parte do capital das cooperativas, ainda que de forma minoritária.
- D) A Confederação Nacional do Cooperativismo (CENCOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) são entidades do cooperativismo brasileiro que compõem o sistema OCB.

QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra os seguintes princípios universais do cooperativismo **EXCETO**:

- A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.
- B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.
- C) As cooperativas são sociedades de pessoas; sociedades essas não sujeitas à falência.
- D) As quotas-partes do capital da sociedade podem ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado por cooperativas singulares, por federações estaduais ou regionais e por uma confederação denominada Unimed do Brasil.
- B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de Cooperados, possui uma Assembleia Geral de Delegados formada por associados eleitos dentro das especialidades médicas.
- C) O Conselho Social da Unimed BH possui função consultiva, discute as macropolíticas e as estratégias da Cooperativa e é formado por delegados, conselheiros e membros do Núcleo de Integração com Cooperados.
- D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde Suplementar no Brasil e estabelece regras para os planos privados de assistência à saúde, exceto para as cooperativas que devem observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Homens com menos de 40 anos de idade, assintomáticos e sem comorbidades, que irão ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem previsão de sangramento, não necessitam de nenhum exame complementar pré-operatório.
- B) A história clínica constitui meio mais efetivo para diagnosticar fatores de risco associados a doenças coexistentes do que o exame físico e os exames complementares.
- C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos os sexos.
- D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a realização pré-operatória de ureia / creatinina, dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.

QUESTÃO 7

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os macrófagos apresentam mobilização mais rápida em direção à área traumatizada do que os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais curto.
- B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por diversos mecanismos, destacando-se a liberação de enzimas proteolíticas, como as elastases.
- C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de células e pode mediar a vasodilatação e regular o tônus vascular.
- D) As proteínas reactantes da fase aguda são produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na tentativa de manter a homeostasia.

QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à proliferação de células endoteliais.
- B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da permeabilidade vascular, mediada, entre outras, pela serotonina e histamina.
- C) Os leucócitos têm importante papel na remoção de detritos celulares e de bactérias do leito da lesão.
- D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que são responsáveis pela produção de interleucina 1.

QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de hipotensão sem taquicardia concomitante é sinal sugestivo de choque neurogênico.
- B) É característica do choque cardiogênico a redução da perfusão tecidual com volemia adequada.
- C) Gasometria arterial inalterada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo por embolia pulmonar.
- D) São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio, dissecação aguda da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

- I. A associação de lesões aftosas na boca com lesões anais e perianais pode sugerir a presença da doença de Crohn.
- II. É a manifestação clínica que mais frequentemente se associa a doenças do intestino delgado.
- III. Quando a origem é o intestino delgado, as dejeções são pequenas, com número diário muito aumentado, frequentemente com muco, pus e sangue.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa que **NÃO** é considerada causa dessa doença.

- A) Cirurgia abdominal
- B) Hiperlipidemia
- C) Hipocalcemia
- D) Trauma abdominal contuso

QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames complementares e as doenças ou situações que afetam o aparelho respiratório.

COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina
2. Dímero D
3. Dosagem de cloro no suor
4. Espirometria
5. Ultrassonografia

COLUNA II

- () Asma
- () Derrame pleural
- () Embolia pulmonar
- () Enfisema pulmonar
- () Mucoviscidose

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 5 2 1 3
- B) 1 5 3 4 2
- C) 3 1 2 5 4
- D) 5 4 3 1 2

QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes patológicos, apresenta há várias semanas parestesias nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Anemia falciforme
- B) Anemia perniciosa
- C) Esclerose múltipla
- D) Talassemia

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, halo perinuclear e multinucleação.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Infecção por papilomavírus humano
- B) Cervicite crônica bacteriana
- C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
- D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é recorrente. No momento, não apresenta queixas nem sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta: PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m²; mamas e exame ginecológico sem alterações.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a conduta a ser adotada.

- A) Solicitar exames complementares de rotina, como mamografia e ultrassonografia, e manter terapia hormonal até o resultado dos exames.
- B) Manter a terapia hormonal, independentemente dos resultados dos exames, pois a paciente teve diagnóstico de menopausa recentemente.
- C) Orientar a paciente sobre os riscos cardiovasculares da terapia hormonal e suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.
- D) Suspender a terapia hormonal e solicitar ultrassonografia transvaginal de urgência e, somente depois do resultado desse exame, discutir a possibilidade de retorno.

QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com 36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa (1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos cardíofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 2,0 cm.

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e indicar resolução da gestação.
- B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e recomendar controle materno-fetal.
- C) Prescrever Nifedipina via oral associada à Alfametildopa e recomendar controle materno-fetal.
- D) Pedir exames para avaliação da função renal e hepática e recomendar controle materno-fetal.

QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação e o último hemograma apresentou hemoglobina de 11 g/dL, em exame de rotina pré-natal.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Realizar coleta seriada de hemograma e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter orientação dietética considerando o estilo de vida da paciente.
- D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

PEDIATRIA

QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até:

- A) 4 meses.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 24 meses.

QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é **CORRETO** afirmar:

- A) Apesar da simplicidade da utilização da antropometria, a falta de uma curva nacional fez com que o Ministério da Saúde contraindicasse a sua utilização em saúde pública.
- B) Para avaliar o crescimento, a medida da altura é mais importante que a do peso, devido à facilidade de sua obtenção.
- C) A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas de percentil porque são mais fidedignas que as que utilizam escore z.
- D) O acompanhamento da medida de peso e sua localização em um gráfico é uma importante forma de avaliar o crescimento de uma criança.

QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda e com desidratação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar com hidratação endovenosa.
- B) A prescrição de antibióticos é necessária porque a maioria das diarreias agudas é de origem bacteriana.
- C) Na desidratação leve e moderada, na qual não há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação com terapia de reidratação oral.
- D) Em uma criança com diarreia e desidratada, e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é **CORRETO** afirmar que:

- A) todas as crianças após o diagnóstico de pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.
- B) as pneumonias virais são muito raras, por isso, a utilização de antibióticos é tão importante numa criança com quadro respiratório.
- C) a droga de escolha para o tratamento da pneumonia na comunidade é a Penicilina Benzatina, pelo seu baixo custo.
- D) a Amoxicilina é utilizada para tratamento da maioria das pneumonias bacterianas.

SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.
- C) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- D) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.

QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.

Região / ano	2010	2011	2012	2013
Norte	5.289	5.093	5.113	5.163
Nordeste	13.197	3.006	12.527	12.717
Sudeste	4.120	14.172	4.114	13.748
Sul	4.220	4.395	4.238	4.141
Centro-Oeste	3.044	3.050	3.131	3.197
Total	39.870	39.716	39.123	38.966

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É necessário conhecer a estimativa populacional para cada ano (número de óbitos / população x 1 000).
- B) É necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos vivos x 1 000).
- C) É necessário multiplicar o número de óbitos por 100, já que se trata de uma porcentagem (número de óbitos x 100).
- D) É necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em crianças de 0-7 dias).

QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em desenvolvimento vêm apresentando graves problemas relacionados à escassez de recursos financeiros, decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento das questões relativas à incorporação tecnológica desordenada.

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estratégias de enfrentamento incluem avaliações de eficácia / efetividade e custo das tecnologias em saúde.
- II. A avaliação de tecnologias em saúde não influencia a decisão clínica, visto que esta é uma decisão individual.
- III. A avaliação de tecnologias opera somente no campo de saúde pública, uma vez que, no sistema privado, o custo não é um fator limitante para a obtenção de produtos em saúde.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se elevado número de estabelecimentos de saúde privados no Brasil.

De acordo com a Constituição Federal, de que forma ocorre a participação do sistema de saúde privado?

- A) Complementar ao SUS.
- B) Opcional para o SUS.
- C) Compulsório para cidadãos com alto poder aquisitivo.
- D) Obrigatório para empresas.

QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas em prazos pré-estabelecidos.

Sobre esses prazos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 7 (sete) dias úteis.
- B) Consulta nas especialidades médicas (nefrologista, pneumologista, ortopedista): em até 14 (quatorze) dias úteis.
- C) Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis.
- D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias úteis.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-referência de assistência à saúde deve contemplar os seguintes procedimentos, **EXCETO**:

- A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar
- B) Centro de terapia intensiva
- C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental
- D) Tratamento antineoplásico

QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) "a cobrança feita aos beneficiários de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas indevidas".

Disponível em: < <http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf> >.
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa afirmativa se baseia.

- A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 (Integralidade das ações em saúde)
- B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição do plano-referência de assistência à saúde)
- C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 2013 (Dos princípios de atenção à saúde na saúde suplementar)
- D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 2006 (Das infrações a que estão submetidos os planos privados de assistência à saúde)

QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Centrar ações no cuidado médico para evitar falta de integração no cuidado ao paciente.
- B) Incorporar de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal.
- C) Usar a epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde.
- D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando o aumento de sua autonomia.

OTORRINOLARINGOLOGIA

QUESTÃO 30

Considerando-se a doença de Behçet, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É uma vasculite crônica, recorrente e multissistêmica.
- B) É definida por uma tríade clínica: aftas orais, genitais e uveíte de caráter recidivante.
- C) É de etiologia conhecida (virótica).
- D) A conduta terapêutica é semelhante à das úlceras aftoides, enfatizando-se o uso da colchicina nas formas cutaneomucosas e artríticas.

QUESTÃO 31

Em relação às manifestações orais da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a infecção fúngica é a infecção oportunista mais comum nesse grupo de pacientes, ocorrendo em até 95% dos casos.
- B) a infecção fúngica mais encontrada é a candidose oral.
- C) as infecções virais acontecem menos comumente que as fúngicas.
- D) as lesões neoplásicas (sarcoma de Kaposi e linfoma não Hodgkin) não ocorrem na mucosa oral.

QUESTÃO 32

Sobre a mononucleose infecciosa, é **CORRETO** afirmar que:

- A) a mononucleose infecciosa pode ser causada apenas pelo vírus Epstein-Barr.
- B) a bactéria mais comum nesse tipo de infecção é o pneumococo.
- C) a adenopatia cervical ocorre em quase todos os pacientes, envolvendo nódulos cervicais posteriores, o que ajuda a diferenciar de outras infecções.
- D) a hepatoesplenomegalia nunca ocorre.

QUESTÃO 33

Considerando-se a parotidite recorrente na infância, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a caxumba é um diagnóstico diferencial.
- B) é de etiologia indefinida (possui teorias: genéticas, alérgicas, autoimunes e imunodeficiências).
- C) é comum haver reversão do quadro clínico a partir da adolescência.
- D) geralmente ocorre bilateralmente.

QUESTÃO 34

Quanto ao abscesso peritonsilar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Ocorre mais frequentemente no polo inferior das tonsilas palatinas.
- B) São mais frequentes em adultos jovens e adolescentes.
- C) A flora bacteriana desses abscessos é polibacteriana, mista, com anaeróbios e aeróbios.
- D) A sintomatologia é de dor intensa unilateral, com irradiação para orelha, sialorreia, disfagia, voz anasalada, podendo ocorrer trismo.

QUESTÃO 35

Em relação às anomalias congênitas da laringe, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A laringomalácia é a causa mais frequente de estridor inspiratório em lactentes.
- B) A laringomalácia é a malformação congênita laríngea mais comum.
- C) A maioria das crianças com laringomalácia necessita apenas de observação, uma vez que o quadro se resolve em mais de 90% dos casos até os 2 meses de idade.
- D) Estima-se que 10% das crianças com laringomalácia necessitem de intervenção cirúrgica como tratamento (supraglotoplastia).

QUESTÃO 36

No que se refere à papilomatose respiratória recorrente, é **CORRETO** afirmar que:

- A) a papilomatose respiratória recorrente é uma doença de etiologia bacteriana.
- B) ocorre em pacientes de qualquer idade, sendo cerca de dois terços dos pacientes menores de 15 anos.
- C) o tratamento cirúrgico não está indicado.
- D) a disфонia, seguida de obstrução de via aérea e dificuldade respiratória, são sintomas incomuns.

QUESTÃO 37

Considerando-se o edema de Reinke, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Está relacionado ao tabagismo.
- B) As lesões epiteliais que ocorrem nessa patologia estão relacionadas ao tempo de exposição ao cigarro e não ao número de cigarros por dia.
- C) O refluxo laringofaríngeo é considerado outro fator associado, levando à disфонia súbita e progressiva.
- D) O sexo feminino é o mais acometido.

QUESTÃO 38

Em relação ao câncer de laringe, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O tipo histológico mais prevalente, em mais de 90% dos pacientes, é o carcinoma espinocelular, sendo a maioria bem ou moderadamente diferenciada.
- B) Entre os sintomas, os mais comuns são: rouquidão progressiva de vários meses, sensação de corpo estranho na garganta, disfagia, odinofagia, otalgia reflexa, tosse e dispneia (tumores mais volumosos).
- C) Não existe associação desse câncer com infecção viral crônica.
- D) A faixa etária mais acometida está em torno da quinta e sexta décadas de vida.

QUESTÃO 39

Quanto às complicações das otites médias, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O abscesso parafaríngeo é uma complicação extracraniana rara.
- B) O abscesso de Bezold não é complicação das otites médias.
- C) A tromboflebite do seio sigmoide é complicação extracraniana das otites médias.
- D) A meningite é complicação intracraniana rara.

QUESTÃO 40

Sobre a otomicose, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A otomicose pode ser primária ou sobreposta a uma prévia infecção bacteriana crônica da orelha externa ou média.
- B) A utilização de gotas otológicas por período prolongado não modifica o pH e não altera o equilíbrio da flora normal, não podendo ser considerada fator predisponente às infecções oportunistas por fungos.
- C) Pacientes diabéticos ou com imunodeficiências apresentam maior predisposição ao desenvolvimento dessa doença, sendo o *Aspergillus* o agente etiológico mais frequente, seguido por *Candida*.
- D) Em pacientes com imudepressão, nos quais exista uma infecção invasiva, pode ser necessária a utilização de anfotericina B.

QUESTÃO 41

São características que sugerem que uma infecção seja causada por bactérias anaeróbias, **EXCETO**:

- A) Ausência de fetidez.
- B) Tecido necrótico.
- C) Infecção decorrente de mordida humana ou de animal.
- D) Gangrena gasosa.

QUESTÃO 42

Quanto à otite externa necrotizante, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) é uma infecção potencialmente letal que começa usualmente no conduto auditivo externo e se estende à base do crânio, estando associada à morbidade e mortalidade elevadas.
- B) ocorre principalmente em pacientes diabéticos, idosos e com imunodeficiência.
- C) o agente causador é na imensa maioria das vezes pelo *Pseudomonas aeruginosa*, seguida pelo *Streptococcus* e por fungos.
- D) o sintoma mais frequente, em 90% dos casos, é uma otalgia lancinante, resistente ao uso de analgésicos, que se irradia para as regiões frontotemporais e parietais, com piora à noite.

QUESTÃO 43

Em relação ao diagnóstico diferencial de otalgia, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A síndrome de Eagle é uma das causas de otalgia.
- B) A arterite temporal não origina otalgia.
- C) A doença de Ménière é causa frequente de otalgia.
- D) A síndrome de Ramsay-Hunt não é origem de otalgia.

QUESTÃO 44

No que se refere ao pólipos antrocoanal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É também conhecido como pólipo de Killian.
- B) Consiste em tumoração da mucosa nasal benigna, polipoide e bilateral, que atinge principalmente crianças e adolescentes sem predominância de sexo.
- C) Casos com grande acometimento de nasofaringe podem estar associados à obstrução do óstio faríngeo da tuba auditiva, obstrução nasal bilateral e, algumas vezes, projetar-se até a orofaringe.
- D) Os sintomas mais frequentes são obstrução nasal e secreção nasal mucosa ou purulenta.

QUESTÃO 45

Considerando-se os fatores predisponentes para a rinossinusite, é **CORRETO** afirmar que:

- A) o trauma nasal que altera a anatomia (desvio de septo) não é fator predisponente.
- B) a atresia coanal não se enquadra como possível fator predisponente.
- C) a infecção dentária não predispõe à rinossinusite.
- D) as vasculites não podem ser relacionadas aos fatores predisponentes para as rinossinusites.

QUESTÃO 46

Em relação ao nasoangiofibroma juvenil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É um tumor histologicamente benigno, porém agressivo, que invade localmente estruturas adjacentes, podendo invadir a cavidade craniana e o seio cavernoso.
- B) O sintoma mais comum do angiofibroma é o sangramento nasal.
- C) O tratamento do nasoangiofibroma sempre é cirúrgico.
- D) Portadores dessa afecção costumam ser submetidos a tamponamentos, transfusões sanguíneas e internações, antes da resolução definitiva do seu problema.

QUESTÃO 47

Considerando-se a abordagem inicial do paciente com epistaxe, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a maioria das epistaxes é de pequena quantidade e autolimitada.
- B) fatores como tempo de evolução e volume de perda sanguínea, repercussão clínica da hemorragia, idade e estado geral prévio do paciente devem ser considerados.
- C) exames laboratoriais, tais como hematócrito, hemoglobina e estudo da coagulação são indicados rotineiramente.
- D) doenças associadas, tais como rinite alérgica, infecção de vias aéreas superiores, coagulopatia, hipertensão arterial sistêmica, diabetes *mellitus*, insuficiência renal crônica e uso de medicamentos, são informações importantes da história clínica do paciente.

QUESTÃO 48

Em relação aos cuidados pré-operatórios para cirurgia endoscópica dos seios paranasais em rinossinusite crônica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A tomografia computadorizada deve ser analisada cuidadosamente.
- B) É importante suspender medicamentos que alteram a coagulação, como o ácido acetilsalicílico e ginkgo biloba.
- C) Enfatizar a necessidade de revisões e curativos pós-operatórios.
- D) Nos casos reagudizados, não utilizar antibiótico e corticoide oral.

QUESTÃO 49

Quanto à septoplastia, é **CORRETO** afirmar que:

- A) a técnica da maxila-pré-maxila foi desenvolvida por Cottle.
- B) as sinéquias são complicações comuns, porém quando a septoplastia é associada à cirurgia das conchas nasais, elas se tornam menos comuns.
- C) a principal indicação de septoplastia é a rinossinusite de repetição.
- D) apesar de existirem várias técnicas para correção do septo nasal, essa cirurgia deverá ser realizada sempre por apenas uma técnica escolhida previamente pelo cirurgião.

QUESTÃO 50

Sobre as granulomatoses nasais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A doença de Crohn pode acometer o nariz levando a obstrução nasal e a formação de crostas, evoluindo para perfuração septal, nariz em sela e estenose nasal grave.
- B) O rinoescleroma é uma granulomatose de etiologia desconhecida.
- C) A actinomicose tem como agente etiológico mais comum a bactéria *Actinomyces israelii*.
- D) A granulomatose de Wegener é classificada como autoimune.

QUESTÃO 51

Analise as afirmativas a seguir sobre papiloma invertido e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () É um tumor epitelial benigno, mas agressivo localmente, e que pode causar destruição óssea por erosão.
- () Os papilomas invertidos, com frequência, são associados ao carcinoma basocelular.
- () O papiloma invertido está relacionado ao papiloma vírus humano (HPV).
- () O tratamento do papiloma invertido é sempre cirúrgico.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V V F F
- B) V F V V
- C) F V V F
- D) F F V V

QUESTÃO 52

Analise as afirmativas a seguir sobre osteoma dos seios paranasais e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () É a neoplasia benigna mais frequente dos seios paranasais.
- () Trata-se de tumor ósseo de crescimento lento, que é geralmente um achado ocasional de imagem.
- () Acomete principalmente o seio etmoidal.
- () Em caso de acometimento do seio frontal, esses tumores ósseos podem bloquear o recesso frontoetmoidal, causando cefaleia unilateral ou mucocèle, que, eventualmente, pode ter expansão intracraniana e intraorbitária.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V V F V
- B) V F V V
- C) F V V F
- D) F F V F

QUESTÃO 53

Analise as afirmativas a seguir sobre mucocèle dos seios paranasais e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () As mucocèles podem levar anos para se manifestarem depois de um trauma.
- () Os pacientes com mucocèle de seios paranasais muitas vezes são assintomáticos, e o diagnóstico pode ser obtido por achado em exame radiológico da região craniofacial.
- () Deslocamentos do globo ocular, proptose ocular e abaulamentos em região frontal são observados em mucocèles frontoetmoidais.
- () O tratamento da mucocèle é sempre cirúrgico.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) F V F V
- B) V V V V
- C) F V V F
- D) F F V V

QUESTÃO 54

Considerando-se as ações farmacológicas dos anti-inflamatórios hormonais, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) o aumento da resistência à insulina é um dos efeitos fisiológicos.
- B) esse medicamento está associado com uma acentuação do comportamento de euforia.
- C) a ação anti-inflamatória é induzida por estímulos imunológicos, mecânicos e químicos.
- D) os corticoides suprimem apenas a imunidade humoral.

QUESTÃO 55

Analise as afirmativas a seguir sobre tumores da tireoide e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Os nódulos tireoidianos ocorrem com menos frequência em crianças do que em adultos, sendo mais frequentes no sexo feminino.
- () O adenoma folicular é o tumor benigno mais comum.
- () O carcinoma papilífero é o tumor maligno mais comum.
- () Como todos os tumores malignos da tireoide, o carcinoma anaplásico apresenta baixa mortalidade.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) F V F V
- B) V V V V
- C) V V V F
- D) F F V V

QUESTÃO 56

Quanto às paralisias laríngeas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os sintomas mais comumente relacionados à paralisia das pregas vocais na infância são: estridor; cianose; apneia; dificuldade às mamadas, chegando à aspiração; retrações intercostais; disфонia e outras alterações do choro e fala.
- B) Quanto à etiologia, as paralisias laríngeas podem ser subdivididas em congênitas e adquiridas.
- C) As paralisias do nervo laríngeo superior são, em sua maioria, de origem viral ou idiopática, sendo autolimitadas na maioria das vezes.
- D) A grande maioria dos casos de paralisias do nervo laríngeo recorrente é por seqüela de alteração neurológica, trauma cranioencefálico ou por tumores do tórax e mediastino (nesse caso, o lado direito é o mais acometido).

QUESTÃO 57

Em relação à anatomia da orelha externa, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A orelha externa é formada pelo pavilhão da orelha e pelo conduto auditivo interno.
- B) O pavilhão da orelha tem localização privilegiada que o mantém protegido de traumas e variações de temperatura.
- C) A junção das partes cartilaginosa e óssea do CAE (conduto auditivo externo) é estreitada e chama-se istmo.
- D) O conduto auditivo externo é totalmente recoberto por mucosa.

QUESTÃO 58

Corpos estranhos de CAE (conduto auditivo externo) são os mais frequentes na área otorrinolaringológica e têm natureza extremamente variável, englobando desde seres vivos a objetos inorgânicos.

A esse respeito, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Há predomínio desse tipo de corpo estranho na população pediátrica.
- B) Os pais devem ser orientados a sempre tentar remover o corpo estranho em casa e só levar a criança a um atendimento de urgência se houver sangramento persistente ou queixa de surdez.
- C) A cooperação do paciente influencia no sucesso da remoção do corpo estranho otológico.
- D) Possíveis complicações são trauma de orelha externa, otites externas e trauma de membrana timpânica.

QUESTÃO 59

O colesteatoma do conduto auditivo externo e a queratose obliterante têm sido consideradas, nos últimos 20 anos, como entidades distintas, após várias décadas reconhecidas como uma mesma doença.

Sobre as principais diferenças clínicas e diagnósticas entre essas entidades, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A queratose obliterante é mais comum no adulto jovem, enquanto o colesteatoma de conduto auditivo externo é mais frequente nos idosos.
- B) Sinusite e bronquiectasia associam-se a queratose obliterante, enquanto o colesteatoma de conduto auditivo externo não tem nenhuma doença associada.
- C) A osteonecrose está presente usualmente apenas no colesteatoma de conduto auditivo externo.
- D) A pele do conduto auditivo está sempre intacta no colesteatoma de conduto auditivo externo e com ulceração focal na queratose obliterante.

QUESTÃO 60

Em relação aos exames complementares e diagnósticos na otite média aguda, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Na otoscopia, a membrana timpânica encontra-se com hiperemia, opacidade, abaulamento e muita mobilidade nos casos de otite média aguda.
- B) A mobilidade da membrana timpânica pode ser avaliada pela pneumotoscopia.
- C) Não há hiperemia de membrana timpânica sem a ocorrência de otite média aguda bacteriana.
- D) A audiometria e a imitânciometria estão sempre dentro dos padrões da normalidade nas otites médias agudas.

QUESTÃO 61

Analise as afirmativas a seguir sobre otosclerose e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O tratamento da otosclerose tem como objetivo principal melhorar ou manter os limiares auditivos, além do eventual controle de acúfenos e distúrbios vertiginosos.
- () Pacientes que não aceitam a opção de tratamento cirúrgico não podem receber aparelhos de amplificação sonora individual devido ao alto risco de desenvolvimento de PAIR (perda auditiva induzida por ruído).
- () A terapia cirúrgica para a otosclerose é principalmente indicada em pacientes com perda auditiva condutiva ou mista com boa reserva coclear e com boa discriminação auditiva.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F V
- B) V V V
- C) V V F
- D) F V V

QUESTÃO 62

Em relação à presbiacusia, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A presbiacusia é a causa mais comum de surdez progressiva.
- B) É uma das doenças crônicas mais comuns entre adultos de menos de 60 anos de idade.
- C) A otoscopia está sempre alterada nos pacientes com presbiacusia.
- D) O índice de reconhecimento de fala (IRF) é sempre inferior a 60%.

QUESTÃO 63

Analise as afirmativas a seguir sobre zumbido e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O sintoma zumbido é classicamente conceituado como percepção sonora nas orelhas e / ou na cabeça, na ausência de uma fonte externa geradora de som.
- () O zumbido rítmico (muscular ou vascular) comumente tem causas identificáveis e tratáveis.
- () Um importante passo na abordagem do paciente com zumbido crônico e incômodo é a orientação. Fantasias e preocupações a respeito do zumbido devem ser abordadas e esclarecidas.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F V
- B) V V V
- C) V V F
- D) F V V

QUESTÃO 64

As queixas de vertigens e tonturas são muito frequentes no dia a dia do otorrinolaringologista e as vestibulopatias periféricas são as causas mais comuns desses sintomas.

A esse respeito, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As manobras diagnósticas são importantes no diagnóstico da vertigem postural paroxística benigna.
- B) A manobra de Dix-Hallpike pode ser usada para testar a vertigem postural paroxística benigna de canal semicircular posterior.
- C) A cinetose não é uma síndrome relacionada ao sistema vestibular, é um sintoma.
- D) Na migrânea vestibular, a tontura pode variar desde uma clássica vertigem até desequilíbrio e sensação de cabeça vazia.

QUESTÃO 65

Para um tratamento adequado do sintoma “tontura”, é fundamental definir se a causa é vestibular ou não vestibular.

No que se refere ao tratamento medicamentoso da vertigem, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O tratamento medicamentoso é comum nos quadros de migrânea vestibular, doença de Ménière, neuronite vestibular e vertigem postural paroxística benigna.
- B) A migrânea vestibular nunca é tratada pelo otorrinolaringologista, que deve sempre encaminhar para o tratamento com o neurologista os casos suspeitos.
- C) Neuronite vestibular melhora com supressores do labirinto e corticosteroides.
- D) A betaistina não é mais usada no tratamento e prevenção da doença de Ménière.

QUESTÃO 66

O conceito de reabilitação vestibular surgiu a partir da década de 1940, quando Cawthorne e Cooksey sugeriram que o estímulo à deambulação e ao movimento cefálico precoce seriam fundamentais para o alívio mais rápido da vertigem.

Sobre a reabilitação vestibular, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O programa de reabilitação não varia, é sempre o mesmo para todos os pacientes.
- B) A compensação vestibular independe da plasticidade neural.
- C) A manobra de reposicionamento de partículas de Epley é indicada principalmente para os casos de ductolitíase de canal semicircular posterior ou anterior.
- D) A realidade virtual mostrou-se ineficiente no tratamento do paciente vertiginoso.

QUESTÃO 67

Analise as afirmativas a seguir sobre schwannoma VIII nervo e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O quadro típico do schwannoma do VIII nervo é o de hipoacusia unilateral progressiva, acompanhada ou não de zumbido, desequilíbrio e eventuais crises vertiginosas.
- () A paralisia do nervo facial pode surgir tardiamente nos casos de schwannoma do VIII nervo.
- () Meningiomas e tumores epidermóides entram no diagnóstico diferencial de schwannoma do VIII nervo.
- () O tratamento padrão do schwannoma do VIII nervo é a radiocirurgia, sendo sempre contraindicada a cirurgia para a ressecção da lesão.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F V V
- B) V V V F
- C) V V F V
- D) F V V V

QUESTÃO 68

Os antimicrobianos estão presentes na prática clínica do otorrinolaringologista e o conhecimento adequado de seu mecanismo de ação, posologia, efeitos colaterais e toxicidade são fundamentais para a segurança do paciente.

A esse respeito, assinale a **INCORRETA**.

- A) Os betalactâmicos são antimicrobianos bastante seguros e com toxicidade reduzida.
- B) As penicilinas em geral são pouco tóxicas, mas apresentam um potencial de causar reações alérgicas graves e até choque anafilático.
- C) A ototoxicidade dos aminoglicosídeos aumenta com um maior tempo de duração do tratamento.
- D) O levofloxacino é um macrolídeo menos hepatotóxico do que a eritromicina.

QUESTÃO 69

A anatomia da orelha humana é complexa e seu conhecimento é fundamental para o diagnóstico e tratamento adequado em otologia e otoneurologia.

Considerando os ossículos da audição, é **CORRETO** afirmar que:

- A) esses ossículos estão envolvidos na condução das ondas sonoras da orelha interna para a externa.
- B) o martelo é o primeiro e o maior ossículo da cadeia.
- C) é o ramo longo da bigorna que se articula com o estribo.
- D) o estribo é o menor ossículo e é constituído por cabeça, base (platina) e dois ramos.

QUESTÃO 70

Em relação à semiologia otorrinolaringológica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A palpação da orelha externa e da mastoide pode auxiliar na identificação de áreas de flutuação quando há necessidade de drenagem de processo infeccioso.
- B) A ausculta da região auricular, periauricular e cervical auxiliam na avaliação do zumbido pulsátil.
- C) Os testes com diapasão são complexos, pouco sensíveis e de alto custo.
- D) A anamnese é fundamental no diagnóstico das alterações vestibulares.

QUESTÃO 71

O diagnóstico por imagem da cavidade nasal e dos seios paranasais associados a um bom conhecimento da anatomia nasal são fundamentais para o sucesso da cirurgia nasal. O cirurgião deve conhecer a anatomia normal e as variações anatômicas mais comuns e identificá-las sempre que possível por um método de imagem antes do procedimento cirúrgico.

A esse respeito, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O desvio de septo nasal pode ser definido como qualquer desvio da linha média, podendo ser ósseo, cartilágneo ou osteocartilágneo.
- B) A concha média bolhosa é uma das variantes anatômicas mais comuns.
- C) As conchas superiores, médias ou inferiores podem apresentar-se paradoxais, sendo que as superiores são as mais comumente acometidas por essa variante anatômica.
- D) O grau de pneumatização das células do agger nasi pode estreitar o recesso frontal e o óstio do seio frontal, dificultando a drenagem mucosa.

QUESTÃO 72

Em relação à anatomia da face aplicada à cirurgia plástica facial, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Linhas de Langer são linhas naturais da face e relacionam-se com fibras elásticas. São úteis no planejamento dos procedimentos cirúrgicos e na camuflagem de cicatrizes.
- B) Uma extremidade dos músculos faciais insere-se na pele e a outra nos ossos, o que possibilita os movimentos da pele e a formação de sulcos.
- C) Os melhores resultados estéticos acontecem quando as incisões são perpendiculares às linhas de Langer.
- D) SMAS é a abreviatura de sistema musculoponeurótico superficial.

QUESTÃO 73

Uma das medidas antropométricas da face usadas na avaliação estética e no planejamento cirúrgico são os “triângulos estéticos da face”.

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, correlacionando o ângulo com as medidas ideais, segundo a descrição original de Powell e Humphreys.

COLUNA I

1. Ângulo nasofrontal
2. Ângulo nasofacial
3. Ângulo nasomentoniano
4. Ângulo cervicomentoniano

COLUNA II

- () 130°
- () 36°
- () 120°
- () 85°

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 3 2 1 4
- B) 3 2 4 1
- C) 3 4 1 2
- D) 2 3 1 4

QUESTÃO 74

Uma lesão desencadeia uma cascata organizada e complexa de eventos celulares e bioquímicos que resulta em uma ferida cicatrizada.

Sobre a cicatrização, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A primeira fase da cicatrização é a fase exsudativa ou inflamatória (primeiro e segundo dias).
- B) Os neutrófilos são as primeiras células migrantes que se dirigem para a ferida.
- C) A angiogênese pode não ocorrer associada ao processo de cicatrização.
- D) Hematoma e seroma impedem a cicatrização, separando as bordas da ferida.

QUESTÃO 75

São critérios diagnósticos para o transtorno dismórfico corporal, **EXCETO**:

- A) Preocupação excessiva com um defeito mínimo ou imaginário.
- B) Preocupação causa sofrimento importante ou prejudica as atividades sociais ou profissionais.
- C) Recusa a ser submetido a procedimentos estéticos.
- D) Procura por autoafirmação.

QUESTÃO 76

Em relação à hiperplasia tonsilar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As tonsilas palatinas apresentam uma estrutura histológica relacionada com sua função de captação e apresentação de antígenos às células imunocompetentes para produção de imunoglobulinas.
- B) O maior aumento do volume das tonsilas palatinas ocorre na terceira idade (após 65 anos).
- C) Crianças com hiperplasia tonsilar, com obstrução de via respiratória superior, podem apresentar falha no crescimento.
- D) O tratamento mais adequado da hiperplasia tonsilar obstrutiva é cirúrgico.

QUESTÃO 77

Uma massa cervical muitas vezes representa um desafio diagnóstico. Os tumores cervicais têm etiologias diversas.

A respeito dos tumores cervicais benignos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O tratamento do cisto do ducto tireoglosso é cirúrgico.
- B) O glomo é um tumor que se manifesta como uma massa cervical lateral.
- C) As linfadenopatias infecciosas são formas raras de tumoração cervical.
- D) Os lipomas são tumores benignos, encapsulados, compostos por tecido adiposo subcutâneo.

QUESTÃO 78

Ordene sequencialmente as etapas da cirurgia endoscópica dos seios da face no manejo da rinossinusite crônica com ou sem polipose.

- () Vasoconstrição
- () Abordagem do(s) seio(s) a ser operado
- () Uncinectomia e definição da lâmina papirácea
- () Tamponamento ou uso de substância hemostática (caso necessário)
- () Abordagem da concha média e / ou septo nasal

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 1 4 3 5 2
- B) 1 4 5 3 2
- C) 5 4 3 2 1
- D) 1 5 3 4 2

QUESTÃO 79

Sobre as laringites crônicas inespecíficas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A intensidade do sintoma independe do tempo de exposição ao agente agressor.
- B) Na maioria dos casos não afeta a qualidade da voz.
- C) Tem caráter benigno e não está associada a risco de transformação maligna.
- D) O consumo abusivo de cigarro e de álcool está entre os fatores etiológicos da laringite crônica inespecífica.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**