

PEDIATRIA

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 – Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
- 2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
- 3 – Ao receber a **Folha de Respostas**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4 – **ATENÇÃO**: transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5 – Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01 A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02 A B C D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03 A B C D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04 A B C D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (**alíneas a, b, d, h e m**).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br no dia 19 de outubro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **79 (setenta e nove) questões de múltipla escolha** com **4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão**, assim distribuídas: **BLOCO A**: 5 (cinco) questões de **Cooperativismo**, 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria**, 8 (oito) questões de **Saúde Pública e Saúde Suplementar**; **BLOCO B**: 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

BLOCO A

COOPERATIVISMO

QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de médicos, organizadas no formato societário de cooperativas de trabalho médico.
- B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro grau ou singular do Sistema Unimed.
- C) A entidade médica que liderou a formação da Mediminas, que posteriormente passou a ser denominada Unimed BH, foi o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.
- D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A instância máxima de deliberação em uma cooperativa é a Assembleia Geral dos Associados.
- B) O associado poderá ser eliminado da sociedade por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.
- C) A demissão do cooperado – saída voluntária da cooperativa – poderá ser impedida pelos órgãos da administração, caso o trabalho desse cooperado seja indispensável ao bom funcionamento da cooperativa.
- D) A prestação de contas da administração da cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária realizada no primeiro trimestre de cada ano.

QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a organização do setor no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa são democraticamente eleitos pelos associados e funcionários da cooperativa.
- B) A solidariedade, a democracia e a equidade são princípios universais do cooperativismo.
- C) Os fundos de investimento estão impedidos de adquirir parte do capital das cooperativas, ainda que de forma minoritária.
- D) A Confederação Nacional do Cooperativismo (CENCOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) são entidades do cooperativismo brasileiro que compõem o sistema OCB.

QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra os seguintes princípios universais do cooperativismo **EXCETO**:

- A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.
- B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.
- C) As cooperativas são sociedades de pessoas; sociedades essas não sujeitas à falência.
- D) As quotas-partes do capital da sociedade podem ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado por cooperativas singulares, por federações estaduais ou regionais e por uma confederação denominada Unimed do Brasil.
- B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de Cooperados, possui uma Assembleia Geral de Delegados formada por associados eleitos dentro das especialidades médicas.
- C) O Conselho Social da Unimed BH possui função consultiva, discute as macropolíticas e as estratégias da Cooperativa e é formado por delegados, conselheiros e membros do Núcleo de Integração com Cooperados.
- D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde Suplementar no Brasil e estabelece regras para os planos privados de assistência à saúde, exceto para as cooperativas que devem observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Homens com menos de 40 anos de idade, assintomáticos e sem comorbidades, que irão ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem previsão de sangramento, não necessitam de nenhum exame complementar pré-operatório.
- B) A história clínica constitui meio mais efetivo para diagnosticar fatores de risco associados a doenças coexistentes do que o exame físico e os exames complementares.
- C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos os sexos.
- D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a realização pré-operatória de ureia / creatinina, dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.

QUESTÃO 7

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os macrófagos apresentam mobilização mais rápida em direção à área traumatizada do que os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais curto.
- B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por diversos mecanismos, destacando-se a liberação de enzimas proteolíticas, como as elastases.
- C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de células e pode mediar a vasodilatação e regular o tônus vascular.
- D) As proteínas reactantes da fase aguda são produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na tentativa de manter a homeostasia.

QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à proliferação de células endoteliais.
- B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da permeabilidade vascular, mediada, entre outras, pela serotonina e histamina.
- C) Os leucócitos têm importante papel na remoção de detritos celulares e de bactérias do leito da lesão.
- D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que são responsáveis pela produção de interleucina 1.

QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de hipotensão sem taquicardia concomitante é sinal sugestivo de choque neurogênico.
- B) É característica do choque cardiogênico a redução da perfusão tecidual com volemia adequada.
- C) Gasometria arterial inalterada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo por embolia pulmonar.
- D) São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio, dissecação aguda da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

- I. A associação de lesões aftosas na boca com lesões anais e perianais pode sugerir a presença da doença de Crohn.
- II. É a manifestação clínica que mais frequentemente se associa a doenças do intestino delgado.
- III. Quando a origem é o intestino delgado, as dejeções são pequenas, com número diário muito aumentado, frequentemente com muco, pus e sangue.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa que **NÃO** é considerada causa dessa doença.

- A) Cirurgia abdominal
- B) Hiperlipidemia
- C) Hipocalcemia
- D) Trauma abdominal contuso

QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames complementares e as doenças ou situações que afetam o aparelho respiratório.

COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina
2. Dímero D
3. Dosagem de cloro no suor
4. Espirometria
5. Ultrassonografia

COLUNA II

- () Asma
- () Derrame pleural
- () Embolia pulmonar
- () Enfisema pulmonar
- () Mucoviscidose

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 5 2 1 3
- B) 1 5 3 4 2
- C) 3 1 2 5 4
- D) 5 4 3 1 2

QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes patológicos, apresenta há várias semanas parestesias nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Anemia falciforme
- B) Anemia perniciosa
- C) Esclerose múltipla
- D) Talassemia

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, halo perinuclear e multinucleação.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Infecção por papilomavírus humano
- B) Cervicite crônica bacteriana
- C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
- D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é recorrente. No momento, não apresenta queixas nem sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta: PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m²; mamas e exame ginecológico sem alterações.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a conduta a ser adotada.

- A) Solicitar exames complementares de rotina, como mamografia e ultrassonografia, e manter terapia hormonal até o resultado dos exames.
- B) Manter a terapia hormonal, independentemente dos resultados dos exames, pois a paciente teve diagnóstico de menopausa recentemente.
- C) Orientar a paciente sobre os riscos cardiovasculares da terapia hormonal e suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.
- D) Suspender a terapia hormonal e solicitar ultrassonografia transvaginal de urgência e, somente depois do resultado desse exame, discutir a possibilidade de retorno.

QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com 36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa (1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos cardíofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 2,0 cm.

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e indicar resolução da gestação.
- B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e recomendar controle materno-fetal.
- C) Prescrever Nifedipina via oral associada à Alfametildopa e recomendar controle materno-fetal.
- D) Pedir exames para avaliação da função renal e hepática e recomendar controle materno-fetal.

QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação e o último hemograma apresentou hemoglobina de 11 g/dL, em exame de rotina pré-natal.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Realizar coleta seriada de hemograma e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter orientação dietética considerando o estilo de vida da paciente.
- D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

PEDIATRIA

QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até:

- A) 4 meses.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 24 meses.

QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é **CORRETO** afirmar:

- A) Apesar da simplicidade da utilização da antropometria, a falta de uma curva nacional fez com que o Ministério da Saúde contraindicasse a sua utilização em saúde pública.
- B) Para avaliar o crescimento, a medida da altura é mais importante que a do peso, devido à facilidade de sua obtenção.
- C) A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas de percentil porque são mais fidedignas que as que utilizam escore z.
- D) O acompanhamento da medida de peso e sua localização em um gráfico é uma importante forma de avaliar o crescimento de uma criança.

QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda e com desidratação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar com hidratação endovenosa.
- B) A prescrição de antibióticos é necessária porque a maioria das diarreias agudas é de origem bacteriana.
- C) Na desidratação leve e moderada, na qual não há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação com terapia de reidratação oral.
- D) Em uma criança com diarreia e desidratada, e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é **CORRETO** afirmar que:

- A) todas as crianças após o diagnóstico de pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.
- B) as pneumonias virais são muito raras, por isso, a utilização de antibióticos é tão importante numa criança com quadro respiratório.
- C) a droga de escolha para o tratamento da pneumonia na comunidade é a Penicilina Benzatina, pelo seu baixo custo.
- D) a Amoxicilina é utilizada para tratamento da maioria das pneumonias bacterianas.

SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.
- C) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- D) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.

QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.

Região / ano	2010	2011	2012	2013
Norte	5.289	5.093	5.113	5.163
Nordeste	13.197	3.006	12.527	12.717
Sudeste	4.120	14.172	4.114	13.748
Sul	4.220	4.395	4.238	4.141
Centro-Oeste	3.044	3.050	3.131	3.197
Total	39.870	39.716	39.123	38.966

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É necessário conhecer a estimativa populacional para cada ano (número de óbitos / população x 1 000).
- B) É necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos vivos x 1 000).
- C) É necessário multiplicar o número de óbitos por 100, já que se trata de uma porcentagem (número de óbitos x 100).
- D) É necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em crianças de 0-7 dias).

QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em desenvolvimento vêm apresentando graves problemas relacionados à escassez de recursos financeiros, decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento das questões relativas à incorporação tecnológica desordenada.

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estratégias de enfrentamento incluem avaliações de eficácia / efetividade e custo das tecnologias em saúde.
- II. A avaliação de tecnologias em saúde não influencia a decisão clínica, visto que esta é uma decisão individual.
- III. A avaliação de tecnologias opera somente no campo de saúde pública, uma vez que, no sistema privado, o custo não é um fator limitante para a obtenção de produtos em saúde.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se elevado número de estabelecimentos de saúde privados no Brasil.

De acordo com a Constituição Federal, de que forma ocorre a participação do sistema de saúde privado?

- A) Complementar ao SUS.
- B) Opcional para o SUS.
- C) Compulsório para cidadãos com alto poder aquisitivo.
- D) Obrigatório para empresas.

QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas em prazos pré-estabelecidos.

Sobre esses prazos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 7 (sete) dias úteis.
- B) Consulta nas especialidades médicas (nefrologista, pneumologista, ortopedista): em até 14 (quatorze) dias úteis.
- C) Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis.
- D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias úteis.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-referência de assistência à saúde deve contemplar os seguintes procedimentos, **EXCETO**:

- A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar
- B) Centro de terapia intensiva
- C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental
- D) Tratamento antineoplásico

QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) "a cobrança feita aos beneficiários de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas indevidas".

Disponível em: < <http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf> >.
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa afirmativa se baseia.

- A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 (Integralidade das ações em saúde)
- B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição do plano-referência de assistência à saúde)
- C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 2013 (Dos princípios de atenção à saúde na saúde suplementar)
- D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 2006 (Das infrações a que estão submetidos os planos privados de assistência à saúde)

QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Centrar ações no cuidado médico para evitar falta de integração no cuidado ao paciente.
- B) Incorporar de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal.
- C) Usar a epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde.
- D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando o aumento de sua autonomia.

PEDIATRIA**QUESTÃO 30**

Em relação à mortalidade infantil no Brasil, sabe-se que tem havido uma queda acentuada nos últimos 20 anos e que isso ocorreu principalmente devido à diminuição da mortalidade pós-neonatal.

Considerando esse contexto, esse fato ocorreu devido:

- A) à melhora no cuidado pré-natal e ao recém-nascido.
- B) ao aumento das doenças congênitas na população infantil.
- C) à melhora de condições de vida da população, como, por exemplo, o aumento do acesso ao saneamento básico.
- D) a uma queda acentuada nos óbitos por causas externas.

QUESTÃO 31

No que se refere à mortalidade infantil brasileira, sabe-se que, apesar da queda acentuada que ocorreu nos últimos 20 anos, esta poderia ter sido maior, pois o componente neonatal da mortalidade infantil ainda permanece alto, considerando a condição econômica do país.

Considerando esse contexto, esse fato ocorre devido:

- A) à falta de acesso ao cuidado pré-natal e ao recém-nascido de qualidade para uma grande parcela da população do país.
- B) ao aumento das doenças congênitas na população infantil.
- C) à piora das condições de vida da população nos últimos anos.
- D) a um aumento nos óbitos por causas externas.

QUESTÃO 32

Quanto à avaliação antropométrica do crescimento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O índice peso/estatura é obtido pela divisão do peso pela altura.
- B) O índice peso/estatura é um bom indicador da desnutrição crônica.
- C) A avaliação longitudinal do ganho ponderal é avaliação do peso em uma medida única.
- D) A relação estatura/idade informa sobre a cronicidade do processo.

QUESTÃO 33

Sobre as curvas da Organização Mundial de Saúde, hoje utilizadas na Caderneta da Criança do Ministério da Saúde, pode-se afirmar que:

- A) o seu principal problema é o número excessivo de crianças em aleitamento artificial, o que incluiu um grande número de crianças obesas.
- B) a amostra utilizada incluiu uma grande diversidade étnica e racial.
- C) o Brasil não foi incluído na amostra devido a sua grande diversidade regional.
- D) nenhum país da Europa foi incluído devido à pouca heterogeneidade étnica e racial do continente.

QUESTÃO 34

São fatores anti-infecciosos presentes na composição do leite materno, **EXCETO**:

- A) IgA secretora.
- B) Leucócitos.
- C) Lactoferrina.
- D) Beta-Lactoalbumina.

QUESTÃO 35

O aleitamento materno exclusivo está indicado do nascimento até os 6 meses de idade. A partir do sexto mês, deve-se iniciar com a alimentação complementar.

A esse respeito, pode-se afirmar que:

- A) a fórmula láctea pode ser introduzida, pois não há mais necessidade de aleitamento materno exclusivo.
- B) deve-se introduzir a carne rapidamente (no sexto mês) devido ao risco de anemia ferropriva das crianças amamentadas.
- C) a introdução do açúcar é fundamental para complementar a alimentação do ponto de vista calórico.
- D) o aleitamento materno deve continuar até dois anos, segundo a orientação da OMS.

QUESTÃO 36

Quanto à composição do leite materno (LM) em relação a do leite de vaca (LV), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A quantidade de água do LM é maior que no LV, o que faz com que crianças em aleitamento materno exclusivo não necessitem beber água.
- B) Apesar da maior quantidade de proteínas no LV em relação ao LM, o seu valor biológico é baixo, pois a alta proporção de caseína no LV torna a sua digestão mais difícil.
- C) A maior quantidade de proteínas no LM lhe confere um alto valor biológico, devido à maior proporção de seroalbuminas presente.
- D) Apesar da quantidade semelhante de gorduras no LM e no LV, a maior proporção de ácidos graxos saturados no LM melhora o seu valor biológico.

QUESTÃO 37

Segundo a determinação do Ministério da Saúde, uma criança de 12 meses deverá ter recebido as seguintes vacinas, **EXCETO**:

- A) 1 dose de vacina BCG intradérmica
- B) 3 doses de vacina hepatite A
- C) 3 doses de vacina pentavalente (DTP + haemophilus B + hepatite B)
- D) 1 dose de febre amarela

QUESTÃO 38

No que se refere às vacinas, segundo o Ministério da Saúde, um adolescente:

- A) deve receber duas doses de hepatite B, caso tenha recebido somente uma anteriormente.
- B) não necessita de nenhum reforço, se tiver recebido o esquema básico das vacinas contra difteria e tétano anteriormente.
- C) não necessita da vacina contra o HPV, pois esta não é incluída no calendário de vacinação por ser totalmente dispensável.
- D) deve receber, em caso de mordedura de cachorro, vacina contra raiva, independente da condição do animal.

QUESTÃO 39

Em relação à vacina BCG, pode-se afirmar que:

- A) deve ser aplicada mesmo em recém-nascidos com peso inferior a 2.000 gramas.
- B) é composta por antígenos do *Mycobacterium tuberculosis*, protegendo contra todas as formas de tuberculose na infância.
- C) no Brasil, não é mais recomendada a segunda dose para a profilaxia da tuberculose em crianças e adolescentes.
- D) é administrada por via intramuscular.

QUESTÃO 40

Considerando os distúrbios nutricionais e sua clínica correlacione a COLUNA II com a COLUNA I.

COLUNA I

1. Hepatomegalia
2. Craniotabes
3. Hemorragias cutâneas
4. Mancha de Bitot

COLUNA II

- () Carência de vitamina D
- () Carência de vitamina C
- () Carência de vitamina A
- () Kwashiorkor

Assinale a sequência **CORRETA**:

- A) 4 1 2 3
- B) 2 3 4 1
- C) 4 3 1 2
- D) 2 1 3 4

QUESTÃO 41

Em relação à criança desnutrida, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Deve receber todas as vacinas, exceto as de vírus vivos.
- B) Pode apresentar níveis séricos de glicose baixos.
- C) Tem sódio total aumentado e potássio sérico diminuído.
- D) Tem volume de água corporal total aumentado.

QUESTÃO 42

A obesidade é considerada hoje uma epidemia mundial na infância e na adolescência, e muitas crianças e adolescentes obesos podem apresentar alterações metabólicas.

Quanto à sua avaliação, é **INCORRETO** afirmar:

- A) É necessária a existência de dislipidemia para identificação da obesidade.
- B) O IMC é considerado hoje a melhor alternativa clínica para a avaliação da obesidade.
- C) A utilização da medida da circunferência abdominal é um método auxiliar na avaliação da obesidade.
- D) Para avaliar-se a obesidade, utilizam-se índices antropométricos e valores críticos em escore Z.

QUESTÃO 43

Em relação à desidratação, analise as afirmativas a seguir.

- I. Uma perda aguda de água e eletrólitos em uma criança, com conseqüente desidratação, pode assumir caráter grave devido a maior tendência à hidrolabilidade da criança.
- II. Na desidratação de primeiro grau, ocorre uma perda de 15% a 25% do peso corpóreo; na desidratação de segundo grau, ocorre uma perda de 25% a 40% do peso corpóreo; e na desidratação de terceiro grau, ocorre uma perda de 40% ou mais do peso corpóreo.
- III. No desnutrido grave, a diurese pode manter-se mesmo com desidratação, por incapacidade de concentrar a urina.
- IV. A desidratação hipertônica ou hipernatrêmica é também conhecida como desidratação do extracelular.

Estão **INCORRETAS** as afirmativas:

- A) I e IV, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.

QUESTÃO 44

Assinale a alternativa que apresenta a situação em que a terapia de reidratação oral (TRO) poderá ser indicada.

- A) Choque
- B) Vômitos
- C) Íleo paralítico
- D) Alteração do sensório

QUESTÃO 45

Em relação à desidratação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Sinal de choque é precoce na desidratação hipertônica e tardio na hipotônica.
- B) Na desidratação hipernatrêmica, o sódio sérico encontra-se acima de 150 mEq/L, e ela também é conhecida como desidratação do extracelular.
- C) Entre os sinais de desidratação hiponatrêmica, evidenciam-se apatia, sensação de fraqueza, hipotonia muscular, anorexia, náuseas e vômitos.
- D) Geralmente a obesidade é uma condição que não induz ao erro na avaliação da desidratação.

QUESTÃO 46

Na adolescência, entre outras transformações, pode-se considerar que a sexualidade adquire um papel fundamental na compreensão dos fenômenos que ocorrem nessa faixa etária. Sendo assim, o pediatra deve levar em consideração esse item na abordagem clínica do adolescente.

Considerando esse contexto, assinale a alternativa que expressa um modo adequado de abordagem.

- A) A condução da consulta deve dar-se exclusivamente por entrevista com o adolescente.
- B) O discurso da mãe ou acompanhante deve ser considerado também para melhor compreensão do ambiente psicossocial do paciente.
- C) O exame clínico dos caracteres sexuais secundários tem de ser feito, mesmo que o adolescente não deseje, devido à sua importância para a compreensão da fase de desenvolvimento puberal do mesmo.
- D) Devido ao caráter estritamente pessoal do desenvolvimento sexual, este somente deverá ser abordado após o pediatra perceber que conquistou a confiança do adolescente.

QUESTÃO 47

São diagnósticos que devem ser considerados em recém-nascido com 12 horas de vida que apresenta icterícia, **EXCETO**:

- A) Incompatibilidade ABO.
- B) Incompatibilidade Rh.
- C) Esferocitose.
- D) Drepanocitose.

QUESTÃO 48

Considera-se recém-nascido (RN) baixo peso:

- A) aquele cujo peso fica abaixo do percentil 10 para a idade gestacional.
- B) os que pesam menos de 2.500 g.
- C) apenas os que pesam menos de 1.500 g.
- D) todos os RN prematuros.

QUESTÃO 49

Em relação às anemias, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A bilirrubina direta está sempre aumentada na esferocitose.
- B) Na anemia ferropriva, a contagem reticulocitária é alta.
- C) O agente mais comumente encontrado nas infecções em drepanocíticos é o pneumococo.
- D) O leite de vaca provoca anemia megaloblástica.

QUESTÃO 50

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, correlacionando as principais doenças exantemáticas com seu quadro clínico típico.

COLUNA I

1. Exantema maculopapular, atingindo face, tronco e membros em período de 24 a 48 horas.
2. Exantema papulovesiculoso, com concentração no tronco e polimorfismo regional.
3. Exantema morbiliforme em todo o corpo, com início atrás da orelha e pescoço. Febre alta. Fenômenos catarrais.
4. Febre desaparece quando surge o exantema.

COLUNA II

- () Exantema súbito
- () Varicela
- () Sarampo
- () Rubéola

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 1 2 3 4
- B) 4 3 2 1
- C) 4 2 3 1
- D) 1 3 2 4

QUESTÃO 51

Em relação ao diagnóstico da dengue hemorrágica, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) em geral, inicia-se como a dengue clássica.
- B) os fenômenos hemorrágicos surgem no segundo ou terceiro dias.
- C) entre as alterações laboratoriais estão plaquetopenia e elevação do hematócrito.
- D) o choque está presente na quase totalidade dos casos.

QUESTÃO 52

Em relação ao diagnóstico e tratamento da dengue, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Em situações de epidemia, qualquer quadro febril indefinido deve ser diagnosticado como dengue.
- B) Se a prova do laço estiver negativa, deve-se afastar o diagnóstico de dengue.
- C) Em caso de febre, deve-se evitar o uso de salicilatos e dipirona.
- D) Devido à necessidade de manter a criança hidratada, inicialmente deve-se usar a hidratação venosa.

QUESTÃO 53

Sobre o sarampo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As manchas de Koplik estão sempre presentes.
- B) A contagiosidade vai do período prodromico até o exantemático, podendo durar de oito a 10 dias.
- C) As complicações incluem pneumonia, otite média e encefalite.
- D) A imunização tanto ativa quanto passiva podem prevenir a doença.

QUESTÃO 54

Em relação às doenças exantemáticas, é **CORRETO** afirmar que:

- A) no sarampo a febre cai com o aparecimento do exantema.
- B) o exantema súbito é caracterizado por um período prodromico com picos febris de temperaturas muito elevadas.
- C) a escarlatina é caracterizada por um exantema maculopapular mais acentuado nas dobras e região perioral.
- D) a varicela é uma doença viral cujo agente está também associado ao herpes genital.

QUESTÃO 55

Quanto às anemias, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Ferropriva: mais comum em nosso meio.
- B) Drepanocitose: mais comum na raça negra.
- C) Esferocitose: tratada com esplenectomia.
- D) Beta-talassemia: hemoglobina fetal aumentada.

QUESTÃO 56

Com relação à anemia ferropriva, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) é a causa mais frequente de anemia, principalmente na faixa de 6 meses a 2 anos de idade.
- B) na faixa etária 6 meses a 2 anos, a alimentação predominantemente láctea fornece quantidade insuficiente de ferro para manter a expansão acelerada da massa eritrocitária.
- C) o uso exclusivo de leite materno supre as necessidades de ferro do recém-nascido pré-termo até 6 meses de vida.
- D) para prevenção da anemia ferropriva, é importante o uso de ferro profilático em lactentes em aleitamento misto ou artificial a partir do desmame.

QUESTÃO 57

No que se refere a anemias hemolíticas, é **CORRETO** afirmar que:

- A) evidencia-se aumento de reticulócitos e de bilirrubina direta.
- B) a anemia falciforme é caracterizada pela presença de hemoglobina fetal.
- C) na esferocitose hereditária, a hemólise ocorre em situação de baixa oxigenação.
- D) na talassemia, a produção de hemoglobina normal está alterada.

QUESTÃO 58

Em relação à diarreia aguda, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A melhoria das condições higiênicas da população, o adequado suprimento de água e saneamento básico, o incentivo ao aleitamento materno são medidas profiláticas para o controle da diarreia.
- B) Ao internar uma criança com diarreia aguda, é fundamental a determinação do agente etiológico para o sucesso terapêutico.
- C) Em situações normais, o organismo dispõe de mecanismos de defesa que tornam os processos infecciosos intestinais autolimitados na maioria das vezes.
- D) O uso da terapia de reidratação oral (TRO) nos casos de diarreia aguda baseia-se no conhecimento de que, mesmo durante a diarreia, o intestino é capaz de absorver água e eletrólitos.

QUESTÃO 59

Quanto às medidas recomendadas na assistência a um lactente com diarreia aguda, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Sempre administrar antieméticos se houver vômito.
- B) Suspender o leite materno se houver vômito.
- C) Administrar soro, mesmo na presença de vômito.
- D) Sempre administrar adstringentes intestinais.

QUESTÃO 60

Quanto às diarreias crônicas, é **CORRETO** afirmar que:

- A) o teste do suor e a dosagem de gordura fecal estão alterados na doença celíaca.
- B) a biópsia jejunal mostra atrofia de vilosidades na doença celíaca.
- C) a biópsia jejunal está alterada nos casos de fibrose cística.
- D) o teste do suor e a dosagem de gordura fecal não estão alterados na fibrose cística.

QUESTÃO 61

Para confirmação diagnóstica da suspeita de fibrose cística, o exame de escolha é:

- A) dosagem de eletrólitos no suor.
- B) dosagem de IgE sérica.
- C) biópsia jejunal.
- D) exame parasitológico de fezes.

QUESTÃO 62

Considere o caso clínico a seguir.

Criança de 1 ano de idade com história de diarreia há 4 meses com fezes semipastosas, amarelo-palha, volumosas e espumosas, de duas a três vezes ao dia, comparece ao atendimento. Segundo seus pais, na história alimentar: leite materno exclusivo por dois meses, quando iniciou leite de vaca com amido de milho a 5% e açúcar a 3%; aos 3 meses de idade, introduziu frutas e sopinha de legumes com macarrão e carne três vezes por semana. Nega doenças anteriores. Ao exame: peso em escore Z menor do que -2 e altura no escore Z menor do que -1. Criança irritada, hidratada, palidez mucosa cutânea. Musculatura hipotrófica principalmente nos membros inferiores e glúteos. Eupneica, murmúrio vesicular fisiológico. Bulhas rítmicas e normofonéticas. Abdômen distendido sem visceromegalias.

Diante desse quadro, a principal hipótese diagnóstica é:

- A) intolerância secundária à lactose.
- B) alergia ao leite de vaca.
- C) fibrose cística.
- D) doença celíaca.

QUESTÃO 63

Quanto às infecções de vias aéreas superiores, é **CORRETO** afirmar que:

- A) as bactérias são a causa mais comum.
- B) não existe influência sazonal nas diversas etiologias.
- C) os descongestionantes sistêmicos (vasoconstritores) devem ser prescritos de rotina, porque uma das medidas fundamentais é melhorar a ventilação do ouvido médio e dos seios.
- D) o uso de antibióticos deve ser feito quando houver suspeita clara de infecção bacteriana.

QUESTÃO 64

Qual é o principal agente causador da bronquiolite?

- A) Rotavírus.
- B) Vírus sincicial respiratório.
- C) Coxsackievírus.
- D) Herpes-vírus.

QUESTÃO 65

São alterações radiológicas da bronquiolite, **EXCETO**:

- A) Derrame pleural.
- B) Hiperinsuflação.
- C) Espessamento peribrônquico.
- D) Consolidação.

QUESTÃO 66

Com relação à asma brônquica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Deve-se pensar em asma em crianças ou adolescentes com episódios de sibilância recorrente.
- B) Define-se como asma de difícil controle os casos com asma intermitente grave e que requerem internação com frequência.
- C) No exame físico, predominam taquipneia, tiragem intercostal e diafragmática, dispneia, e, na ausculta, sibilos, roncos e diminuição variável do murmúrio vesicular.
- D) O diagnóstico diferencial inclui malformações congênitas pulmonares, tumores do mediastino, corpo estranho, mucoviscidose, tuberculose.

QUESTÃO 67

No que diz respeito às pneumonias comunitárias, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Em todas as crianças, exceto no RN, o agente bacteriano mais comum é o pneumococo.
- B) Macrolídeo é o antibiótico de escolha na pneumonia por *Mycoplasma*.
- C) As pneumonias virais, por não serem graves, nunca exigem internação.
- D) O derrame pleural apresenta macicez à percussão e frêmito toracovocal aumentado.

QUESTÃO 68

No tratamento das pneumonias, é **CORRETO** afirmar que:

- A) a droga de escolha inicial é amoxicilina com clavulanato.
- B) a pneumonia por *Mycoplasma pneumoniae* é tratada com penicilina.
- C) são usados antimicrobianos nas pneumonias viróticas para prevenir as infecções bacterianas.
- D) a maioria das crianças com pneumonia pode ser tratada ambulatorialmente.

QUESTÃO 69

A profilaxia da doença reumática pode ser feita com os antibióticos a seguir, **EXCETO**:

- A) Penicilina.
- B) Cloranfenicol.
- C) Eritromicina.
- D) Clindamicina.

QUESTÃO 70

Considere o caso clínico a seguir.

Um pediatra atende um lactente de três meses no centro de saúde e constata que a criança se mantém no escore -1 de peso e +1 de comprimento. A mãe oferece o seio a cada duas horas, mas o lactente tem dificuldade em sugar. Ao exame, observa ausência de cianose, pulsos universalmente palpáveis, desconforto respiratório leve e fígado palpável a 3 cm do rebordo costal direito. À ausculta cardíaca, sopro sistólico grau IV, mais bem audível em borda esternal esquerda baixa, irradiado para borda esternal direita e ponta.

Frente a esse quadro, a principal hipótese diagnóstica é:

- A) transposição dos grandes vasos da base.
- B) CIA.
- C) CIV.
- D) tetralogia de Fallot.

QUESTÃO 71

Considere o caso clínico a seguir.

Lactente de 12 meses dá entrada na emergência apresentando crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas desde que foi trazido de casa, no colo da mãe, em automóvel comum. Inconsciente, com febre de 38,5° C, pressão arterial, pulsos e frequência cardíaca normais.

A esse respeito, a conduta inicial imediata a ser adotada é:

- A) dipirona, oxigenoterapia e aplicação de diazepam intravenoso.
- B) dipirona, oxigenoterapia e reposição volêmica.
- C) dipirona, reposição volêmica e aplicação de diazepam intravenoso.
- D) dipirona, reposição volêmica, oxigenoterapia e aplicação de diazepam intravenoso.

QUESTÃO 72

Em relação às cefaleias em crianças e adolescentes, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A enxaqueca é uma cefaleia crônica caracteristicamente pulsátil.
- B) A queixa de interrupção de atividades, principalmente lúdicas, constitui parâmetro importante na averiguação da queixa de cefaleia em crianças.
- C) A enxaqueca é frequentemente bilateral e a cefaleia tensional caracteristicamente unilateral.
- D) A enxaqueca frequentemente se associa com história familiar positiva para a referida doença.

QUESTÃO 73

Quanto às meningites bacterianas, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) no liquor são características hiper celularidade, glicose baixa e proteínas aumentadas.
- B) o exame de liquor normal exclui a etiologia bacteriana.
- C) está indicado o uso profilático de rifampicina nos contatos de meningite por hemófilo.
- D) os agentes etiológicos mais frequentes são o meningococo e o pneumococo.

QUESTÃO 74

O diabetes *mellitus* é uma doença com alta prevalência na população. O diabetes tipo 1 ocorre classicamente em crianças e adolescentes.

Quanto ao diagnóstico da doença, é **CORRETO** afirmar que ele:

- A) é exclusivamente clínico.
- B) é exclusivamente laboratorial.
- C) não pode ser feito sem a hemoglobina glicada.
- D) é frequentemente suspeitado pela clínica e confirmado pela glicemia.

QUESTÃO 75

Com relação à infecção do trato urinário (ITU), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Nos RNs e lactentes jovens, a ITU pode se manifestar por hipoatividade, choro fraco, icterícia, emagrecimento ou peso estacionário, febre de origem indeterminada ou hipotermia.
- B) A presença de vulvovaginite ou balanopostite ou sinéquia de pequenos lábios pode simular ITU e alterar o resultado do exame de urina, mostrando piúria e / ou bacteriúria.
- C) As bactérias Gram negativas (*E. coli* em 90% a 95% dos casos) são os principais agentes da infecção urinária.
- D) As infecções do trato urinário nos RNs ocorrem com maior frequência por disseminação hematogênica e acometem mais as crianças do sexo feminino.

QUESTÃO 76

Em relação aos exames para diagnóstico da infecção do trato urinário (ITU), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A presença de bactérias Gram negativas no exame da gota de urina não centrifugada, corada pelo Gram, correlaciona-se fortemente com uma urocultura positiva.
- B) A piúria é considerada presente quando são encontrados, em urina centrifugada, mais de cinco piócitos por campo nas meninas e mais de 10 por campo nos meninos.
- C) A presença de flora mista (duas ou mais bactérias diferentes) na urocultura não lança dúvidas quanto à confiabilidade do exame e, nesses casos, ele não deve ser repetido.
- D) Na urocultura, o número de colônias inferior a 100 mil/mL é considerado negativo.

QUESTÃO 77

Em relação à glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica (GNDAPE), é **CORRETO** afirmar que:

- A) em geral encontra-se amigdalite na vigência do quadro.
- B) o complemento sérico está em geral aumentado.
- C) o exame de urina revela hematúria e hemoglobinúria em praticamente todos os casos.
- D) edema por hipoproteïnemia e hipertensão por hipervolemia são características importantes.

QUESTÃO 78

Sobre a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica (GNDAPE), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A presença de proteinúria maciça, além do período agudo, indica a possibilidade de outra glomerulopatia.
- B) Sempre está indicada a biópsia renal, mesmo nos quadros típicos, pois há necessidade de identificação do tipo histológico para estabelecer o prognóstico.
- C) Se ocorrer hipertensão arterial, sempre é necessário internar a criança.
- D) É mais frequente no primeiro ano de vida.

QUESTÃO 79

No que se refere ao diagnóstico e tratamento da síndrome nefrótica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hematúria microscópica está sempre ausente.
- B) A proteinúria é elevada em urina de 24 horas, podendo ultrapassar 10 g/dia.
- C) O uso de diurético não é indicado na maioria dos casos.
- D) As internações devem ser evitadas e raramente são necessárias.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**