

RADIOLOGIA / DIAGNÓSTICO IMAGEM

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 – Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
- 2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
- 3 – Ao receber a **Folha de Respostas**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4 – **ATENÇÃO**: transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5 – Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01 A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02 A B C D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03 A B C D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04 A B C D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (**alíneas a, b, d, h e m**).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br no dia 19 de outubro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **79 (setenta e nove) questões de múltipla escolha** com **4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão**, assim distribuídas: **BLOCO A**: 5 (cinco) questões de **Cooperativismo**, 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria**, 8 (oito) questões de **Saúde Pública e Saúde Suplementar**; **BLOCO B**: 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

BLOCO A

COOPERATIVISMO

QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de médicos, organizadas no formato societário de cooperativas de trabalho médico.
- B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro grau ou singular do Sistema Unimed.
- C) A entidade médica que liderou a formação da Mediminas, que posteriormente passou a ser denominada Unimed BH, foi o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.
- D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A instância máxima de deliberação em uma cooperativa é a Assembleia Geral dos Associados.
- B) O associado poderá ser eliminado da sociedade por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.
- C) A demissão do cooperado – saída voluntária da cooperativa – poderá ser impedida pelos órgãos da administração, caso o trabalho desse cooperado seja indispensável ao bom funcionamento da cooperativa.
- D) A prestação de contas da administração da cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária realizada no primeiro trimestre de cada ano.

QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a organização do setor no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa são democraticamente eleitos pelos associados e funcionários da cooperativa.
- B) A solidariedade, a democracia e a equidade são princípios universais do cooperativismo.
- C) Os fundos de investimento estão impedidos de adquirir parte do capital das cooperativas, ainda que de forma minoritária.
- D) A Confederação Nacional do Cooperativismo (CENCOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) são entidades do cooperativismo brasileiro que compõem o sistema OCB.

QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra os seguintes princípios universais do cooperativismo **EXCETO**:

- A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.
- B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.
- C) As cooperativas são sociedades de pessoas; sociedades essas não sujeitas à falência.
- D) As quotas-partes do capital da sociedade podem ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado por cooperativas singulares, por federações estaduais ou regionais e por uma confederação denominada Unimed do Brasil.
- B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de Cooperados, possui uma Assembleia Geral de Delegados formada por associados eleitos dentro das especialidades médicas.
- C) O Conselho Social da Unimed BH possui função consultiva, discute as macropolíticas e as estratégias da Cooperativa e é formado por delegados, conselheiros e membros do Núcleo de Integração com Cooperados.
- D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde Suplementar no Brasil e estabelece regras para os planos privados de assistência à saúde, exceto para as cooperativas que devem observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Homens com menos de 40 anos de idade, assintomáticos e sem comorbidades, que irão ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem previsão de sangramento, não necessitam de nenhum exame complementar pré-operatório.
- B) A história clínica constitui meio mais efetivo para diagnosticar fatores de risco associados a doenças coexistentes do que o exame físico e os exames complementares.
- C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos os sexos.
- D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a realização pré-operatória de ureia / creatinina, dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.

QUESTÃO 7

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os macrófagos apresentam mobilização mais rápida em direção à área traumatizada do que os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais curto.
- B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por diversos mecanismos, destacando-se a liberação de enzimas proteolíticas, como as elastases.
- C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de células e pode mediar a vasodilatação e regular o tônus vascular.
- D) As proteínas reactantes da fase aguda são produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na tentativa de manter a homeostasia.

QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à proliferação de células endoteliais.
- B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da permeabilidade vascular, mediada, entre outras, pela serotonina e histamina.
- C) Os leucócitos têm importante papel na remoção de detritos celulares e de bactérias do leito da lesão.
- D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que são responsáveis pela produção de interleucina 1.

QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de hipotensão sem taquicardia concomitante é sinal sugestivo de choque neurogênico.
- B) É característica do choque cardiogênico a redução da perfusão tecidual com volemia adequada.
- C) Gasometria arterial inalterada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo por embolia pulmonar.
- D) São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio, dissecação aguda da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

- I. A associação de lesões aftosas na boca com lesões anais e perianais pode sugerir a presença da doença de Crohn.
- II. É a manifestação clínica que mais frequentemente se associa a doenças do intestino delgado.
- III. Quando a origem é o intestino delgado, as dejeções são pequenas, com número diário muito aumentado, frequentemente com muco, pus e sangue.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa que **NÃO** é considerada causa dessa doença.

- A) Cirurgia abdominal
- B) Hiperlipidemia
- C) Hipocalcemia
- D) Trauma abdominal contuso

QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames complementares e as doenças ou situações que afetam o aparelho respiratório.

COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina
2. Dímero D
3. Dosagem de cloro no suor
4. Espirometria
5. Ultrassonografia

COLUNA II

- () Asma
- () Derrame pleural
- () Embolia pulmonar
- () Enfisema pulmonar
- () Mucoviscidose

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 5 2 1 3
- B) 1 5 3 4 2
- C) 3 1 2 5 4
- D) 5 4 3 1 2

QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes patológicos, apresenta há várias semanas parestesias nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Anemia falciforme
- B) Anemia perniciosa
- C) Esclerose múltipla
- D) Talassemia

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, halo perinuclear e multinucleação.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Infecção por papilomavírus humano
- B) Cervicite crônica bacteriana
- C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
- D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é recorrente. No momento, não apresenta queixas nem sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta: PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m²; mamas e exame ginecológico sem alterações.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a conduta a ser adotada.

- A) Solicitar exames complementares de rotina, como mamografia e ultrassonografia, e manter terapia hormonal até o resultado dos exames.
- B) Manter a terapia hormonal, independentemente dos resultados dos exames, pois a paciente teve diagnóstico de menopausa recentemente.
- C) Orientar a paciente sobre os riscos cardiovasculares da terapia hormonal e suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.
- D) Suspender a terapia hormonal e solicitar ultrassonografia transvaginal de urgência e, somente depois do resultado desse exame, discutir a possibilidade de retorno.

QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com 36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa (1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos cardíofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 2,0 cm.

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e indicar resolução da gestação.
- B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e recomendar controle materno-fetal.
- C) Prescrever Nifedipina via oral associada à Alfametildopa e recomendar controle materno-fetal.
- D) Pedir exames para avaliação da função renal e hepática e recomendar controle materno-fetal.

QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação e o último hemograma apresentou hemoglobina de 11 g/dL, em exame de rotina pré-natal.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Realizar coleta seriada de hemograma e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter orientação dietética considerando o estilo de vida da paciente.
- D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

PEDIATRIA

QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até:

- A) 4 meses.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 24 meses.

QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é **CORRETO** afirmar:

- A) Apesar da simplicidade da utilização da antropometria, a falta de uma curva nacional fez com que o Ministério da Saúde contraindicasse a sua utilização em saúde pública.
- B) Para avaliar o crescimento, a medida da altura é mais importante que a do peso, devido à facilidade de sua obtenção.
- C) A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas de percentil porque são mais fidedignas que as que utilizam escore z.
- D) O acompanhamento da medida de peso e sua localização em um gráfico é uma importante forma de avaliar o crescimento de uma criança.

QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda e com desidratação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar com hidratação endovenosa.
- B) A prescrição de antibióticos é necessária porque a maioria das diarreias agudas é de origem bacteriana.
- C) Na desidratação leve e moderada, na qual não há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação com terapia de reidratação oral.
- D) Em uma criança com diarreia e desidratada, e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é **CORRETO** afirmar que:

- A) todas as crianças após o diagnóstico de pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.
- B) as pneumonias virais são muito raras, por isso, a utilização de antibióticos é tão importante numa criança com quadro respiratório.
- C) a droga de escolha para o tratamento da pneumonia na comunidade é a Penicilina Benzatina, pelo seu baixo custo.
- D) a Amoxicilina é utilizada para tratamento da maioria das pneumonias bacterianas.

SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.
- C) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- D) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.

QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.

Região / ano	2010	2011	2012	2013
Norte	5.289	5.093	5.113	5.163
Nordeste	13.197	3.006	12.527	12.717
Sudeste	4.120	14.172	4.114	13.748
Sul	4.220	4.395	4.238	4.141
Centro-Oeste	3.044	3.050	3.131	3.197
Total	39.870	39.716	39.123	38.966

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É necessário conhecer a estimativa populacional para cada ano (número de óbitos / população x 1 000).
- B) É necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos vivos x 1 000).
- C) É necessário multiplicar o número de óbitos por 100, já que se trata de uma porcentagem (número de óbitos x 100).
- D) É necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em crianças de 0-7 dias).

QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em desenvolvimento vêm apresentando graves problemas relacionados à escassez de recursos financeiros, decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento das questões relativas à incorporação tecnológica desordenada.

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estratégias de enfrentamento incluem avaliações de eficácia / efetividade e custo das tecnologias em saúde.
- II. A avaliação de tecnologias em saúde não influencia a decisão clínica, visto que esta é uma decisão individual.
- III. A avaliação de tecnologias opera somente no campo de saúde pública, uma vez que, no sistema privado, o custo não é um fator limitante para a obtenção de produtos em saúde.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se elevado número de estabelecimentos de saúde privados no Brasil.

De acordo com a Constituição Federal, de que forma ocorre a participação do sistema de saúde privado?

- A) Complementar ao SUS.
- B) Opcional para o SUS.
- C) Compulsório para cidadãos com alto poder aquisitivo.
- D) Obrigatório para empresas.

QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas em prazos pré-estabelecidos.

Sobre esses prazos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 7 (sete) dias úteis.
- B) Consulta nas especialidades médicas (nefrologista, pneumologista, ortopedista): em até 14 (quatorze) dias úteis.
- C) Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis.
- D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias úteis.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-referência de assistência à saúde deve contemplar os seguintes procedimentos, **EXCETO**:

- A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar
- B) Centro de terapia intensiva
- C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental
- D) Tratamento antineoplásico

QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) "a cobrança feita aos beneficiários de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas indevidas".

Disponível em: < <http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf> >.
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa afirmativa se baseia.

- A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 (Integralidade das ações em saúde)
- B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição do plano-referência de assistência à saúde)
- C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 2013 (Dos princípios de atenção à saúde na saúde suplementar)
- D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 2006 (Das infrações a que estão submetidos os planos privados de assistência à saúde)

QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Centrar ações no cuidado médico para evitar falta de integração no cuidado ao paciente.
- B) Incorporar de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal.
- C) Usar a epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde.
- D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando o aumento de sua autonomia.

RADIOLOGIA / DIAGNÓSTICO IMAGEM

QUESTÃO 30

Em relação à radioproteção, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Durante os procedimentos de trabalho em radiologia convencional, a quantidade de radiação recebida pelo profissional diminui quadraticamente com o aumento da distância da fonte emissora.
- B) Profissionais grávidas podem exercer atividades profissionais em áreas de radiação desde que seja improvável que o feto receba dose efetiva maior que 1,0 mSv após a notificação da gravidez.
- C) A radiosensibilidade é diretamente proporcional ao grau de diferenciação celular.
- D) A probabilidade da ocorrência dos efeitos estocásticos ou aleatórios é proporcional à dose de radiação ionizante absorvida, sendo os efeitos mais relevantes a mutação genética e a carcinogênese.

QUESTÃO 31

Em relação aos meios de contraste artificiais utilizados em métodos de exames por imagem, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Ao se utilizar meio de contraste iodado em radiografias do abdômen, deve-se optar por kV mais baixo (50 kV a 60 kV) com mAs mais elevado.
- B) Na suspeita de diverticulite aguda (intestino grosso), o enema opaco deve ser realizado utilizando-se meio de contraste iodado.
- C) O desenvolvimento de compostos iodados iso-osmolares tem tornado a sua utilização mais segura.
- D) A principal causa de fibrose sistêmica nefrogênica pós-administração intravenosa de gadolínio é a insuficiência hepática.

QUESTÃO 32

São achados sugestivos de sinusite crônica em exames de tomografia computadorizada, **EXCETO**:

- A) Realce periférico linear na cavidade paranasal pelo meio de contraste administrado por via intravenosa.
- B) Secreção sinusal com coeficientes de atenuação semelhantes aos dos músculos.
- C) Presença de cisto de retenção.
- D) Espessamento ósseo adjacente à mucosa sinusal inflamada.

QUESTÃO 33

Em relação ao colesteatoma, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A erosão da cadeia ossicular é sinal patognomônico desse processo patológico.
- B) Sua localização mais frequente é na porção lateral do epitémpano.
- C) O subtipo *pars flacida* é a forma adquirida mais comum, comprometendo o espaço de Prussak.
- D) Fístula labiríntica, deiscência do tégmen timpânico e erosão do canal do nervo facial são possíveis complicações.

QUESTÃO 34

Em relação aos processos patológicos orbitários, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O retinoblastoma bilateral associado ao tumor de pineal é denominado retinoblastoma trilateral.
- B) O tumor ocular primário mais frequente no adulto é o melanoma.
- C) As lesões mais comuns na fossa lacrimal são de natureza inflamatória.
- D) A lesão vascular orbitária mais frequente no adulto é o linfangioma (malformação linfático-venosa).

QUESTÃO 35

Considerando o nasoangiofibroma juvenil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É lesão localmente invasiva, agressiva, altamente vascularizada.
- B) Acomete adolescentes do sexo feminino.
- C) Pode alargar a fossa pterigopalatina.
- D) Pode deformar a parede posterior do seio maxilar.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa que apresenta a localização topográfica em que **NÃO** é possível cogitar o diagnóstico de meningioma.

- A) Goteira olfatória
- B) Tubérculo selar
- C) Cisterna pontocerebelar
- D) Núcleos da base

QUESTÃO 37

Em relação às coleções extra-axiais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A maioria dos hematomas extradurais situa-se na transição temporoparietal.
- B) Fraturas de crânio são identificadas na maioria dos adultos com hematoma extradural, sobretudo no local de contragolpe.
- C) A maior parte dos hematomas subdurais resulta da laceração de pequenas veias cerebrais superficiais.
- D) O higroma subdural apresenta aspecto igual ao do liquor no estudo tomográfico e na ressonância magnética em todas as ponderações.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa que apresenta a síndrome neurocutânea que é compatível com os seguintes achados tomográficos: calcificações giriformes corticais, atrofia cerebral e realce leptomeníngeo após administração de meio de contraste.

- A) Neurofibromatose tipo I
- B) Neurofibromatose tipo II
- C) Esclerose tuberosa
- D) Síndrome de Sturge-Weber

QUESTÃO 39

Em paciente com relato de hemianopsia homônima direita, de instalação súbita, foi realizado estudo tomográfico, que evidenciou lesão hipodensa, sem efeito de massa, do lado esquerdo, na face medial do lobo occipital, na superfície temporo-occipital, no hipocampo e no tálamo.

Diante do caso apresentado, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico provável.

- A) Infarto isquêmico no território de irrigação da artéria cerebral média esquerda.
- B) Infarto isquêmico no território de irrigação da artéria cerebral anterior esquerda.
- C) Infarto isquêmico no território de irrigação da artéria cerebral posterior esquerda.
- D) Trombose da veia cerebral magna.

QUESTÃO 40

Em todas as sequências de ressonância magnética, a presença de imagens com aspecto do liquor ao longo das artérias que penetram o córtex cerebral, sobretudo na topografia das substâncias perfuradas anterior e posterior, é sugestiva de:

- A) neurocisticercose na forma racemosa.
- B) sequelas de infartos lacunares.
- C) espaços perivasculares proeminentes.
- D) neurocriptococose.

QUESTÃO 41

Em ressonância magnética, são características típicas de lesões desmielinizantes inflamatórias idiopáticas pseudotumorais, **EXCETO**:

- A) Grande efeito de massa com significativo edema vasogênico.
- B) Perfusão reduzida no interior da lesão.
- C) Presença de estrutura vascular dilatada no interior da lesão.
- D) Realce anelar ou incompleto pelo meio de contraste.

QUESTÃO 42

A cranioestenose caracteriza-se pelo fechamento precoce de toda ou parte de uma ou mais suturas do crânio. Sobre essa anomalia, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A radiografia simples de crânio é o método mais sensível para o diagnóstico em qualquer faixa etária.
- B) A ressonância magnética não diagnostica fusão de suturas cranianas.
- C) A tomografia computadorizada não é o exame de primeira escolha, uma vez que a maioria dos casos demanda sedação anestésica.
- D) A escafocefalia é a deformidade mais comum, ocorrendo por fechamento precoce das suturas coronais.

QUESTÃO 43

Em relação à cisticercose, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O cisticercose pode alojar-se na retina, musculatura estriada e tecido subcutâneo.
- B) No estágio vesicular, o cisto apresenta paredes finas, conteúdo com imagem semelhante ao do liquor, mostrando o escólex em seu interior.
- C) No estágio coloidal, ocorre reação inflamatória, com o aparecimento de edema e espessamento da cápsula, que se impregna pelo meio de contraste.
- D) O estágio final é o nodular calcificado, com mineralização do cisto. A presença de edema adjacente não se deve à cisticercose, sugerindo etiologia distinta.

QUESTÃO 44

Em relação ao sequestro broncopulmonar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Caracteriza-se por uma área de parênquima pulmonar não funcional, que não se comunica com a árvore traqueobrônquica.
- B) O aspecto radiológico clássico é o da opacidade ou massa em lobos pulmonares inferiores, mais comum à direita.
- C) Pode ser intralobar, quando recoberto pela pleura visceral, ou extralobar, quando tem a sua própria pleura.
- D) O suprimento arterial anômalo pode ser demonstrado pela angiotomografia e pela angiorressonância.

QUESTÃO 45

Em relação às pneumonias bacterianas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A pneumonia estafilocócica acomete geralmente adultos debilitados e lactentes no primeiro ano de vida.
- B) A pneumonia pneumocócica afeta com maior frequência os lobos pulmonares superiores e médio.
- C) Os achados radiológicos da pneumonia por *Klebsiella pneumoniae*, quando a doença evolui lentamente, podem simular tuberculose pulmonar.
- D) Os achados radiológicos da pneumonia estafilocócica são diferentes no adulto e na criança.

QUESTÃO 46

Em relação ao comprometimento pulmonar pelas doenças do colágeno, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As alterações estruturais intersticiais predominam nas porções basais dos pulmões.
- B) Não tem predileção por sexo.
- C) Envolvimento pleural com derrames é frequente.
- D) A maioria das doenças do colágeno desenvolve pneumonia intersticial com evolução para fibrose.

QUESTÃO 47

Em relação aos nódulos pulmonares, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Pneumonia lipoídica, sequestro pulmonar e linfoma podem apresentar-se como nódulos.
- B) Os tipos de calcificações mais frequentes são laminar ou concêntrica, nicho central denso, granular e puntiforme.
- C) Idade do(a) paciente, atividade profissional e doenças pulmonares coexistentes são fatores importantes na avaliação do nódulo.
- D) Atelectasia redonda está habitualmente relacionada com doença pleural, principalmente silicose e com resolução de empiema.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa que apresenta o tipo de alteração torácica que é chamado de sinal do "S invertido".

- A) Pneumonia por *Klebsiella pneumoniae*
- B) Empiema pleural
- C) Atelectasia pulmonar lobar
- D) Pneumotórax hipertensivo

QUESTÃO 49

Em relação ao hamartoma pulmonar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Apresenta crescimento lento, produz escavação e tem dimensões variadas.
- B) Tende a localizar-se na periferia dos pulmões, preferencialmente nas bases pulmonares.
- C) A demonstração de calcificações e gordura na lesão é importante no diagnóstico radiológico.
- D) É o tumor pulmonar benigno mais comum.

QUESTÃO 50

São sinais radiológicos de aumento dimensional do átrio cardíaco esquerdo, **EXCETO**:

- A) Sinal do "duplo contorno".
- B) Redução do ângulo da bifurcação traqueal.
- C) Desvio posterior do brônquio principal esquerdo.
- D) Desvio cranial do brônquio principal esquerdo.

QUESTÃO 51

São alterações que podem ser observadas em radiografias simples do tórax no tromboembolismo pulmonar (TEP), **EXCETO**:

- A) Derrame pleural, elevação do diafragma, cardiomegalia, edema pulmonar.
- B) Sinal de Westermark – área de oligoemia pulmonar.
- C) Sinal de Fleischner – alargamento localizado de artéria pulmonar central pela presença de trombo impactado.
- D) Corcova de Hampton – consolidação pulmonar periférica com base pleural e concavidade na margem medial, geralmente voltada para o hilo do pulmão.

QUESTÃO 52

Em relação à aorta torácica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Na coarctação, podem ser evidenciadas erosões bilaterais da borda superior dos arcos costais.
- B) A úlcera penetrante é definida como a ulceração de uma placa aterosclerótica erodindo a camada íntima e alcançando a camada média.
- C) A localização é considerada o principal fator determinante do tratamento do aneurisma da aorta torácica.
- D) Na pesquisa de *endoleak* (controle pós-tratamento endovascular de aneurisma), a fase angiotomográfica tardia é fundamental para o diagnóstico.

QUESTÃO 53

Em caso de ruptura intracapsular de prótese mamária, o exame de imagem de maior sensibilidade é a:

- A) mamografia.
- B) tomografia computadorizada.
- C) ultrassonografia.
- D) ressonância magnética.

QUESTÃO 54

Para a demonstração de “leite de cálcio” no interior de microcistos mamários, as incidências mamográficas apropriadas são:

- A) oblíquas mediolateral e craniocaudal.
- B) craniocaudal e perfil absoluto, ambas com compressão seletiva ampliada.
- C) oblíquas mediolateral e craniocaudal ampliadas.
- D) somente craniocaudal ampliada.

QUESTÃO 55

São sinais ultrassonográficos de benignidade dos nódulos mamários, **EXCETO**:

- A) Orientação mais alta do que longa.
- B) Forma ovoide.
- C) Borda ecogênica com margens anterior e posterior nítidas.
- D) Macrolobulação.

QUESTÃO 56

Em relação às alterações congênitas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O tipo mais comum de atresia esofágica corresponde à presença de atresia com fístula traqueoesofágica para o coto esofágico distal.
- B) A localização mais frequente do cisto broncogênico é no mediastino médio, e nos pulmões é mais comum no terço médio.
- C) O estudo radiológico contrastado do estômago e do duodeno é o método de exame de escolha no diagnóstico de estenose hipertrófica do piloro.
- D) Estenose da junção pieloureteral é mais frequente no sexo masculino, é mais comum no lado esquerdo e pode ser bilateral.

QUESTÃO 57

São localizações preferenciais de esteatose hepática focal, **EXCETO**:

- A) Junto ao rebordo inferior do lobo direito.
- B) Junto à fissura do ligamento falciforme.
- C) No lobo caudado.
- D) Na periferia da fossa da vesícula biliar.

QUESTÃO 58

Em relação ao abscesso piogênico do fígado, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) À ultrassonografia, principalmente nas fases iniciais do processo infeccioso, pode mimetizar lesão sólida.
- B) O lobo hepático esquerdo é acometido com maior frequência que o lobo hepático direito.
- C) À tomografia computadorizada, pequenos abscessos podem apresentar-se como áreas hipodensas agrupadas – sinal do “cacho”.
- D) À ressonância magnética, o conteúdo do abscesso tem baixo sinal em T1 e alto sinal em T2 em até 90% dos casos.

QUESTÃO 59

Em relação à hiperplasia nodular focal do fígado, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A lesão tem cápsula e frequentemente mostra calcificações.
- B) É o segundo tumor benigno mais comum do fígado.
- C) Ocorre mais frequentemente em mulheres jovens entre 20 e 40 anos de idade.
- D) À ultrassonografia, em relação ao parênquima hepático normal, tendem a ser isoecogênicas ou, em alguns casos, hipocogênicas.

QUESTÃO 60

Em relação às neoplasias do pâncreas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A neoplasia cística mucinosa apresenta-se como unilocular ou multilocular, com lojas amplas, geralmente no corpo ou cauda do pâncreas.
- B) As neoplasias neuroendócrinas bem diferenciadas costumam se apresentar como nódulos hipervascularizados na fase arterial de exames de imagem.
- C) Contato superior a 90° do adenocarcinoma com vaso adjacente, trombo intravascular e contorno côncavo desse vaso são considerados sinais de invasão vascular pelo tumor.
- D) A obstrução ductal pancreática pela neoplasia pode causar o aparecimento de cisto de retenção.

QUESTÃO 61

Em relação aos critérios do índice morfológico de Balthasar para a graduação da pancreatite aguda, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Grau A: aparência pancreática normal.
- B) Grau B: aumento focal ou difuso do pâncreas.
- C) Grau C: anormalidades pancreáticas e inflamação peripancreática.
- D) Grau D: duas ou mais coleções peripancreáticas e gás dentro ou adjacente ao pâncreas.

QUESTÃO 62

Em relação às alterações usualmente observadas na hipertensão portal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O limite superior do índice esplênico é 480 – valor da multiplicação das três maiores dimensões longitudinal, anteroposterior e transversal do baço.
- B) O limite superior da normalidade do diâmetro das veias porta (nível do pâncreas), esplênica e mesentérica superior é 12,0 mm, 9,0 mm e 9,0 mm, respectivamente.
- C) Trombose porta é a causa mais comum de hipertensão portal pré-hepática (eixo esplenoportal).
- D) À tomografia computadorizada sem meio de contraste iodado intravenoso, a trombose aguda da veia porta leva à redução do coeficiente de atenuação e ao aumento do calibre vascular.

QUESTÃO 63

Assinale a alternativa que **NÃO** indica uma das principais causas de obstrução intestinal baixa em neonatos.

- A) Atresia ileal
- B) Imaturidade funcional do cólon
- C) Íleo meconial
- D) Intussuscepção

QUESTÃO 64

De acordo com a classificação de Bosniak, o cisto renal hiperdenso à tomografia computadorizada, medindo 4,0 cm, totalmente intraparenquimatosa, com calcificações parietais nodulares e múltiplos septos finos deve ser incluído na:

- A) categoria II.
- B) categoria IIF.
- C) categoria III.
- D) categoria IV.

QUESTÃO 65

Em relação ao angiomiolipoma renal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Ocorre como lesão isolada em 80% dos casos, mais comumente em homens de meia-idade.
- B) Pode comprometer linfonodos, invadir as veias renais e cava inferior, simulando tumor maligno.
- C) Quando associado à esclerose tuberosa, é geralmente maior e bilateral, podendo requerer tratamento cirúrgico.
- D) Na ultrassonografia pode apresentar sombra acústica posterior.

QUESTÃO 66

Em relação às lesões adrenais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os adenomas geralmente apresentam baixa densidade à tomografia computadorizada.
- B) Na tomografia computadorizada, os adenomas apresentam clareamento absoluto superior a 60% na técnica de *wash out*.
- C) Sob critério didático, o feocromocitoma é considerado o tumor dos 15: 15% bilaterais, 15% malignos, 15% ectópicos, 15% calcificam, 15% ocorrem em crianças e 15% são assintomáticos.
- D) O feocromocitoma origina-se na medula adrenal e é muito vascularizado, apresentando área de degeneração cística ou hemorrágica.

QUESTÃO 67

São lesões que podem estar associadas ao componente de cisto ósseo aneurismático, **EXCETO**.

- A) Condrioblastoma.
- B) Fibroma ossificante.
- C) Osteoblastoma.
- D) Tumor de células gigantes.

QUESTÃO 68

A doença de Kienböck designa a osteonecrose do(a):

- A) semilunar.
- B) epífise do úmero.
- C) tubérculo tibial.
- D) navicular.

QUESTÃO 69

Assinale a alternativa que apresenta o processo patológico em que o comprometimento da articulação de C1-C2 (atlantoaxial) ocorre com maior frequência.

- A) Artrite psoriática
- B) Espondilite anquilosante
- C) Artrite reumatoide
- D) Doença de Reiter

QUESTÃO 70

Erosão da extremidade distal da clavícula pode ser observada nas condições patológicas seguintes, **EXCETO**:

- A) Neurofibromatose.
- B) Pós-trauma.
- C) Hiperparatireoidismo.
- D) Doença de Paget

QUESTÃO 71

Em relação às fraturas ósseas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As fraturas do cotovelo mais comuns em adultos acometem geralmente a cabeça ou o colo do rádio.
- B) A maioria das fraturas do acetábulo acomete a sua margem posterior.
- C) Fratura metafisária e separação epifisária em criança que ainda não anda devem levar à suspeita de síndrome da criança espancada.
- D) As luxações da patela geralmente são mediais e secundárias a trauma direto.

QUESTÃO 72

Em relação ao exame ecográfico da pelve feminina, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Quando muito altos ou muito laterais, os ovários podem não ser identificados no estudo transvaginal.
- B) O uso de transdutores com frequência mais baixa e melhor resolução é uma das vantagens da ultrassonografia transvaginal.
- C) Leiomiomas subserosos e pediculados podem ficar fora do alcance da sonda endovaginal.
- D) Útero retrovertido é uma das limitações do estudo pélvico pela via suprapúbica.

QUESTÃO 73

Sobre a avaliação ultrassonográfica da pelve feminina, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O útero normal da mulher adulta é piriforme e a proporção corpo-cérvice é de aproximadamente 2:1.
- B) O aspecto ultrassonográfico do endométrio varia durante o ciclo menstrual e se correlaciona à histologia.
- C) Pode ser vista calcificação nas artérias arqueadas em mulheres pós-menopáusicas devido à esclerose de Monckeberg.
- D) O líquido no fundo-de-saco é sempre um achado anormal nas mulheres assintomáticas.

QUESTÃO 74

Sobre avaliação ecográfica dos órgãos pélvicos femininos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Ultrassonograficamente, o achado de massa atenuante altamente ecogênica no miométrio é virtualmente diagnóstico de leiomiolipoma.
- B) A tuba uterina normal é facilmente identificada pela ultrassonografia transabdominal ou transvaginal, mesmo não estando circundada por líquido.
- C) Os cistos do ducto de Gartner são remanescentes da extremidade caudal do ducto mesonéfrico que formam cistos únicos ou múltiplos nos ovários.
- D) Os miomas (fibroides) mais comuns são os submucosos.

QUESTÃO 75

Em relação à avaliação ultrassonográfica da pelve feminina, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Na forma leve de hiperestimulação ovariana, os ovários aumentam de volume, porém têm menos de 5,0 cm em média.
- B) As principais indicações da histerossonografia são: espessamentos focais do endométrio, sinéquias, pólipos e miomas submucosos, pediculados ou não.
- C) Cistos tecaluteínicos não têm associação com altos níveis de gonadotropina coriônica humana (HCG).
- D) Cistos paraovarianos são responsáveis por cerca de 10% de todas as massas em anexos.

QUESTÃO 76

Em relação à avaliação ecográfica pélvica feminina, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os cistos de inclusão peritoneal são massas císticas localizadas nos anexos, e o achado propedêutico é a presença de um ovário intacto em meio a septações e líquido.
- B) Múltiplos folículos corticais num ovário aumentado de volume são considerados um sinal específico de torção ovariana, embora nem sempre possam estar presentes.
- C) A maioria das anomalias uterinas pode ser detectada por ultrassom.
- D) Processo inflamatório pélvico agudo não é contra-indicação para a realização de histerossonografia.

QUESTÃO 77

Em relação à medida da translucência nual (TN), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Em mais de 95% dos casos, a TN não pode ser medida com sucesso por exame de ultrassonografia transabdominal.
- B) O cordão umbilical pode estar ao redor do pescoço do feto, e essa circular cervical pode produzir uma TN falsamente alterada.
- C) Deve-se tomar cuidado para distinguir entre a pele fetal e o âmnio.
- D) A TN deve ser medida com o feto na posição neutra.

QUESTÃO 78

Sobre os aspectos ecográficos do colo uterino de gestantes, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O afunilamento do orifício interno foi relatado como um sinal inicial de colo competente.
- B) Independentemente da apresentação clínica, existe agora uma grande quantidade de evidências demonstrando uma forte correlação entre os achados ultrassonográficos de colo uterino curto e nascimentos prematuros.
- C) A técnica transabdominal é superior à transvaginal.
- D) Na população normal, o comprimento cervical médio é inferior a 30,0 mm.

QUESTÃO 79

A respeito da restrição de crescimento intrauterino (RCIU) e da avaliação Doppler na gestação, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A restrição grave de crescimento intrauterino de início precoce possui um diagnóstico diferencial importante, especialmente na aneuploidia.
- B) A forma de onda da artéria cerebral média típica da 28ª à 32ª semana é caracterizada por altas velocidades diastólicas e velocidades sistólicas mínimas.
- C) Na RCIU assimétrica, o abdome fetal é desproporcionalmente pequeno em relação à cabeça e aos membros.
- D) A RCIU é um distúrbio do crescimento fetal definido mais comumente com base em um peso abaixo do 10º percentil para a idade gestacional.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**