

## REUMATOLOGIA

### LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 – Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
- 2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
- 3 – Ao receber a **Folha de Respostas**:
  - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
  - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4 – **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

### ATENÇÃO:

**FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

- 5 – Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01  A  B  C  D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02  A  B  C  D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03  A  B  C  D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04  A  B  C  D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

**NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**ATENÇÃO:** Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (**alíneas a, b, d, h e m**).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico [www.gestaodeconcursos.com.br](http://www.gestaodeconcursos.com.br) no dia 19 de outubro de 2015.

**DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS**

# ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **79 (setenta e nove) questões de múltipla escolha** com **4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão**, assim distribuídas: **BLOCO A**: 5 (cinco) questões de **Cooperativismo**, 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria**, 8 (oito) questões de **Saúde Pública e Saúde Suplementar**; **BLOCO B**: 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

## BLOCO A

### COOPERATIVISMO

#### QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de médicos, organizadas no formato societário de cooperativas de trabalho médico.
- B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro grau ou singular do Sistema Unimed.
- C) A entidade médica que liderou a formação da Mediminas, que posteriormente passou a ser denominada Unimed BH, foi o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.
- D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

#### QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A instância máxima de deliberação em uma cooperativa é a Assembleia Geral dos Associados.
- B) O associado poderá ser eliminado da sociedade por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.
- C) A demissão do cooperado – saída voluntária da cooperativa – poderá ser impedida pelos órgãos da administração, caso o trabalho desse cooperado seja indispensável ao bom funcionamento da cooperativa.
- D) A prestação de contas da administração da cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária realizada no primeiro trimestre de cada ano.

#### QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a organização do setor no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa são democraticamente eleitos pelos associados e funcionários da cooperativa.
- B) A solidariedade, a democracia e a equidade são princípios universais do cooperativismo.
- C) Os fundos de investimento estão impedidos de adquirir parte do capital das cooperativas, ainda que de forma minoritária.
- D) A Confederação Nacional do Cooperativismo (CNCOOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) são entidades do cooperativismo brasileiro que compõem o sistema OCB.

#### QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra os seguintes princípios universais do cooperativismo **EXCETO**:

- A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.
- B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.
- C) As cooperativas são sociedades de pessoas; sociedades essas não sujeitas à falência.
- D) As quotas-partes do capital da sociedade podem ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

#### QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado por cooperativas singulares, por federações estaduais ou regionais e por uma confederação denominada Unimed do Brasil.
- B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de Cooperados, possui uma Assembleia Geral de Delegados formada por associados eleitos dentro das especialidades médicas.
- C) O Conselho Social da Unimed BH possui função consultiva, discute as macropolíticas e as estratégias da Cooperativa e é formado por delegados, conselheiros e membros do Núcleo de Integração com Cooperados.
- D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde Suplementar no Brasil e estabelece regras para os planos privados de assistência à saúde, exceto para as cooperativas que devem observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).

### CIRURGIA GERAL

#### QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Homens com menos de 40 anos de idade, assintomáticos e sem comorbidades, que irão ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem previsão de sangramento, não necessitam de nenhum exame complementar pré-operatório.
- B) A história clínica constitui meio mais efetivo para diagnosticar fatores de risco associados a doenças coexistentes do que o exame físico e os exames complementares.
- C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos os sexos.
- D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a realização pré-operatória de ureia / creatinina, dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.

### QUESTÃO 7

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os macrófagos apresentam mobilização mais rápida em direção à área traumatizada do que os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais curto.
- B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por diversos mecanismos, destacando-se a liberação de enzimas proteolíticas, como as elastases.
- C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de células e pode mediar a vasodilatação e regular o tônus vascular.
- D) As proteínas reactantes da fase aguda são produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na tentativa de manter a homeostasia.

### QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à proliferação de células endoteliais.
- B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da permeabilidade vascular, mediada, entre outras, pela serotonina e histamina.
- C) Os leucócitos têm importante papel na remoção de detritos celulares e de bactérias do leito da lesão.
- D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que são responsáveis pela produção de interleucina 1.

### QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de hipotensão sem taquicardia concomitante é sinal sugestivo de choque neurogênico.
- B) É característica do choque cardiogênico a redução da perfusão tecidual com volemia adequada.
- C) Gasometria arterial inalterada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo por embolia pulmonar.
- D) São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio, dissecação aguda da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo.

### CLÍNICA MÉDICA

#### QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

- I. A associação de lesões aftosas na boca com lesões anais e perianais pode sugerir a presença da doença de Crohn.
- II. É a manifestação clínica que mais frequentemente se associa a doenças do intestino delgado.
- III. Quando a origem é o intestino delgado, as dejeções são pequenas, com número diário muito aumentado, frequentemente com muco, pus e sangue.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

#### QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa que **NÃO** é considerada causa dessa doença.

- A) Cirurgia abdominal
- B) Hiperlipidemia
- C) Hipocalcemia
- D) Trauma abdominal contuso

#### QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames complementares e as doenças ou situações que afetam o aparelho respiratório.

##### COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina
2. Dímero D
3. Dosagem de cloro no suor
4. Espirometria
5. Ultrassonografia

##### COLUNA II

- ( ) Asma
- ( ) Derrame pleural
- ( ) Embolia pulmonar
- ( ) Enfisema pulmonar
- ( ) Mucoviscidose

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 5 2 1 3
- B) 1 5 3 4 2
- C) 3 1 2 5 4
- D) 5 4 3 1 2

### QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes patológicos, apresenta há várias semanas parestesias nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Anemia falciforme
- B) Anemia perniciosa
- C) Esclerose múltipla
- D) Talassemia

### GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

#### QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, halo perinuclear e multinucleação.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Infecção por papilomavírus humano
- B) Cervicite crônica bacteriana
- C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
- D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

#### QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é recorrente. No momento, não apresenta queixas nem sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta: PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m<sup>2</sup>; mamas e exame ginecológico sem alterações.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a conduta a ser adotada.

- A) Solicitar exames complementares de rotina, como mamografia e ultrassonografia, e manter terapia hormonal até o resultado dos exames.
- B) Manter a terapia hormonal, independentemente dos resultados dos exames, pois a paciente teve diagnóstico de menopausa recentemente.
- C) Orientar a paciente sobre os riscos cardiovasculares da terapia hormonal e suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.
- D) Suspender a terapia hormonal e solicitar ultrassonografia transvaginal de urgência e, somente depois do resultado desse exame, discutir a possibilidade de retorno.

### QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com 36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa (1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos cardíofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 2,0 cm.

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e indicar resolução da gestação.
- B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e recomendar controle materno-fetal.
- C) Prescrever Nifedipina via oral associada à Alfametildopa e recomendar controle materno-fetal.
- D) Pedir exames para avaliação da função renal e hepática e recomendar controle materno-fetal.

### QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação e o último hemograma apresentou hemoglobina de 11 g/dL, em exame de rotina pré-natal.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Realizar coleta seriada de hemograma e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter orientação dietética considerando o estilo de vida da paciente.
- D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

### PEDIATRIA

#### QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até:

- A) 4 meses.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 24 meses.

### QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é **CORRETO** afirmar:

- A) Apesar da simplicidade da utilização da antropometria, a falta de uma curva nacional fez com que o Ministério da Saúde contraindicasse a sua utilização em saúde pública.
- B) Para avaliar o crescimento, a medida da altura é mais importante que a do peso, devido à facilidade de sua obtenção.
- C) A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas de percentil porque são mais fidedignas que as que utilizam escore z.
- D) O acompanhamento da medida de peso e sua localização em um gráfico é uma importante forma de avaliar o crescimento de uma criança.

### QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda e com desidratação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar com hidratação endovenosa.
- B) A prescrição de antibióticos é necessária porque a maioria das diarreias agudas é de origem bacteriana.
- C) Na desidratação leve e moderada, na qual não há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação com terapia de reidratação oral.
- D) Em uma criança com diarreia e desidratada, e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

### QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é **CORRETO** afirmar que:

- A) todas as crianças após o diagnóstico de pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.
- B) as pneumonias virais são muito raras, por isso, a utilização de antibióticos é tão importante numa criança com quadro respiratório.
- C) a droga de escolha para o tratamento da pneumonia na comunidade é a Penicilina Benzatina, pelo seu baixo custo.
- D) a Amoxicilina é utilizada para tratamento da maioria das pneumonias bacterianas.

## SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

### QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.
- C) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- D) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.

### QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.

Região / ano	2010	2011	2012	2013
Norte	5.289	5.093	5.113	5.163
Nordeste	13.197	3.006	12.527	12.717
Sudeste	4.120	14.172	4.114	13.748
Sul	4.220	4.395	4.238	4.141
Centro-Oeste	3.044	3.050	3.131	3.197
Total	39.870	39.716	39.123	38.966

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É necessário conhecer a estimativa populacional para cada ano (número de óbitos / população x 1 000).
- B) É necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos vivos x 1 000).
- C) É necessário multiplicar o número de óbitos por 100, já que se trata de uma porcentagem (número de óbitos x 100).
- D) É necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em crianças de 0-7 dias).

#### QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em desenvolvimento vêm apresentando graves problemas relacionados à escassez de recursos financeiros, decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento das questões relativas à incorporação tecnológica desordenada.

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estratégias de enfrentamento incluem avaliações de eficácia / efetividade e custo das tecnologias em saúde.
- II. A avaliação de tecnologias em saúde não influencia a decisão clínica, visto que esta é uma decisão individual.
- III. A avaliação de tecnologias opera somente no campo de saúde pública, uma vez que, no sistema privado, o custo não é um fator limitante para a obtenção de produtos em saúde.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

#### QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se elevado número de estabelecimentos de saúde privados no Brasil.

De acordo com a Constituição Federal, de que forma ocorre a participação do sistema de saúde privado?

- A) Complementar ao SUS.
- B) Opcional para o SUS.
- C) Compulsório para cidadãos com alto poder aquisitivo.
- D) Obrigatório para empresas.

#### QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas em prazos pré-estabelecidos.

Sobre esses prazos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 7 (sete) dias úteis.
- B) Consulta nas especialidades médicas (nefrologista, pneumologista, ortopedista): em até 14 (quatorze) dias úteis.
- C) Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis.
- D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias úteis.

#### QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-referência de assistência à saúde deve contemplar os seguintes procedimentos, **EXCETO**:

- A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar
- B) Centro de terapia intensiva
- C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental
- D) Tratamento antineoplásico

#### QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) "a cobrança feita aos beneficiários de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas indevidas".

Disponível em: < <http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf> >.  
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa afirmativa se baseia.

- A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 (Integralidade das ações em saúde)
- B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição do plano-referência de assistência à saúde)
- C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 2013 (Dos princípios de atenção à saúde na saúde suplementar)
- D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 2006 (Das infrações a que estão submetidos os planos privados de assistência à saúde)

#### QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Centrar ações no cuidado médico para evitar falta de integração no cuidado ao paciente.
- B) Incorporar de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal.
- C) Usar a epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde.
- D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando o aumento de sua autonomia.

## REUMATOLOGIA

## QUESTÃO 30

Sobre as correlações de padrões de fluorescência nuclear (FAN-HEp-2) e a especificidade de autoantígenos associados, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Nuclear homogêneo e DNA de dupla hélice.
- B) Nuclear pontilhado grosso e Sm.
- C) Centromérico e U1-RNP.
- D) Nuclear pontilhado fino e SS-B/La, SS-A/Ro.

## QUESTÃO 31

Analise as associações clínicas de autoanticorpos específicos a seguir, e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) DNAN e lúpus eritematoso sistêmico.
- ( ) Proteína P ribossomal e lúpus eritematoso sistêmico.
- ( ) Filagrina/citrulina e artrite reumatoide.
- ( ) U1-RNP e lúpus eritematoso neonatal.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V V V F
- B) F V F V
- C) V F V V
- D) F V V F

## QUESTÃO 32

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando as doenças reumáticas aos possíveis exames complementares adequados.

## COLUNA I

1. Hemocromatose
2. Nefrite lúpica
3. Mieloma múltiplo
4. ANCA-p

## COLUNA II

- ( ) Cristal de pirofosfato de cálcio
- ( ) Frações do complemento
- ( ) Crioglobulina pico monoclonal
- ( ) Poliangiíte microscópica

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 3 2 4 1
- B) 2 3 4 1
- C) 4 3 2 1
- D) 1 2 3 4

## QUESTÃO 33

Sobre a pesquisa de autoanticorpos presentes nos portadores de artrite reumatoide, analise as seguintes afirmativas.

- I. O conhecimento sobre os epitopos citrulinados permitiu o desenvolvimento de novos sistemas diagnósticos para a artrite reumatoide (ex: anti-CCP-2).
- II. O sistema anti-CCP-2 tem sensibilidade de 78% e especificidade de 95%.
- III. O clássico fator reumatoide tem sensibilidade de 74% e especificidade de 65%.
- IV. Os anticorpos anti-CCP surgem mais precocemente no curso da enfermidade.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

## QUESTÃO 34

Em relação ao diagnóstico imaginológico das doenças reumáticas, é **CORRETO** afirmar que:

- A) segundo o Consenso ASAS (*Assesment of Spondyloarthritis International Society*), a ressonância magnética das articulações sacroilíacas é o exame mais pertinente para o diagnóstico e a classificação das espondiloartrites axiais precoces infrarradiográficas.
- B) tomografia computadorizada é o "padrão ouro" para avaliar a inflamação em pacientes portadores de espondiloartrites em tratamento com medicamentos antifator de necrose tumoral alfa (anti-TNF $\alpha$ ).
- C) uma das principais vantagens da cintilografia óssea é a sua alta especificidade, como por exemplo, nas lesões ósseas do mieloma múltiplo e da doença óssea de Paget.
- D) a tomografia computadorizada de alta resolução é um exame de grande valor nas doenças musculoesqueléticas, uma vez que as imagens produzidas apresentam um excelente contraste entre os tecidos moles, o osso e a cartilagem articular, a cortical e a medular óssea, além da musculatura lisa e estriada.



### QUESTÃO 35

Em relação ao diagnóstico das doenças reumáticas utilizando a radiografia comum, é **CORRETO** afirmar que:

- A) na acromegalia, são visíveis afilamento e redução da densidade radiológica da calota craniana.
- B) na osteomalácia, o aumento da transparência óssea ocorre por deficiência de mineralização, enquanto na osteoporose a deficiência é de substância orgânica da matriz óssea.
- C) na artrite reumatoide com acometimento dos joelhos, o derrame articular é melhor visto na radiografia em AP como redução da densidade radiológica na região suprapatelar.
- D) a fibrose intersticial pulmonar da esclerose sistêmica pode ser avaliada com eficiência através do Rx simples, mas digital do tórax, dispensando-se a tomografia computadorizada, principalmente pelo alto custo e alta intensidade de radiação.

### QUESTÃO 36

Considere que um paciente apresentou os seguintes resultados de radiografias de suas articulações:

- I. Joelho em AP – esclerose subcondral e redução do espaço articular no compartimento medial.
- II. Mão em AP – pequeno osteófito na articulação trapeziometacarpiana.
- III. Coluna cervical – redução do forame de conjugação de C5-C6.
- IV. Coluna lombar – sinal do vácuo, desalinhamento posterior de L5, osteófitos anteriores de L4-L5.

A partir dos resultados das radiografias apresentados pelo paciente, é provável que ele seja portador de:

- A) condrocalcinose.
- B) osteoartrite.
- C) artrite reumatoide.
- D) hiperparatireoidismo.

### QUESTÃO 37

Com relação à orientação de repouso para os pacientes portadores de febre reumática aguda, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Sem cardite ou somente artrite: de duas a quatro semanas.
- B) Cardite leve/moderada: repouso no leito por um período de quatro a seis semanas.
- C) Cardite grave: repouso no leito até resolver a ICC.
- D) Coreia: não há qualquer necessidade de repouso.

### QUESTÃO 38

Analise as afirmativas a seguir sobre as características da artrite reumatoide do adulto, assinalando com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) Na fase pré-articular da evolução temporal da doença, é possível isolar autoanticorpos circulantes, que têm correlação com a evolução mais grave da doença.
- ( ) A denominação “fator reumatoide” refere-se aos anticorpos que reconhecem epitopos presentes na fração cristalizável (Fc) da molécula de IgG.
- ( ) A família de autoanticorpos mais específica para a artrite reumatoide atualmente é a direcionada contra proteínas citrulinadas, com sensibilidade semelhante e especificidade superior à do fator reumatoide.
- ( ) Os anticorpos antiproteínas citrulinadas são encontrados exclusivamente nessa doença desde o estágio pré-clínico

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F V F
- B) V V V F
- C) V F F V
- D) F V V F

### QUESTÃO 39

Em relação à artrite reumatoide, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A artrite reumatoide instala-se de maneira insidiosa e progressiva na maioria das ocasiões.
- B) O *score* DAS 28 foi extensivamente validado, sendo utilizado na monitorização terapêutica somente de pacientes envolvidos em ensaios clínicos farmacológicos.
- C) O encontro de um *score* DAS 28 < 2,6 significa que a doença está em alta atividade clínica.
- D) As infecções viróticas, sobretudo a rubéola, a parvovirose e as hepatites B e C podem provocar quadro clínico semelhante ao da artrite reumatoide, mas nunca apresentam positividade para o fator reumatoide ou anticorpos antinucleares.

### QUESTÃO 40

Em relação aos fatores relacionados ao mau prognóstico da evolução da artrite reumatoide, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Manifestações extra-articulares.
- B) Fator reumatoide e anti-CCP em altos títulos.
- C) Baixo nível socioeconômico e de educação formal.
- D) Ausência de fadiga, acometimento de poucas articulações, *score* DAS 28 ≤ 2,6.

#### QUESTÃO 41

Em relação à artrite idiopática juvenil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A forma mais grave é a de início sistêmico pela possibilidade de acometimento visceral, ocorrendo de 4% a 17% dos casos.
- B) A forma mais comum é a poliarticular com fator reumatoide positivo.
- C) A forma oligoarticular é a mais frequente (pode chegar a 56% dos casos), predomina no sexo masculino, tem geralmente ausência do fator reumatoide e anticorpos antinucleares e baixo risco de iridociclite.
- D) As alterações radiográficas, ao contrário da forma adulta da doença, já são exuberantes nas fases iniciais, observando-se muito cedo erosões, cistos e redução do espaço articular.

#### QUESTÃO 42

Sobre a síndrome de *Sjögren*, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A lágrima do olho seco por deficiência de produção é hiperosmolar e, por isto, estimula a inflamação na superfície ocular.
- B) Pacientes com xerostomia podem se queixar da sensação de secura oral, aparecimento de cáries, disfagia, diminuição do paladar, sensação de queimação na mucosa oral e halitose.
- C) A síndrome seca é muito comum, sendo a segunda síndrome reumática autoimune mais frequente.
- D) O tratamento das manifestações glandulares oculares ou orais com azatioprina e hidroxiquina é o melhor que se pode oferecer, atualmente, aos pacientes, dando bom resultado, a curto prazo, em 70% dos pacientes.

#### QUESTÃO 43

Em relação ao tratamento da osteoartrite, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Um programa equilibrado de repouso e exercício é benéfico para a prevenção e manutenção da integridade articular.
- B) A educação e o apoio psicológico constituem uma etapa fundamental que não deve ser menosprezada.
- C) Dietas, que não o emagrecimento, carecem de sentido para a osteoartrite.
- D) Diante dos mais recentes tratamentos da osteoartrite com os fármacos de ação lenta, que têm comprovada ação na recuperação morfológica da cartilagem, a maioria dos pacientes não mais necessita de prescrições de fisioterapia para o controle da dor e manutenção da função articular.

#### QUESTÃO 44

Sobre a síndrome dos anticorpos antifosfolípidos (SAF), analise as seguintes afirmativas:

- I. Pacientes grávidas primíparas com presença de anticorpos antifosfolípidos, que nunca apresentaram evento trombótico ou aborto espontâneo prévio, não devem receber tratamento farmacológico, não têm indicação para a anticoagulação, embora seja possível, se necessário, usar sem risco o sulfato de hidroxiquina.
- II. Está relacionada com trombose venosa ou arterial recorrente, perdas fetais, trombocitopenia, anemia hemolítica e lesões cutâneas como o lúcido reticular.
- III. Presença dos anticorpos antifosfolípidos é a condição necessária e suficiente para a produção de trombos.
- IV. A associação com o lúpus eritematoso sistêmico é um fator de pior prognóstico gestacional na SAF.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I, II e IV apenas.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II, III e IV apenas.
- D) I, II, III, IV.

#### QUESTÃO 45

Em relação às espondiloartropatias (EpAs), é **CORRETO** afirmar que:

- A) as enteses têm sido apontadas como o local de início das alterações fisiopatológicas das EpAs.
- B) de modo similar à membrana sinovial, as enteses são vascularizadas.
- C) todos os subtipos de HLA-B27 isolados até o momento têm relação com a gravidade da doença.
- D) a histologia da membrana sinovial dos portadores de EpAs na forma periférica é idêntica à da artrite reumatoide.

#### QUESTÃO 46

Considerando-se a rotura do manguito rotador ou síndrome do impacto, é **CORRETO** afirmar que:

- A) a cirurgia corretiva pela via aberta, clássica, é ainda um método preferível à videoartroscopia.
- B) o uso prolongado de teclados de computador é uma das principais causas atuais dessa síndrome.
- C) a doença do manguito rotador é uma lesão "por esforço repetitivo", do tipo LER.
- D) o teste de Jobe identifica a rotura do tendão do supraespinhoso em 90% dos casos.

### QUESTÃO 47

Em relação à espondilite anquilosante, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a dor ao nível das articulações sacroilíacas e/ou da coluna lombar é a manifestação clínica mais comum.
- B) as complicações mais comuns do envolvimento vertebral consistem em subluxação atlas-axis, deformidades vertebrais e fraturas secundárias à osteoporose.
- C) os olhos dos pacientes são acometidos numa fração de 20% a 40%, com uveíte anterior aguda, não granulomatosa, unilateral e recidivante.
- D) a nefropatia mesangial por IgA é uma das causas de glomerulonefrite nos pacientes, tem sempre curso benigno e não requer acompanhamento especial do ponto de vista nefrológico.

### QUESTÃO 48

Analise as afirmativas a seguir sobre as manifestações imagiológicas da espondilite anquilosante, assinalando com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) As alterações radiográficas típicas da sacroilíte são habitualmente simétricas e, de forma progressiva, pode-se encontrar: perda da nitidez dos contornos da articulação, pseudoalongamento, esclerose óssea subcondral, erosões das bordas articulares, redução do espaço articular e até fusão das articulações.
- ( ) A melhor incidência para se radiografar as articulações sacroilíacas é a de Fergusson modificada.
- ( ) As alterações radiográficas das articulações periféricas ocorrem sobretudo nas mãos e pés.
- ( ) De acordo com os critérios de *New York*, a sacroilíte radiográfica grau 1 (graus 0 a 4) consiste em: perda da definição das bordas articulares e alguma esclerose, podendo haver erosões mínimas ou discreta redução do espaço articular.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) V V V F
- D) F F V V

### QUESTÃO 49

Em relação à artrite psoriásica, é **CORRETO** afirmar que:

- A) em aproximadamente 80% das ocasiões, as lesões articulares precedem o aparecimento de sinais/sintomas cutâneos, num período de meses a vários anos.
- B) como há correlação entre a extensão das lesões cutâneas e a gravidade da artrite, geralmente a presença de psoríase não passa despercebida ao paciente e ao médico.
- C) a dactilite (“dedo em salsicha”) é uma característica clínica exclusiva de pacientes com artrite psoriásica e não é observada nas outras enfermidades do grupo das espondiloartropatias.
- D) o metotrexate é indicado como primeira opção de droga antirreumática modificadora da doença pelas principais recomendações do Consenso da Sociedade Brasileira de Reumatologia (2007) e da Liga Europeia Contra o Reumatismo (2012).

### QUESTÃO 50

Em relação à osteoartrite, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É a condição clínica mais prevalente do sistema articular, e sua prevalência é crescente em virtude do aumento da expectativa de vida da população.
- B) Pode ser entendida como uma insuficiência cartilaginosa decorrente somente de fatores mecânicos, que acarretam uma degradação do tecido cartilaginoso com a conseqüente remodelação óssea e algum grau de inflamação sinovial.
- C) A obesidade e a fraqueza muscular são fatores biomecânicos de risco muito importantes para o desenvolvimento da doença.
- D) A dor é o principal motivo que leva mais frequentemente o paciente a procurar ajuda médica.

### QUESTÃO 51

Em relação ao metotrexate (MTX), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Sua biodisponibilidade é baixa, variável entre os indivíduos, não influenciada pela ingestão de alimentos.
- B) A maioria do MTX e seus metabólitos são excretados pelas fezes, e o medicamento também pode ser removido por diálise.
- C) São contra-indicações ao uso do MTX: hepatopatias, mielodisplasia, mulheres em idade fértil que não estejam usando anticoncepcional, leucopenia < 3.000 mm<sup>3</sup>, plaquetas < 50.000 mm<sup>3</sup>.
- D) Contra-indicado na gravidez, mas permitido durante o período de amamentação.

### QUESTÃO 52

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando as principais características patológicas com os aspectos radiológicos da osteoartrite.

#### COLUNA I

1. Destruição e redução da espessura cartilaginosa
2. Eburnificação do osso subcondral
3. Remodelação óssea
4. Rarefação óssea em áreas císticas

#### COLUNA II

- ( ) Pinçamento radiográfico
- ( ) Esclerose óssea subcondral
- ( ) Osteófitos, irregularidades na superfície articular
- ( ) Pseudocistos

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 1 2 3 4
- B) 4 2 3 1
- C) 4 3 2 1
- D) 3 1 2 4

### QUESTÃO 53

Analise as afirmativas a seguir sobre a osteoartrite, assinalando com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) A viscosuplementação com o ácido hialurônico tem eficácia superior a de injeções de placebo intra-articular.
- ( ) Nos casos de rizartrose (osteoartrite carpometacarpiana do primeiro dedo), deve-se evitar atividades traumatizantes ou repetitivas (tricô, croquet) e imobilizar o polegar com órtese, de uso pelo menos noturno.
- ( ) Para a correção dos nódulos de Heberden e Bouchard, as artrodeses e artroplastias constituem a primeira indicação entre as opções de tratamento.
- ( ) A osteoartrite do quadril pode ser consequência do impacto femoroacetabular, decorrente de uma imperfeita congruência articular no momento que a articulação está nos extremos da amplitude de movimento.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V V F V
- B) V V V F
- C) V F V V
- D) F V V F

### QUESTÃO 54

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando os agentes de artrites infecciosas com seus aspectos clínicos e epidemiológicos.

#### COLUNA I

1. Flavavírus
2. Hepatite crônica pelo vírus C
3. Retrovírus
4. Hepadnavírus (HBV)

#### COLUNA II

- ( ) Na época pós-HAART (terapia antiviral altamente ativa), as manifestações reumatológicas incluem artrite séptica piogênica, neoplasia, hiperuricemia, rabdomiólise e osteonecrose.
- ( ) Nenhum tratamento é necessário, pois a artrite resolve-se espontaneamente após duas ou três semanas.
- ( ) A dengue é considerada a arbovirose mais importante que afeta o homem, em termos de morbidade e mortalidade.
- ( ) Manifestações reumatológicas incluem artralgia, mialgia, artrite, vasculite, sintomas secos, crioglobulinemia mista e fibromialgia.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 1 2 3 4
- B) 3 4 1 2
- C) 4 3 1 2
- D) 3 1 2 4

### QUESTÃO 55

Leia a descrição de sinais e sintomas de um portador de síndrome vasculítica:

- Início com idade maior que 16 anos.
- Fator desencadeante conhecido ou muito provável.
- Púrpura palpável e eritema maculopapular.
- Dor abdominal aguda.
- Biópsia com granulócitos periarteriolares ou venulares.

O paciente é, provavelmente, portador de:

- A) vasculite de hipersensibilidade.
- B) poliangiíte granulomatosa.
- C) poliarterite nodosa.
- D) poliangiíte granulomatosa eosinofílica.

### QUESTÃO 56

Considerando-se as manifestações clínicas do lúpus eritematoso sistêmico, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) As máculas, pápulas e placas eritematosas ocorrem primariamente em áreas expostas ao sol e são normalmente pruriginosas.
- B) A persistência de inflamação em apenas uma articulação, particularmente o joelho, ombro ou quadril, levanta a suspeita de osteonecrose ou artrite séptica.
- C) O padrão de lesão mesangial observado na nefrite lúpica se traduz clinicamente pelo achado de proteinúria nefrótica.
- D) O derrame pleural é geralmente volumoso e unilateral, com o líquido pleural apresentando concentração reduzida de glicose e pobre em autoanticorpos como o anti-DNA.

### QUESTÃO 57

Sobre o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, analise as seguintes afirmativas:

- I. Em pacientes com doença renal ativa grave, está indicado tratamento inicial com metilprednisolona pulsada (500-1000 mg/dia por 3 dias) para induzir uma melhora rápida.
- II. A associação da metilprednisolona pulsada com a ciclofosfamida (pulsos mensais por 6 meses) reduziu significativamente o risco de evolução para a insuficiência renal.
- III. O uso do micofenolato mofetil como alternativa à ciclofosfamida para tratamento inicial dos pacientes com nefrite lúpica proliferativa apresentou menor frequência de insuficiência ovariana e alopecia.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

### QUESTÃO 58

Em relação à artrite piogênica, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) As artrites sépticas não gonocócicas são emergências médicas com altas taxas de morbimortalidade.
- B) A maioria dos portadores de artrite piogênica não responde bem clinicamente aos antimicrobianos.
- C) A duração do tratamento medicamentoso de portadores de artrite piogênica é geralmente de 12 semanas, com o uso exclusivo de antibioticoterapia endovenosa.
- D) A perda de função articular nas artrites piogênicas é rara (menos de 1% dos pacientes).

### QUESTÃO 59

Segundo os critérios diagnósticos de lúpus eritematoso sistêmico (LES) do SLICC (*Systemic Lupus International Collaborating Clinics*) de 2012 (11 manifestações clínicas e 6 alterações laboratoriais contemplando manifestações do LES não contempladas no critério da Academia Americana de Reumatologia), analise as afirmativas a seguir.

O paciente poderá ser portador de lúpus eritematoso sistêmico se:

- I. preencher pelo menos quatro critérios, incluindo um clínico e um imunológico.
- II. tiver nefrite lúpica comprovada com biópsia renal com presença de FAN positivo.
- III. tiver nefrite lúpica comprovada com biópsia renal com anti-DNA positivo.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I, II, III.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e II, apenas

### QUESTÃO 60

Sobre as síndromes vasculíticas, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os anticorpos c-ANCA e p-ANCA reagem com antígenos de grânulos azurófilos citoplasmáticos de neutrófilos, proteinase 3 e mieloperoxidase, respectivamente.
- II. O mecanismo fisiopatogênico do tipo III, mediado por imunocomplexos, pode ser observado nas vasculites de pequenos vasos, como a de hipersensibilidade e a vasculite das doenças sistêmicas autoimunes.
- III. A síndrome vasculítica que mais se relaciona ao mecanismo fisiopatogênico do tipo I, com a participação de eosinófilos, mastócitos e IgE, é a poliangiíte granulomatosa eosinofílica.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas
- D) I, II e III.

### QUESTÃO 61

Considere os sinais/sintomas apresentados a seguir a respeito de uma síndrome vasculítica em uma criança de 4 anos, do sexo feminino:

- I. Acometimento cutâneo com lesões eritematodescamativas generalizadas, principalmente em extremidades, em regiões palmar e plantar.
- II. Mucosa ocular, língua e lábios hiperemiados.
- III. Febre, adenomegalia cervical e vasculite coronariana.

A partir dos dados apresentados, a paciente deve ser portadora de:

- A) vasculite crioglobulinêmica.
- B) doença de Kawasaki.
- C) vasculite por IgA.
- D) síndrome de Good-Pasture.

### QUESTÃO 62

Analise as seguintes afirmativas sobre a polimiosite.

- I. Os pacientes têm fraqueza proximal e simétrica dos membros superiores e inferiores.
- II. O aumento maior que 100 vezes o valor normal da CK é o achado laboratorial mais característico e comum da crise aguda de inflamação muscular.
- III. O principal achado histológico é a presença de infiltrado de células linfomononucleares na região endomisial ou perimisial, invadindo as fibras musculares não necróticas.
- IV. Biópsia muscular com exame anatomopatológico detalhado constitui ainda o “padrão ouro”, principalmente para o diagnóstico diferencial com as causas endócrinas, metabólicas e toxoplasmose.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I, II, III e IV.
- B) I, III e IV, apenas
- C) I, II e IV, apenas
- D) I, II e III, apenas

### QUESTÃO 63

Sobre a epicondilite lateral, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É chamada de “cotovelo do tenista” porque ocorre em 70% dos atletas praticantes de tênis.
- B) São sempre e exclusivamente relacionadas às atividades que acarretam sobrecarga do punho e antebraço.
- C) É importante no diagnóstico diferencial excluir outras doenças que produzem dor de cotovelo, especialmente a compressão do ramo recorrente do nervo radial e as dores oriundas da coluna cervical e do ombro.
- D) A cirurgia é geralmente indicada em 70% dos casos, mesmo em casos iniciais, pois este tipo de dor é resistente ao tratamento conservador.

### QUESTÃO 64

Em relação à polimiosite e dermatopolimiosite, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O uso de imunossupressores está indicado desde o início do tratamento para pacientes com fatores de mau prognóstico, recidiva da doença ou falta de resposta à corticoterapia.
- B) Hoje o uso de medicamentos biológicos é o “carro chefe” do tratamento, pois há informações abundantes e confiáveis na literatura atestando o sucesso deles no tratamento dessas síndromes.
- C) Com o surgimento dos medicamentos biológicos, o corticoide não é mais o medicamento de primeira escolha para o tratamento dessas síndromes.
- D) Diante dos tratamentos medicamentosos modernos, o tratamento de reabilitação não é mais necessário para os pacientes acometidos por essas síndromes.

### QUESTÃO 65

Em relação à artrite microcristalina causada pela deposição de ácido úrico, analise as seguintes afirmativas.

- I. Estudos epidemiológicos comprovaram que níveis de ácido úrico superiores a 9,0 mg/dL, a longo prazo, constituem fator de risco para a gota, doença renal e cardiovascular.
- II. Histórico familiar de gota está presente em 90% dos pacientes.
- III. As dietas ricas em purina, vários diuréticos, leucemia, psoríase, sarcoidose, hiperparatireoidismo são condições clínicas associadas à gota secundária.
- IV. O início de uso de um hipouricemiante, como o allopurinol, na presença de artrite gotosa aguda, está imediatamente indicado, mesmo se a dosagem do ácido úrico sérico basal não for efetuada.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 66

Em relação à artrite microcristalina provocada pela deposição de cristais de pirofosfato di-hidratado de cálcio (CPPD), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Sua forma clínica mais comum é a latente e assintomática.
- B) Seus padrões de expressão clínica são variados: bursites, tenossinovites, artropatia pós-diálise renal prolongada, síndromes espinais, associada à artropatia degenerativa, entre outros.
- C) As características radiológicas da doença são calcificações de padrão linear ou pontilhado nas estruturas fibrocartilaginosas ou na cartilagem hialina; paralelas ao osso subcondral; simétricas.
- D) Já existem tratamentos eficazes capazes de remover todo o depósito de pirofosfato de cálcio, como por exemplo os bisfosfonatos.

### QUESTÃO 67

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando os medicamentos imunobiológicos com seu modo de ação.

#### COLUNA I

- 1. Bloqueadores da interleucina-1
- 2. Depletor de células B
- 3. Bloqueadores da coestimulação da célula T
- 4. Bloqueadores da interleucina-6
- 5. Bloqueadores da interleucina 17

#### COLUNA II

- ( ) sekunimabe
- ( ) tocilizumabe
- ( ) rituximabe
- ( ) canakinumabe
- ( ) abatacepte

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 1 2 3 4 5
- B) 4 3 2 1 5
- C) 5 4 2 1 3
- D) 3 2 1 4 5

### QUESTÃO 68

Sobre os corticosteroides, analise as seguintes afirmativas.

- I. A catarata é um paraefeito que classicamente se mostra do tipo subcapsular posterior, está relacionada à dose acumulada e as crianças parecem mais suscetíveis a essa complicação.
- II. Seu uso prolongado está associado ao aumento do risco de osteonecrose ou necrose avascular óssea.
- III. Miopatia induzida é descrita em 50% dos pacientes com o uso a longo prazo, manifestando-se por atrofia muscular, com conseqüente fraqueza muscular, atingindo principalmente a cintura pélvica.
- IV. Existe relação entre o tempo de uso, a dose e a perda de massa óssea que parece ser maior nos primeiros seis meses de uso do corticoide.
- V. Hipertensão, arritmias, dislipidemia, hiperglicemia, aterosclerose acelerada e precoce são descritas principalmente em pacientes que usam doses mais altas, por exemplo, na forma de pulsoterapia.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I, II e III, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) IV e V, apenas.
- D) I, II, III, IV e V.

### QUESTÃO 69

Em relação às artropatias endócrinas, analise as afirmativas a seguir.

- I. A tenossinovite dos flexores, "dedos em gatilho", é mais prevalente no diabetes *mellitus* do tipo I e está associada ao tempo de evolução da doença.
- II. A tireoidite crônica autoimune, "de Hashimoto", frequentemente se acompanha de outras manifestações autoimunes, como aquelas encontradas em várias doenças reumáticas.
- III. Um paciente com perda de peso, mialgia, fadiga, dor abdominal, náusea, hiperpigmentação da pele e hipotensão pode estar com uma hipofunção das glândulas suprarrenais.
- IV. Níveis séricos persistentemente elevados de PTH têm efeito anabolizante ósseo, daí o PTH 1-34 ser utilizado no tratamento da osteoporose.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e IV, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.

### QUESTÃO 70

Em relação à síndrome do túnel do carpo, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Está associada de forma muito clara ao trabalho e funções repetitivas.
- B) O teste de Phalen consiste na reprodução da dor e/ou parestesia nos dedos inervados pelo nervo mediano, com a extensão forçada do punho por 1 minuto.
- C) A infiltração do punho com corticosteroide é um tratamento que dá resultados positivos, mesmo em casos de longa duração, com melhora total dos sintomas até por 2 anos.
- D) Em geral 20% da população apresenta alguma alteração na condução nervosa sensitiva, sem apresentar síndrome do túnel do carpo, possibilitando resultados falso-positivos.

### QUESTÃO 71

Em relação à fibromialgia, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A explicação da síndrome por meio da deficiência do neurotransmissor serotonina explica perfeitamente todas as manifestações clínicas descritas até o momento.
- B) Parece que as alterações imunológicas ao nível do SNC (vários autoanticorpos foram isolados) são a principal causa da mudança de comportamento dos pacientes diagnosticados com fibromialgia.
- C) Síndrome de dor, dolorimento à palpação, generalizada, associada à rigidez articular, fadiga, distúrbio do sono, parestesia, zumbido, tonteira, depressão, ansiedade, alterações do hábito intestinal são alguns dos sintomas da fibromialgia.
- D) O tratamento com a ciclobenzaprina, um antidepressivo clássico e miorelaxante, é suficiente para controlar a dor em 80% dos pacientes diagnosticados com fibromialgia.

### QUESTÃO 72

Em relação aos medicamentos e ao tratamento da osteoporose, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A terapia de reposição hormonal não é mais indicada após o advento dos antirreabsorptivos de longa meia-vida.
- B) A atividade antiosteoclástica dos bisfosfonatos se desenvolve por meio de mecanismos intracelulares ou modificadores do citoesqueleto do osteoclasto.
- C) O denosumabe é um anticorpo monoclonal humano que tem sua ação fundamentada na facilitação da ligação do RANKL ao RANK, estimulando a ativação e diferenciação osteoblástica.
- D) Pela falta de correlação do uso de ranelato de estrôncio com os fenômenos tromboembólicos, seu uso preferencial é em idosos com passado de tromboflebite.

### QUESTÃO 73

Em relação à densitometria óssea e o FRAX®, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O FRAX® é um modelo criado no computador que avalia o risco de fratura levando em consideração a medida da densidade mineral óssea e também os fatores de risco clínicos.
- B) O T score é o número de desvios padrão em que a densidade mineral óssea do indivíduo examinado se encontra em relação ao grupo de indivíduos de mesma faixa etária do banco de dados de referência.
- C) O tratamento da osteoporose para mulheres na pós-menopausa deve ser feito somente quando o T score para a medida da densidade mineral óssea do fêmur total for  $\leq 2,5$  DP, sem levar em conta os fatores de risco.
- D) Sugere-se intervalos de 6 meses para nova aferição da densidade mineral óssea em pacientes menopausadas osteopênicas, com ou sem fatores de risco.

### QUESTÃO 74

Em relação aos medicamentos utilizados no tratamento da artrite reumatoide, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O corticoide deveria ser reservado a duas situações principais: associados a AINHS em pacientes que iniciam uso de DMARDs e na vigência de manifestações sistêmicas extra-articulares da doença.
- B) O metotrexate é considerado atualmente o medicamento "âncora" não só para o tratamento convencional, mas também associado a medicamentos biológicos.
- C) A leflunomida e o metotrexate não são capazes de reduzir a progressão de lesões radiográficas.
- D) A azatioprina e a ciclofosfamida estão indicadas em pacientes que não respondem aos tratamentos convencionais e para os que apresentam vasculite sistêmica e doença pulmonar intersticial.



### QUESTÃO 75

Sobre os anti-inflamatórios não hormonais (AINEs), analise as seguintes afirmativas.

- I. Ultrapassam as barreiras hematoencefálica e placentária, passando, dessa forma, da mãe para o feto, e devem ser evitados durante a gravidez e próximo ao parto.
- II. A redução do nível sérico da albumina pode aumentar o risco de toxicidade.
- III. As bebidas alcoólicas devem ser abolidas durante o uso de AINEs, não somente pela potencialização dos efeitos colaterais gástricos, mas também por diminuírem o fluxo sanguíneo renal e o aumento do risco de lesão renal.
- IV. Interação entre os AINEs e anticoagulantes elevam o tempo de protrombina, podendo levar a risco de sangramentos, principalmente no trato gastrointestinal.
- V. Elevam a pressão sanguínea, tanto em normotensos como em hipertensos, independente do uso de anti-hipertensivos.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I, II, III, IV e V.
- B) II, III e V, apenas.
- C) II, III, IV e V, apenas.
- D) I, II e III, apenas.

### QUESTÃO 76

Na artrite reumatoide, a atividade da doença pode ser relacionada ao índice DAS 28 (aferição de dor e edema em 28 articulações), à VHS e, de forma opcional, à avaliação da saúde geral pelo paciente usando uma EVA, cujos valores vão de 0 a 100.

Analise as correlações apresentadas a seguir:

- I. Remissão - DAS 28 < 2,6
- II. Atividade alta - DAS 28 > 5,1
- III. Atividade moderada - DAS 28 ≤ 5,1
- IV. Atividade leve - DAS 28 ≤ 3,2

Estão **CORRETAS** as correlações:

- A) I, II, III e IV.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III, apenas.

### QUESTÃO 77

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando as opções terapêuticas e seu uso antes da concepção e durante a gravidez.

#### COLUNA I

1. Leflunomida
2. Metotrexate
3. Hidroxicloroquina
4. Rituximabe

#### COLUNA II

- ( ) Seguro durante toda a gravidez.  
( ) Descontinuar 3 a 6 meses antes da concepção.  
( ) Descontinuar 10 a 12 meses antes da concepção.  
( ) Descontinuar 2 anos antes da concepção.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 3 4 2 1
- B) 4 2 3 1
- C) 1 2 3 4
- D) 3 2 4 1

### QUESTÃO 78

Em relação à esclerose sistêmica, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A calcinose resultante da deposição de cristais de cálcio ou hidroxiapatita em locais de pressão excessiva ou trauma e naqueles afetados pelo fenômeno de Raynaud é mais frequente na forma clínica limitada, em pacientes com doença de longa duração e com a presença do anticorpo anticentrômero.
- B) O envolvimento esofágico é uma manifestação visceral incomum da esclerose sistêmica, estando presente em somente 10% dos pacientes.
- C) A pneumopatia intersticial é mais comum nos pacientes com acometimento cutâneo de forma limitada.
- D) A crise renal aguda é, até hoje, mesmo com o advento dos inibidores da angiotensina, a mais grave manifestação visceral da esclerose sistêmica, podendo acometer 80% dos pacientes com a forma clínica limitada, nos primeiros 5 anos de doença.

### QUESTÃO 79

Analise as afirmativas a seguir sobre a prevenção da osteoporose e o uso de cálcio e vitamina D, assinalando com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) Um copo de leite comum de 300 mL contém aproximadamente 300 mg de cálcio.
- ( ) A suplementação de cálcio e vitamina D pode reduzir o risco de fratura de fêmur proximal particularmente em idosos.
- ( ) A maior causa de deficiência de vitamina D é a inadequada exposição ao sol.
- ( ) Os níveis séricos de vitamina D, medidos pela forma estável 25OH vitamina D, considerados normais ou adequados para a saúde óssea, estão estabelecidos em 30-100 ng/mL.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F V F
- B) V V F V
- C) V V V V
- D) F V V F

# FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**