



TURNO

NOME DO CANDIDATO	Nº DE INSCRIÇÃO	ESCOLA	SALA	ORDEM
--------------------------	------------------------	---------------	-------------	--------------

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo **40 (quarenta) questões** objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade da Prova terá a duração de **2h30 (duas horas e meia)**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- Iniciada a Prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida **1h (uma hora)** de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas da Prova Objetiva. A Folha de Respostas da Prova Objetiva será o único documento válido para correção.
- Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo da Seleção Pública e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2(dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário, e depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
 - A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
 - Use caneta transparente de tinta preta ou azul.
 - Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
 - Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
 - O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:
-
- Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
02/2015



Espaço reservado para anotação das respostas - O candidato poderá destacar e levar para conferência.

NOME DO CANDIDATO										Nº DE INSCRIÇÃO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40



O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da **Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br)** a partir do dia **09 de fevereiro de 2015**.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

1. Assinale a alternativa que apresenta os estudos que seriam desenvolvidos ao provar uma hipótese específica acerca da relação de uma doença e uma causa e ao conduzir estudos epidemiológicos que se relacionem à exposição de interesse com a doença.
- (A) Epidemiologia analítica.
 - (B) Epidemiologia descritiva.
 - (C) Regionalização.
 - (D) Descentralização organizacional.

Leia o trecho abaixo para responder às questões 2 e 3.

Apesar de observarmos avanços no Brasil sobre os indicadores de mortalidade infantil, infelizmente ainda padecemos com os números relacionados à mortalidade materna, o que ainda configura-se como um problema de saúde pública em várias regiões brasileiras.

2. Sobre o indicador epidemiológico denominado “mortalidade materna”, analise as assertivas abaixo.

- I. Afere apenas os óbitos em detrimento de problemas de parto.
- II. Tem como denominador o total de habitantes da área.
- III. As taxas de mortalidade materna são maiores que a de mortalidade infantil.

É correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II, apenas.

3. Sobre o indicador de mortalidade infantil, é correto afirmar que os óbitos evitáveis ainda representam grande relevância e o mais incidente refere-se à

- (A) falta de atenção ao parto.
- (B) ação de imunização.
- (C) falta de atenção à gestação.
- (D) falta de atenção ao recém-nascido.

4. O serviço de vigilância epidemiológica local foi notificado sobre uma série de casos de intoxicação alimentar, logo após um evento que reuniu cerca de 200 pessoas em um local onde foi servida uma refeição aos participantes. Esse tipo de caso configura um(a)

- (A) epidemia progressiva.
- (B) surto.
- (C) endemia.
- (D) prevalência.

5. Em uma cidade com 150 mil habitantes, foram notificados, em 2013, cerca de 10 novos casos de tuberculose. No local, já havia em tratamento outros 20 casos, mas não foram observados óbitos ou curas até o momento da notificação de novos casos. De acordo com os dados, é correto afirmar que a

- (A) incidência da doença em 2013 foi de 30 casos.
- (B) prevalência da doença em 2013 foi de 30 casos.
- (C) prevalência da doença em 2013 foi de 10 casos.
- (D) incidência da doença em 2013 não tem como ser descrita.

6. O processo saúde-doença tem como premissa a avaliação de variáveis envolvidas na manutenção da saúde ou do adoecimento. Considerando isso, encaixa(m)-se, como variável(is),

- I. meio ambiente.
- II. fatores econômicos.
- III. fatores sociais.

É correto o que está contido em

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, apenas.

Leia o trecho abaixo para responder às questões 7 e 8.

A edição da Norma Operacional Básica 96 (NOB 96) representou uma aproximação mais explícita com a proposta de um novo modelo de atenção. Para isso, acelerou a descentralização dos recursos federais em direção aos estados e municípios.

7. Em relação à NOB 96, pode-se afirmar que houve muitas inovações. Considerando isso, analise as assertivas abaixo.

- I. Teve a concepção de saúde ampliada – considera a concepção determinada pela Constituição, englobando promoção, prevenção, condições sanitárias, ambientais, emprego e moradia.
- II. Houve o fortalecimento das instâncias colegiadas e da gestão pactuada e descentralizada – consagrada na prática com as Comissões Intergestoras e com os Conselhos de Saúde.
- III. São autorizadas transferências fundo a fundo (do Fundo Nacional de Saúde direto para os Fundos Municipais de Saúde), com base na população e com base em valores *per capita* previamente fixados.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, II e III.

8. A edição da NOB 96 incentivou os programas dirigidos à população mais carente, sendo o(s) programa(s) mais expoente(s):

- I. Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- II. Estratégia de Saúde da Família (ESF).
- III. Programa de Combate e Controle da Tuberculose.

É correto o que está contido em

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III, apenas.

9. No Pacto pela Vida, são firmados compromissos em torno das medidas que resultem em melhorias da situação de saúde da população brasileira. É(São) considerada(s) prioridade(s) em vigência:

- I. a saúde do idoso.
- II. a redução das mortalidades infantil e materna.
- III. a promoção da saúde.
- IV. o fortalecimento e a prioridade na atenção secundária.

É correto o que está contido em

- (A) I e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) IV, apenas.
- (D) II, apenas.

10. Muitas ações estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa que apresenta o item que pode ser **excluído** das áreas de atuação.

- (A) Manutenção de benefícios sociais.
- (B) Execução de ações de vigilância sanitária.
- (C) Execução de ações de assistência terapêutica.
- (D) Execução de ações de vigilância epidemiológica.

11. Em 2013, a cobertura nacional por equipe de saúde da família atingiu um marco, pois alcançou, naquele período,

- (A) mais de 50% da população.
- (B) mais de 30% da população.
- (C) mais de 20% da população.
- (D) mais de 15% da população.

Leia o trecho abaixo para responder à questão 12.

Ao mesmo tempo em que aspira a ser nacional na garantia do direito à saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser descentralizado nessa responsabilidade.

12. O processo de descentralização em saúde predominante no Brasil é político-administrativo e, além da transferência da gestão, há também a transferência

- I. do poder decisório.
- II. da responsabilidade sobre prestadores de serviços.
- III. de recursos financeiros.

É correto o que está contido em

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III, apenas.

13. A maior parte das ações que são contudentes à atenção primária é de responsabilidade principal do poder público

- (A) federal.
- (B) estadual.
- (C) municipal.
- (D) da rede privada de saúde.

<p>14. Os fundamentos de atenção básica vistos na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), promulgada desde 2006, relacionam</p> <p>I. o acesso universal contínuo a serviços de saúde resolutivos.</p> <p>II. o estímulo à participação comunitária.</p> <p>Considerando os itens acima, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.</p> <p>() Apenas I está relacionado à PNAB.</p> <p>() Apenas II está relacionado à PNAB.</p> <p>() A PNAB tem como base os itens I e II.</p> <p>(A) V/ F/ F</p> <p>(B) F/ V/ F</p> <p>(C) F/ F/ V</p> <p>(D) F/ F/ F</p>	<p>18. A interpretação bioética que prioriza temas públicos e coletivos em detrimento das questões específicas, privadas e individuais seria o conceito de bioética</p> <p>(A) de situações emergentes.</p> <p>(B) de situações persistentes.</p> <p>(C) ampliada.</p> <p>(D) sanitária.</p>
<p>15. Para ampliar a resolutividade, desde 2008, o Ministério da Saúde incentiva a criação dos núcleos de apoio à saúde da família, que tem como fundamento o(a)</p> <p>(A) apoio matricial e parceiro às equipes de saúde da família.</p> <p>(B) substituição parcial das equipes de saúde da família.</p> <p>(C) remodelação da atenção secundária.</p> <p>(D) remodelação da assistência privada.</p>	<p>Leia o trecho abaixo para responder às questões 19 e 20.</p> <p>“O vigor das explicações unicasais das doenças começa a ‘enfraquecer’ após a Segunda Guerra, quando os países industrializados começam a vivenciar uma ‘transição epidemiológica’, caracterizada pela diminuição da importância das doenças infecto-parasitárias como causa de adoecimento e morte em detrimento do incremento das doenças crônico-degenerativas.”</p> <p>Educação Profissional e docência em saúde – O território e o processo de saúde – Editora Fiocruz.</p> <p>19. O modelo multicausal das doenças que vigora desde o final da Segunda Guerra foi proposto</p> <p>(A) por Leavell e Clark em 1976.</p> <p>(B) pela resolução de Alma-Ata.</p> <p>(C) pelo sanitarista brasileiro Nelson de Moraes.</p> <p>(D) pelo bioeticista brasileiro Volnei Garrafa.</p>
<p>16. As equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família podem ser divididas em duas modalidades: NASF I e II, sendo que a modalidade NASF I</p> <p>(A) vincula-se, apenas, a uma equipe de saúde da família.</p> <p>(B) pode vincular-se, no máximo, a duas equipes de saúde da família.</p> <p>(C) não pode atuar em área em que haja equipes de saúde da família.</p> <p>(D) vincula-se dentre oito a vinte equipes de saúde da família.</p>	<p>20. No modelo multicausal, existem barreiras que se opõem à marcha da doença como, por exemplo,</p> <p>(A) a prevenção primária e seu modelo sanitário único.</p> <p>(B) a promoção da saúde como única alternativa viável.</p> <p>(C) as prevenções primária, secundária e terciária.</p> <p>(D) apenas os modelos baseados em diagnósticos rápidos e precoces.</p>
<p>17. Em geral, na atenção à saúde no Brasil, considera-se, também, a atenção hospitalar, classificando hospitais de acordo com porte, perfil e nível de complexidade. Diante do exposto, um hospital de pequeno porte seria aquele</p> <p>(A) com até 100 leitos.</p> <p>(B) com até 150 leitos.</p> <p>(C) que contém entre 10 e 120 leitos.</p> <p>(D) com, no máximo, 50 leitos.</p>	

ODONTOLOGIA (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)

21. A eficiência da esterilização dos materiais usados em Odontologia é obtida se forem respeitados os padrões mínimos de cada método. Sobre esterilização, assinale a alternativa correta.
- (A) Estufa seca é um método físico de esterilização que necessita de 180 minutos a 140°C para a efetiva destruição de todas as formas microbianas.
 - (B) Glutaraldeído a 2%, aplicado sobre artigos previamente limpos em exposição de 10 horas, é considerado um método químico.
 - (C) Autoclava é um equipamento que utiliza vapor saturado para realizar o processo de esterilização em temperaturas entre 100°C e 110°C.
 - (D) Os álcoois mais empregados em esterilização são o álcool etílico e o isopropílico.
22. Assinale a alternativa que apresenta os nomes dos músculos da expressão facial.
- (A) Músculo zigomático menor, músculo bucinador, músculo masseter e músculo mentoniano.
 - (B) Músculo zigomático maior, músculo bucinador, músculo mentoniano e músculo orbicular da boca.
 - (C) Músculo zigomático menor, músculo temporal, músculo masseter e músculo bucinador.
 - (D) Músculo temporal, músculo masseter, músculo occipitofrontal e músculo zigomático menor.
23. Após 24 horas da remoção de um terceiro molar inferior incluso, o paciente relata falta de sensibilidade da língua nos 2/3 anteriores. Com esse histórico, é correto afirmar que, durante a cirurgia, houve lesão do nervo
- (A) alveolar inferior.
 - (B) lingual.
 - (C) mentoniano.
 - (D) bucal.
24. Considerando-se as lesões traumáticas dentárias, assinale a alternativa que apresenta o conceito, as características e a conduta da concussão.
- (A) Deslocamento de um dente da sua posição original com lesão de tecidos de suporte e presença de hemorragia gengival. Faz-se controle radiográfico do elemento dental e ajuste oclusal.
 - (B) Deslocamento de um dente da sua posição original com mobilidade horizontal e lesão de tecidos de suporte com sangramento gengival. Recomenda-se o ajuste oclusal e uma contenção semirrígida.
 - (C) Lesão dos tecidos de suporte com a presença de sangramento gengival e aparência de dente alongado. Recomenda-se a realização de tratamento endodôntico e contenção por 4 semanas.
 - (D) Lesão de tecidos de suporte sem perda ou deslocamento do dente. Recomenda-se uma dieta macia nos primeiros dias e faz-se alívio das interferências oclusais.
25. Paciente de 62 anos faz radioterapia para tratamento de um carcinoma de nasofaringe. Alguns efeitos colaterais deste tratamento interferem na qualidade de vida do paciente. Os efeitos localizados na região de cabeça e pescoço que acometem esse paciente podem ser vários, **exceto**:
- (A) mucosite.
 - (B) xerostomia.
 - (C) hipotonia muscular.
 - (D) hipogeusia.
26. Em relação ao nervo trigêmeo, assinale a alternativa **incorreta**.
- (A) Corresponde ao VII par de nervos cranianos.
 - (B) É um nervo misto, sendo o componente motor consideravelmente maior que o componente sensitivo.
 - (C) As fibras motoras deste nervo fazem a inervação dos músculos da mímica facial.
 - (D) Possui três raízes sensitivas: nervo oftálmico; nervo maxilar; e nervo mandibular.
27. O osso zigoma, por sua posição projetada na face, é sede frequente de traumatismos, sendo uma estrutura óssea sujeita a fraturas diante de traumas. Existem sinais e sintomas clássicos da fratura do complexo zigomaticomaxilar, **exceto**:
- (A) retração da pálpebra inferior.
 - (B) equimose periorbitária.
 - (C) diplopia.
 - (D) parestesia da língua.
28. Nos tratamentos das fraturas mandibulares utilizando o acesso extraoral, é realizada a exposição do local fraturado por meio da incisão e da dissecção dos tecidos. Em relação ao acesso submandibular do tipo *Risdon*, assinale a alternativa correta.
- (A) A incisão cutânea tipo *Risdon* deve ser realizada abaixo da borda inferior da mandíbula, o que previne a lesão do ramo marginal mandibular do nervo facial.
 - (B) Normalmente, é utilizado na região anterior da mandíbula.
 - (C) O acesso de *Risdon* é frequentemente utilizado para a fratura de côndilo mandibular.
 - (D) Este tipo de acesso é muito usado para abordagem de fraturas subcondilares.

<p>29. A biópsia é um procedimento comum e rotineiro realizado na cavidade oral e consiste na remoção de tecidos para posterior estudo anátomo patológico, porém, é contraindicada em</p> <p>(A) lesões com características clínicas de malignidade. (B) lesões enegrecidas ou pigmentadas. (C) lesões brancas que persistem por mais de duas semanas. (D) lesões inflamatórias que persistem por mais de vinte dias, mesmo após remover qualquer agente traumático.</p>	<p>34. Paciente do sexo feminino, 65 anos, necessita de exodontias múltiplas para a realização de próteses totais, superior e inferior. Na anamnese, a paciente relata o uso de bifosfonato para tratamento de metástase óssea. Assinale a alternativa que pode ser considerada uma complicação do uso dessa medicação.</p> <p>(A) Aumento no tempo de coagulação. (B) Necrose óssea. (C) Aumento de sangramento. (D) Anquilose dentária.</p>
<p>30. As manifestações bucais da infecção de HIV são comuns e podem representar um importante valor diagnóstico da doença. São lesões bucais associadas à infecção pelo HIV, exceto:</p> <p>(A) queilite actínica. (B) candidíase. (C) gengivite ulcerativa necrosante aguda. (D) leucoplasia pilosa.</p>	<p>35. O cirurgião-dentista e a sua equipe podem desempenhar um papel importante como agentes de informação e orientação da saúde geral do paciente. Nesse sentido, são funções de competência do cirurgião-dentista e sua equipe garantir o atendimento dentro das normas de biossegurança preconizadas e estar atento às possíveis manifestações bucais relacionadas à infecção. Exames para avaliação de Sífilis e Aids, por exemplo, podem ser solicitados. São, respectivamente, exames de identificação de Sífilis e Aids:</p> <p>(A) TGO e ELISA. (B) VDRL e Reação de Wassermann. (C) VDRL e ELISA. (D) TGO e Reação de Wassermann.</p>
<p>31. Assinale a alternativa que apresenta sinais clássicos do <i>Diabetes mellitus</i>.</p> <p>(A) Polidipsia, polifagia e poliúria. (B) Paladar alterado e pouca incidência de cárie dentária. (C) Pouca incidência de cárie dentária e xerostomia. (D) Aumento da secreção da glândula salivar parótida e candidíase.</p>	<p>36. Com relação às fraturas de maxila, assinale a alternativa incorreta.</p> <p>(A) A fratura Le Fort III é também conhecida como disjunção crânio-facial. (B) A fratura Le Fort I ocorre transversalmente pela maxila, acima do nível dos dentes; o segmento fraturado contém o rebordo alveolar, partes das paredes dos seios maxilares, o palato e a parte inferior da apófise pterigoide do osso esfenóide. (C) Le Fort I também é chamada de Fratura de Guérin. (D) A fratura Le Fort III, por causa de sua forma geral, foi denominada fratura piramidal. Em lesões graves, pode haver grande deslocamento, afetando as regiões etmoidal e lacrimal, e com alongamento para os lados, o que produz um aumento do espaço interorbitário.</p>
<p>32. Assinale a alternativa que apresenta o agente etiológico mais comum, de maior incidência nos casos de endocardite bacteriana e encontrado em grande quantidade na cavidade oral.</p> <p>(A) <i>Streptococcus oral</i>. (B) <i>Prevotella intermedia</i>. (C) Lactobacilos. (D) <i>Treponema pallidum</i>.</p>	<p>37. Assinale a alternativa que apresenta a incidência radiográfica que permite uma melhor imagem da região da base condilar, do processo condilar, colo e ramo da mandíbula.</p> <p>(A) Posteroanterior do crânio. (B) Towne modificado. (C) Fronto-naso e perfil de crânio. (D) Occipitomentual 30°.</p>
<p>33. Os principais cuidados no atendimento de rotina a pacientes gestantes na clínica odontológica devem seguir recomendações para que o tratamento dentário ocorra com tranquilidade e segurança. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) A melhor época para o atendimento odontológico de gestantes é o terceiro trimestre da gestação. (B) Na necessidade de indicação de uso prolongado de anti-inflamatório, a melhor escolha são os anti-inflamatórios não esteroidais. (C) A melhor indicação no uso de anestésicos locais é seguramente o uso de lidocaína. (D) As consultas devem ser preferencialmente longas para que se consiga realizar todos os procedimentos em uma única sessão.</p>	

38. Dentro da prática odontológica, o controle das infecções e também a questão da biossegurança são temas de grande importância para a profissão. Como uma forma de prevenir essas infecções, a ação de higienizar as mãos mostra-se como uma grande medida. Diante do exposto, assinale a alternativa que torna o procedimento **incorreto**.

- (A) A higienização antisséptica das mãos antecede procedimentos cirúrgicos e deve ser sempre realizada com antissépticos para eliminar a microbiota transitória das mãos.
- (B) A luva química é especialmente útil em cirurgias longas. Para isso, é necessário aplicar uma solução alcoólica de antisséptico, deixando secar antes de calçar as luvas.
- (C) A utilização do composto de iodo (polivinil pirrolidona iodo) pode ser substituída pelo gluconato de clorhexidina, caso o profissional tenha alergia ao iodo.
- (D) Após o uso do composto iodo ou clorexidina, deve-se aplicar solução de álcool 70% e esperar secar naturalmente até toda a evaporação do produto.

39. O exame radiográfico tem uma grande importância no diagnóstico de pacientes traumatizados de face. Considerando isso, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A projeção anteroposterior das apófises condilares também é conhecida como projeção de *Waters*.
 - () A projeção posteroanterior dos seios maxilares analisa os limites do seio frontal, septo nasal, zigomas e forame infraorbitário.
 - () A projeção submentoniana vertical dos arcos zigomáticos também é chamada de axial de *Hirtz*.
 - () PA em fronto-naso e perfil de crânio avaliam todo o corpo e a região mental da mandíbula.
- (A) V/ V/ F/ F
(B) F/ V/ V/ V
(C) F/ V/ V/ F
(D) V/ F/ V/ F

40. Com relação ao código de ética odontológico, de acordo com a Resolução CFO, guardar segredo profissional, exceto em situações de justa causa, representa

- (A) uma infração ética.
- (B) um direito fundamental, apenas.
- (C) um dever fundamental, apenas.
- (D) um direito e um dever fundamental.